# *image* not available







# Flora

ber

# Provinz Brandenburg,

ber

Altmark und des Bergogthums Magdeburg.

Zum Gebrauche in Schulen und auf Excursionen bearbeitet

von

Dr. Paul Aicherson.

3meite Abtheilung.

Specialflora von Berlin.

Berlin, 1864.

Berlag von August Birfdmalb. unter ben Linden Rr. 68.

## Berzeichniß

ber : 3 in ...

# Phanerogamen und Gefafkroptogamen,

1:4

welche im Umfreise von fieben Meilen um

## Berlin

vorfommen.

Bufammengeftellt und berausgegeben

box

Dr. Baul Aicherjon.

Berlin, 1864. Berlag von August Hirschwald. unter ben Linden Rr. 68.

In arday Google

Jun 1909

Arnold Arboretum Harvard University NOV 12 1953

## Vorrede.

vorkommenden Gefäßpflanzen dürfte in Hindlick auf die großen Beränderungen, welche die Pflanzenwelt des Gebiets seit der Herausgabe der Dietrichschen Flora Marchica erlitten hat, nicht unzweckmäßig erscheinen. Einerseits sind durch die Ausdehnung der Landwirthschaft und in der Nähe der größern Städte auch der Industrie manche reichhaltige Standorte verschwunden: wo vor zwanzig Jahren noch pflanzenreiche Wiesen und Triften dem Auge sich darboten, sieht man jetz rauchende Fadrisschornsteine oder selbst ganz neue Stadtviertel. Wiesen und kleinere Waldstrecken verfallen immer mehr dem Pfluge; selbst die dürren Sandhügel, die der Botaniker disher als sein undestrittenes Revier zu detrachten gewohnt war, werden seit Einsührung des Lupinenbaus in Kultur genommen. Andererseits sind in diesem Zeitraum manche früher nur unvollständig oder gar nicht botanisch erforschte Strecken durch den Eiser der dort ansässigen Botaniker bekannt geworden; so liegen jetzt über die Gegenden von Potsdam, Freienwalde, Reustadt-Eberswalde, über die in früheren Werken nur lückenhaste Angaben sich sinden, genauere Nachrichten vor: ganz neu ersorscht sind die Gegenden um Brandenburg, Treuenbriehen, Luckenwalde und Trebsenden um Brandenburg, Treuenbriehen, Luckenwalde und Trebsenden um Brandenburg, Treuenbriehen, Luckenwalde und Trebsenden um Brandenburg, Treuenbriehen, Luckenwalde und Trebsenden

bin. Auch die nähere Umgebung Berlins hat noch manche neue Standorte und selbst neue Arten geliefert. Letztere ver= danken wir fast sämmtlich dem Scharfblicke unseres hochverehr= ten Professon A. Braun, durch dessen Forschungen überhaupt die Flora die wesentlichsten Bereicherungen erfahren hat.

Der Umfang des Florengebiels von Berlin ist so gewählt worden, daß die entferntesten Punkte, die gewöhnlich auf einstägigen Ercursionen besucht zu werden pflegen, Lindholz und Selsbelang bei Nauen, so wie Neustadt-Sberswalde, noch eingeschlofsen sind; die Abgrenzung ist streng geometrisch durch einen mit dem Halbmesser von sieden dentschen Meilen um Berlin gezogenen Kreis geschehen. Es wäre nicht schwierig gewesen, eine von derselben nicht sehr abweichende natürliche Umgrenzung zu sinden; doch ist dieselbe für die Flora durchaus nicht von größerer Bedeutung als die oben bezeichnete mathematische; letztere ist daher ihrer größeren Einsachheit wegen vorge-

jogen worben.

Das bezeichnete Bebiet bilbet im Bangen ein burchschnitt= lich etwa 150 bis 200 Fuß über ben Spiegel ber Oftfee er-habenes Plateau, beffen Oberfläche aber nirgends eben, sondern vielfach von wellenförmigen Erhöhungen und Bertiefungen burchjogen ift, in welchen letteren fich viele fleinere und größere Geen Der Rörper biefes Sochlandes wird von mehreren weiten Niederungen durchschnitten, Die ursprünglich das Bett gewaltiger Strome und Seen, gegen welche bie jetigen Bemaffer nur unbedeutende Reste sind, gebildet haben muffen. Die vormalige Existenz bieser Gewässer giebt fich durch hinterbliebene Sandbante und Dunenbildungen beutlich genug zu ertennen. Die bedeutenbsten biefer Riederungen find folgende brei: 1) bas Finowthal, in feiner westlichen Fortsetzung Sobe-Bruch und Rhinluch genannt, burchzieht ben nördlichsten Theil bes Gebiets von Oft nach West und hat in altester Zeit nach Gi = rarb's nicht unmahricheinlicher Spothefe ben Lauf ber Weich= fel aufgenommen; 2) bas Spreethal mit feiner nordweftlichen Fortsetzung, bem großen Savellanbischen Luch, burchzieht in ber Richtung von Guboft nach Nordwest Die Mitte bes Gebiets und biente urfprünglich nach Girard ber Dber jum Abfluß;

3) das von Plettner als Luckenwalder Niederung bezeichnete Thal streift die südwestliche Grenze von Baruth über Lucken-walde in der Richtung nach Brück. Es hat ursprünglich die Gewässer der oberen Spree und Neifte abgeführt. Ein sich bei Luckenwalde abzweigender Ast geht über Trebbin, Mittenwalde und Königswusterhausen nach dem von mehreren Seen erfüll-ten Thale der Dahme, eines Zuflusses der Spree, mit welcher sie sich (als wendische Spree) bei Köpnick verbindet. In der öftlichen Hälfte des Gebiets sind die zwischen den Niederungen pinimen Paiste des Gebiets sind die zwischen den Riederungen liegenden Plateaustreden zusammenhängend und nur durch kleimere Seitenthäler, die in ihnen selbst ihren Ursprung nehmen, durchfurcht; im westlichen Theil dagegen sind sie überall durch Duerthäler, wie das der Havel von Liebenwalde die Keiligensee und das der Nuthe, unterbrochen, so daß die Niederung an Ansdehnung der Hother gleichkommt oder sie, wie im Nordwesten, bebeutend überwiegt, wo zwischen bem großen Savellandischen und bem Rhinluch die höheren Stellen, Land Glien, Landchen Bellin, als Inseln hervorragen, bei welchen zuweilen noch ganz Heine Trümmer, wie die Jahnberge bei Baulinenau, und ähn-liche Horsten, stehen geblieben sind. Die Ränder ber Thäler liche Horsten, stehen geblieben sind. Die Ränder der Thäler sind meist von sehr sanstem und allmähligem Ansteigen. Steil sind sie nur an den Stellen, wo die Niederungen ganz von Seen erfüllt werden, wie an den Havel-Seen zwischen Span- dau und Potsdam, so wie an der kurzen Strecke des Oderthals (bei der Abzweigung des Finowthals), welche innerhald der Gedietsgrenze fällt. Hier liegen der höchste und tiesste Punkt des Gediets nahe bei einander; ersterer ist der Semmelberg bei Freienwalde (503 Fuß), letzterer der Spiegel des Landgrabens dei Freienwalde (10 Fuß). Das Niveau der Niederungen steigt dis 136 Fuß (Wasserpiegel der Havel bei Krewelin unterhalb Zehdenich), 123 Fuß (Unterwasser der Spreesschleuse bei Friesenwalde) und 180 Fuß (Marktplatz in Baruth).

In geologischer Hinsicht gehören die Niederungen natürlich zum Alluvium; sie sind daher im Tert mit A bezeichnet. Das

In geologischer hinsicht gehören die Niederungen natürlich zum Alluvium; sie sind daher im Text mit A bezeichnet. Dassselbe besteht meist aus Humus, der an vielen Stellen in Torf übergeht, welcher z. B. im Rhinluch in großartiger Weise geswonnen wird. Auch sind bedeutende Streden durch von den

Höhen herabgestöften ober gewehten Sand eingenommen, namentlich im Spreethale. Ablagerungen von Thon oder Schlick sind seltener. Untergeordnete Bildungen sind Suswasserkalk und Raseneisenstein, letzterer besonders in der Luckenwalder Nie-

berung vorfommenb.

Die Blateaus werben, abgesehen von untergeordneten 21= luvialablagerungen, fast ausschließlich vom Diluvium gebildet, baber ich sie in biesem Wertchen mit D bezeichnet habe. Die oberfte Schicht beffelben ift Lehm, welcher weite Streden fruchtbaren Aderbobens bilbet. Unter bemfelben liegt eine ihm fehr ähnliche, nur burch hellere Farbe und bedeutenden Raltgehalt verschiedene Schicht, der Lehmmergel, Die in schmalen Banbern am Ranbe bes Lehms, felten einmal in etwas größeren Daffen, 3. B. nördlich von Bornim bei Botsbam \*) und an ber Berlin-Stettiner Gifenbahn bei Blankenburg ju Tage tritt. Das Liegende bes Mergels bildet ber Sand, welcher wohl hauptfächlich wegen seines größeren Gehalts an fleinen Feldspathpartikeln nicht gang so unfruchtbar ift als ber Sand bes Alluviums, aus bem diefelben, nachdem fie fich in Thon verwandelt haben, meift weggespult find. Durch alle Dilnvialschichten finden fich die größeren oder fleineren nordischen Beschiebe oder erratischen Blode, am häufigsten Granit, Bneif, fo wie Feuersteine ber oberen Kreide. — Unter dem Diluvium finden fich in großer Berbreitung, doch selten zu Tage ausgehend, zwei Glieder der oligocanen Tertiarformation, der Septarienthon und das darunter liegende Brauntohlengebirge. Ersterer ist mit seiner reichen Fauna zuerst innerhalb des Gebiets bei hermsborf unweit Berlin, bekannt geworden, tritt aber außerbem noch an verschiede-nen Stellen auf. Die Brauntohlen find bisher nur in ber oftlichen Salfte bes Bebiets befannt und wird auf biefelben besonders bei Rauen und Betersdorf unweit Fürstenwalde, bei Budow, Wriegen und Freienwalde ein nicht unbedeutender Berg-

<sup>\*)</sup> Nach einer glitigen Mittheilung bes herrn v. Bennigsen-Förber, bem wir überhaupt viele wichtige Aufichluffe über bie Diluvialsormation verbanten.

bau betrieben, der fich an letterem Orte auch auf die dem bortigen Tertiärgebirge angehörige Alaunerbe erstreckt. — Bon älteren Bildungen tritt allein im Gebiete die Trias zu Tage, und zwar bunter Sandstein mit Gips, so wie eine mächtige Dufchelfaltablagerung bei Rubereborf unweit Köpnic, welche lettere feit vielen Jahrhunderten durch großartige Bruche ausge= beutet wird. Auch ber ebenfalls ichon fehr lange benutte Gips von Sperenberg bei Zossen, zu bessen Altersbestimmung freilich alle Anhaltspuntte fehlen, gehört am wahrscheinlichsten ber Die in ben Nieberungen bes westlichen Gebiets Trias an. an mehreren Stellen, bei Brandenburg (Bewefin) Botsbam (Uet), Nauen (Zeeftow, beim Beinberg, Mangelshorft, beim Selbelanger Jägerhaus), Beelit (Salzbrunn), Trebbin (Trems-borf) auftretenden Salzstellen find mahricheinlich ebenfalls von in nicht zu großer Tiefe vorhandenen Triasbildungen abzuleiten.

Eine bem jetigen Standpunkt ber Wiffenschaft entsprechenbe geognoftische Beschreibung bes Bebiets fehlt leiber noch; viel Daterial bazu enthalten Kloben's Beitrage zur mineralogischen und geognostischen Kenntnig ber Mart Brandenburg. gramme ber Bewerbeschule ju Berlin 1828-1837, und verichiedene in den geologischen Zeitschriften zerstreute Arbeiten von

Benrich, Girard, Blettner u. A. Die Standorte find von Westen nach Often fortschreitenb nach ben Umgebungen ber Stabte geordnet; Die Ramen ber

letteren find abgefürzt und zwar bebeutet:

B. Berlin. \* Br. Branbenburg. Fw. Freienwalde. R. Röpnid. Im. Ludenmalbe. Na. Nauen. Mft. Reuftabt-Cberswalbe. Dr. Dranienburg. B. Botebam. Sp. Spandau.

\* T. Treuenbrieten. \* Br. Brieten.

Die mit \* bezeichneten Orte liegen zwar außerhalb ber abgeftedten Grenze, boch gebort ein Theil ihrer Umgebung jum Bebiete.

Ebenjo find bie Namen ber häufiger vortommenben Be-

obachter abgefürzt, und zwar:

Beh. Buchholg, Rantor und Lehrer an ber Oberfchule in Mft. unterftütte ben Berfaffer burch fdriftliche und mundliche Mittheilungen.

Bl. Dr. R. Bolle in B., besgl.

A. Br. Brof. Dr. M. Braun, besgl.

Bs. Bog, Lehrer am Roniglichen Militair = Baifenhaufe in B., besgl.

D. Dr. A. Dietrich, Flora Marchica, Berlin 1841 und

mündliche Mietheilungen.

Gae. Gaebbe, meiland Prediger in Alt-Landsberg, fchriftliche und mundliche Mittheilungen.

Gr. Grantow, Lehrer ju Schulzendorf bei Trebbin, bgl.

H. Soffmann, früher Torf-Infpettor in Fehrbellin, jest in B. herbarium von Pflangen bes Torfbobens (im Roniglichen Berbarium ju B.); Angaben bei D; mundliche Mittheis lungen.

Hl. Bolla, Lehrer, jest in Bulverfrug bei Frankfurt a. D.,

1858 in B. Mündliche Mittheilungen.

J. v. Jasmund, Major a. D. in B., besgl.

Kr. Rraufe, weiland Beheimer Regierungerath in Salberftadt, früher in B., Angaben bei D.

Kth Brof. Dr. Runth, Flora Berolinensis. Berlin 1838.

Li. Dr. Liebe, Gymnafiallehrer in B. Mündliche Dittheilungen.

W. M. B. Müller, Seibenwirker in B., besgl. N. Nagel, Prediger in Tiepow bei Kremmen. Münd= liche und fchriftliche Mittheilungen.

P. Paudert, Apothefer in T. Manuffript über Die Flora

von T.

R. Oberlehrer Ruthe, Flora ber Mart Brandenburg und ber Nieberlaufits. 2. Auflage 1834, und munbliche Mittheilungen.

R. fl. R. Ruthe, Thierargt in Barmalbe. Bflangen im Berbarium bes Berrn Dberlehrer Ruthe.

Rbh. Dr. Rabenhorft, Flora Lusatica. Leipzig 1839.

1840.

Rei. R. Reimann, in B. Mündliche Mittheilungen.

Rn. Reinhardt, Chemifer in Möglin bei Br., früher auf bem Alaunwert bei Fm. Schriftliche und mündliche Mittheilungen.

Rt. Ritter, Lehrer in B., früher in Friefact und Em.

Mündliche Mittheilungen.

H. S. Beinr. Schulze, Aftuar in Ronigshorft bei Ra.

Mündliche und fdriftliche Mittheilungen.

H. S. II. Beinr. Schulze, Lehrer an ber Rathe- und Friedrichsschule in Ruftrin, früher in Lm., besgl.

Sch. Schaebe, Rantor und Lehrer in Alt-Reet bei Br.

Schriftliche Mittheilungen.

Schl. Brof. Dr. v. Schlechtenbal, Flora Berolinensis, Berlin 1823. 1824, und briefliche Mittheilungen.

Schp. Scheppig, Bebulfe im Ronigl. botanifden Bar-

ten in B. Mündliche Mittheilungen.

Schr. Schramm, Detonomie-Rommiffion8=Rath in Br., Flora von Brandenburg und Umgegend, Brandenburg 1857. — Bur Flora der Mark Brandenburg und speciell der Stadt Brandenburg und Umgegend in Flora 1858. — Mündliche und fdriftliche Mittheilungen.

Sp. Dr. Th. Spieker, Oberlehrer an ber Realschule in

Mündliche und schriftliche Mittheilungen.

Th. F. v. Thumen-Grafenborf, Sustematisches Ber- zeichniß ber in ber Umgebung ber Stadt Jüterbogt wildwach-

senden phanerogamischen Pflanzen, in Flora 1857.

Außerdem ift die zum Königl. Herbarium in B. gehörige Sammlung martifcher Pflangen, welche meift vom Brofeffor v. Schlechtenbal und bem verftorbenen Thiele aufgenommen find, benutt morben.

An ben mit !! bezeichneten Standorten hat der Berfaffer bie betreffende Pflanze felbst beobachtet; ein ! bebeutet, daß ihm

von bem Stanborte trodne Eremplare vorgelegen haben.

Schlieglich fagt ber Verfasser allen benen, die seine Arbeit burch ebenso bereitwillige als uneigennützige Mittheilung ihrer Beobachtungen unterstützt haben, seinen herzlichsten Dank, und bittet sie, so wie alle Freunde ber vaterländischen Flora, benen dies Werkchen in die Hände kommt, demselben auch ferner ihre Gunft zu schenken und zu erhalten.

Berlin, ben 20. April 1859.

Dr. Paul Aicherson.

## Phanerógamae.

## I. Angiospermae.

#### A. Dicotylédones.

## 1. Familie. Ranunculaceae Juss.

#### + Clématis L.

† C. recta L. 3m Gebiet nicht einheimisch, fonbern mabricheinlich nur verwilbert B. Bei ber Lanbesbaumichule Beh.! Budow im Elvfium R. fil.!

\* C. Vitalba L. In Balbern Mittelbeutschlands einheimisch, ... bier nur zu Lauben u. f. w. angepflanzt.

\* C. Viticella L. Stammt aus Gubbeutschland, bier nur gu Lauben u. f. w. angepflangt.

#### 1. Thalictrum Tourn.

1. T. aquilegiaefolium L. Laubwalber, febr felten. Dr. Berpenfchleuse am Wege nach Marienwerber fparlich Jahn 1834!

2. T. minus L. Laubwälber, Gebiliche, felten, wohl mehrfach Bisber nur Gp. Papenberge Beyrich! Alt-Lanbsberg zwischen bem Bernauer u. Strausberger Thor Gae. !! und Strausberg an ben Lilien-Convallien-Ballen Gae.!

3. T. flexuosum Bernh. Sonnige Bugel, trodne Balber, gerftreut. B. Brauhausberg Bs.! am nörblichen Ufer bes Glindower Gees!! Teltow Bl. Gp. Schilbhorn!! Ra. Brebower Forft beim Korftbaufe!! Briefelang W. M.!! Jabuberge bei Paulinenau!! B. In ber Rabe ber Spree oberhalb bes Begemeifters!! Jungfernheibe beim Blobenfee!! Wilmersborf Thiele! Dufterer Reller!! R. Mahleborf Bl.

Mübersborfer Kalfberge!! Boffen: Sperenberger Gipsberge!! Br. Upftall bei Schulzenborf Rn. Rft. Brunnen Beh.! In einer hede bei Sommerselbe Beh.!! Kirchhof zu hetelberg Bt.

4. T. simplex L. Lichte Laubwälber, fehr felten, bisher nur Ra. Brebower Forft westlich vom Forsthause!! von Schr. 1853 entbedt.

5. T. flavum L. Wiesen, besonders A, nicht selten, 3. B. Br. Pewesin!! P. hinter dem Neuen Palais Bs. Na. Königshorst. H. S. Kremmen: Tietow!! E. Berghorst; Niebelhorst P. Lw. Molstenhitten Rt. Lindenberg Th. B. Zwischen Rummelsburg und dem Kiet!! zwischen der Stralauer und Franksuter Chausses!! nördlich von Charlottenburg A. Br. Wiese, Moadit gegenüber!! am Schissahrtestanal vor dem Anhaltschen Thore!! und an der Potsbamer Eisenbahn W. M. Rudower Wiesen!! Wiese vor dem Kottbusser Thor!!

#### 2. Hépatica Dillen.

6. H. triloba Gil. Schattige Laubwälder, Gebüsche, derftrent. P. Sanssouci einzeln, vielleicht verwildert Bs.! Sp. Papenberge D. Dr. Zwischen Sachenhausen und Theerofen Rn.! Zerppenschiege D. Arn. Ra. Brieselang, häusig!! Kasanerie bei Königsborg H.S.!! Trebbin: Burgwall Gr. B. Friedrichsselder Park!! Schönshauser Park, einzeln!! Französsisch Duchbolz; Buch Kr. A. Am östichen User des Kalkses beim Alten Grund!! Alt-Landsberg Gae. Mittenwalde: nach Telz hin Gr. Müncheberg: Deidekrug!! Buckow: Pritzhagen im Elysium!! Fw. Brunnen Rn. Zieglerberg!! Schloßberg Rn. Mft. Sichwerder!! Schanzenberg; Brunnen Bch. Zainhammer!! Spechthausen Bch. Eisenspalterei; Lichterselbe H. Häusig in Gärten mit gesüllten Blumen.

#### 3. Pulsatilla Tourn.

7. P. pratensis (L.) Mill. Sonnige hügel, Kiefernwälder, fast nur auf Sanboben, zerfreut. P. Brauhausberg Sanio! Exercirplat; Tornow; Templin Bs. Banungartenbrid!! Grunewald beim Schlachtensee!! Sp. Tegel Schl. Dr. Bei Duaben-Germenborf G! Ra. Weinberg!! wischen bem Weinberg und Briefelang W. M. Jahrberge bei Paulinenau H. S.!! Lw. Lindenberg Rt.! Trebbin: zwischen Schulzendorf und Forsthaus Lenzburg Gr.! B. Fuchsberge sehr häusig!! Jungsernheite!! Spandauer Bock nach Pichelsberg hin Bl. Beim neuen Krug!! A. Rahnsdorf!! Boltersdorf!! Ribersdorfer Kaltberge!! Alt-Landsberg Gae. Zossen: an der Chausse beim Forsthause und bei Gr. Machenow Bl. Fw. Maunwert Kn.! Rh. Beim größen Schlangenpsubl; kleiner See Beh.

8. P. vornalis (L.) Mill. Riefernwälber, an sonnigen Platgen, letten. Dr. Bei Berpenichleuse auf Sügeln, sublich vom Kanal Jahn!

B. Bor ber Jungfernheibe R. fil. A. Bei ber Rahnsborfer Mühle, umweit ber Eisenbahn Li. u. Körnicke! Rft. Brunnen Beh.! Zain-

hammer; bei ben Leuenberger Wiefen einzeln Beh.

9. P. patens (L.) Mill. Wie vorige, zuweilen mit ihr, sehr selten K. Rahnsborf A. Br.! Alft. Forsthaus Eisenbude in ber Biesenthaler Forst Kr. Erreicht hier ihre westliche Grenze.

#### 4. Anemone Tourn.

10. A. silvestris L. Sonnige Higel, selten, aber gesellig. K. Rübersborser Kaltberge!! Buckow Kadig! Fw. Weinberg; Ataziensberg Rn. Paschenberg Bch. Nst. Eichwerber!! Karlswerk; Hohen-Kinow Bch.

11. A. nemorosa L. Laubwälder, Gebüsche, sehr häufig, 3. B. B. Sanssouci!! Reuer Garten Bs. Sp. Dallgow!! Papenberge D. Schwanentrug!! Ra. Brieselang!! Bredower Forst!! Fasanerie bei Königshorst H. S. Kremmen: Tietzow N. Lw. Elsthal; Lindenberg; vor der Papiermühle Rt. B. Friedrichsselber und Schönkauser Part!! Französsisch-Buchbolz!! Buch Kr. zwischen Pantow und Rosentale W. M.! Thiergarten!! Charlottenburger Schlösgarten!! Alt-Landsberg Gae. Wr. Büchnig bei Möglin Kn. Fw. Brunnen; Zieglerberg Rn. Schlösberg Rn.! Rs.! Biesenthal: Lanke Schl.

b) purpurea Bl. B. Thiergarten beim Forsthause ein-

mal Bl.

12. A. ranu'n cu do'i des L. Wie vorige, meist mit ihr, zersstreut. P. Sanssouci!! Neuer Garten' Bs. Sp. Papenberge Schl. Dr. Kr. Liebenberg Bch. Na. Stadtsorst in den Hahnbergen Gr.1 Gr. Bähnit Sp. Unterholz beis Dchtow H. Hasanerie bei Königshorst H. S.! Jahnberge Rt.! Krenmen: Tietzow N.! bei der Linumer Jiegelei H. Lw. Renneberge Rt. Trebbin: Scharsenbrücker Forst Gr. B. Friedrichsselber Part einzeln!! Schönhauser Part!! (seit mehreren Jahren verschwunden) Frauzössisch-Buchbolz; Buch Kr. K. Am östlischen Ufer des Kalkses beim Alten Grund!! Alt-Landsberg Gae. Br. Bichnitz bei Möglin Rn. Hw. Brunnen Rn. Zieglerberg!! Schloßeberg Rn.! Nst. Zainhammer!! Trampe; Pechteich Kr.

#### 5. Adónis Dillen.

† A. auctumnalis L. Zierpflanze aus Gub-Europa; zuweislen in Gärten verwisbert. P. Rn. B. Schöneberg Bl. K. Rüberssborf Rn. Fw. Rn.

13. A. aestivalis L. Lehmäder, selten, nur im öftlichen Gestiet. R. Bei ben Rübersborfer Kaltbergen Körnicke. Budow: Bolstersborf Walter! Br. Möglin an ber Baglower Biefengrenze Rn.

Batlower Milble Sch.! Fw. Weinberg Rn. Rft. Pfingstberg; bei Karlswert Bch.! Setelberg Bl.

#### 6. Myosúrus L.

14. M. minimus L. Feuchte Aeder, an Gräben nicht selten, z. B. P. In ber Padhofstraße bei ber Berliner Brüde am Rinnstein Bs. Sp. Bei Nieber-Neuenborf!! Ra. Königshorst: Rachtloppel H. S. 2w. Felgentreu Rt.! B. Vor bem Königsthor beim Caupfuhl J.! Bor Pankow!! Charlottenburg!! Wilmersborf!! Alt-Landsberg Gae.

#### 7. Batráchium E. Mey.

15. B. aquatile (L.) E. Mey. Stehenbe und langfam fließenbe Bewässer, gemein.

b) paucistamineum Tausch. (als Art). Richt so häufig

als die Sauptart. B. Jungfernheibe!! Treptow !!

16. B. divaricatum (Schrk.) Wimm. Bie vorige, nicht selten, aber wohl mehrsach übersehen. P. Sanssouci Schp. Sp. Tegeler See Körnicke! Kremmen: Linum H.! B. Friedrichsselber Part!! Jungsernheibe in Torssichen!! Plötzense Thiele! im Schiffschrikkanal bei der englischen Gasanstalt!! Rudow Schp.! Alte-Landsberg: Bötze Gae.! Rft. Alter Wasserfall Beh.

17. B. fluitans (Lmk.) Wimm. Fließende Gewässer, nicht häufig. B. Havel bei Baumgartenbrud Schp. Sp. Beim Potsbamer Thor Rach! Dr. Havel bei ber chemischen Fabrik. Rn. B. Schifffahrtskanal bei Morithof und zwischen bem Halleschen und Kottbusser Thor Bl. Spree D. K. In ber wendischen Spree beim Schlosse

Bl. Fr. Landgraben Rn. Mft. Kanal Beh.!

#### 8. Ranúnculus Haller.

18. R. Flammula L. An Graben, Gumpfen, febr haufig.

19. R. Lingua L. Stehenbe Gewässer, Sümpfe, zerftreut. B. Beim neuen Palais; Ruthewiesen Bs. Sp. Inseln im Tegler See Bl. Na. Briefelang Rei. Sandhorst H. S.! westlich von Paulinenau!! am Gr. Bähnitzer See!! Lw. Sumpfwiesen östlich ber Stadt Rt. B. An ber Stadtmauer bei d. Eisenbahnpforte J. Rummelsburg!! Plüben gee Bl. Witseben am Liegen «See!! zwischen bem zoologischen Garten und Wilmersborf W. M. Johannisthal Thiele! R. Tasdorf Schl. Wr. Batlower Wiesen Rn. Biesenthal: Nach Lante hin A. Br.

20. R. auricomus L. Laubwälder, Gebüsche, nicht felten. B. Sanssouci!! Sp. Tegel Keh. Ra. Finkentrug!! Wiesen beim Brebower Forsthause!! Lindholz!! Fasanerie bei königshorst!! Aremmen: Flatow H. Lw. Renneberge Re.! B. Wiese bei ben Fuchsbergen J. Friedrichsselber, Schönhauser, Französisch Buchholzer und

Charlottenburger Schlofigarten!! Thiergarten bei ber Försterei!! Wiefen östlich von ber Kottbuffer Strafe!! vor ber Spreeheibe W. M. Rft. Wiesen an ber Schwärze!!

21. R. acer L. Biefen, Gebuiche, gemein.

22. R. polyanthemus L. Sonnige, trodne Balbstellen, sehr zerstreut. P. Innerhalb bes Bildparks nach Kuhfort hin Bs.! Römerschanze Bl. Sp. Tegel D. Ra. Finkenkrug W. M. Bredower Forst!! Lindholz!! B. Jungjernheibe süblich vom Kanal in der Gegend bes Plögensees!! Nft. Brunnen; Zainhammer Bch.! Eisenstalterei H.

23. R. repens L. Biefen, Triften, Begranber, gemein.

24. R. bulbosus L. Laubwälber, Grasplätze, nicht selten, 3. B. P. Ruinenberg; Brauhausberg Bs. Ra. Königshorst H. S. B. Friedrichshain J. Schönhauser Park!! beim zoologischen Garten!! zwischen Wilmersborf und Schmargenbors!! Eisenbahneinschnitt bei Schöneberg!! K. An ber Eisenbahn in ber heibe nach Rahnsborf zu W. M.

25. R. sard ous Crtz. Feuchte, sehmige Aeder, zerstreut. B. 3. B. Bornstedt Bs. am Glindower See!! Sp. D. Or. Gae. Ra. Königshorst in der Bullenkoppel H. S.! Lw. Felgentreu Rt.! Trebbin: Schulzendors!! B. Lichtenberg D. Weißensee!! Deinersborst D. Pankow!! östlich von Nieder-Schönhausen!! süblich von Charlotenburg!! wehlich der Potsdamerstraße Rei.! zwischen Schöneberg und Steglity!! zwischen Wilmersbors und Schöneberg Bl. Tempelhof D. westlich von der Hasenbeide W. M. Nst. Sommerfelde Beh.

26. R. arvensis L. Wie voriger, zerstreut. B. Bornim Schp.! Na. Tiehow Gr.! Königshorst H. S. Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Zwischen bem Landsberger Thor und Lichtenberg Jahn! zwischen Nieber-Schönhausen und Französisch Buchholz!! süblich von Charlottenburg Bt. zwischen Wilmersdorf und Schöneberg!! zwischen Tempels

hof und Lantwit Bt. Rft. Commerfelde !!

27. R. sceleratus L. Gräben, Sümpfe, nicht selten, 3. B.-B. Nuthewiesen; Siche Bs. Teltow Bl. Sp. Pichelsberg Bl. Ra. In Rohrbed!! Königshorft H. S. Lw. Felgentreuer Busch Rt. B. Bor bem Franksurter Thor auf ber Wiese!! vor bem Königsthor am Saupfuhl!! Plögensee!! Thiergarten Hl. Schöneberg Bl. Tempelhof an ben Pfühlen hinter ber Kirche W. M.

#### 9. Ficária Dillen.

28. F. polypétala Gil. Laubwälber, Gebüsche, nicht selten, 3. B. B. Sanssouci!! Sp. Bei ber Tegler Mühle Bl. Na. Brieselang!! Fasanerie bei Königshorst H.S. B. Vor Rummelsburg!! vor Pankow!! Schönhauser Part!! Französisch Buchholz!! Thiergarten beim

alten Chaussehause!! Alt-Landsberg Gae. Budow in ber Stadt und im Elpsium!! Fw. Papiermuble!! Rft. Cichwerber!! Zain-banmer!!

#### 10. Caltha L.

29. C. palustris L. Sumpfwiesen, gemein.

#### 11. Tróllius L.

30. T. europaeus L. Fruchtbare Wiesen, sehr zerstreut. Na. Bärhorst nach herteselb bin Gr.! B. Wiesen östlich von Rixbors Rn.! Stienitzwiesen bei Alt-Landsberg Gae. und Werneuchen D. Wr. Büchnitz bei Möglin In. Ast. Wiesen bei ber Rogaser Schleuse Beh.! Trampe; Sydow Beh.

#### † Helléborus Adans.

† H. viridis L. Stammt aus Mittelbeutschland. In Grasgärten öfters gebaut und zuweilen halbwild. Bucow in den neuen Anlagen Radig! Rft. Tornow H.

† H. foetidus L. Wie voriger. Budow Sch. Radig!

#### 12. Nigella Tourn.

31. N. arvensis L. Lehmäder, sehr zerstreut. Br. Bei ber Bewesiner Windmühle; Schmergow Schr. P. Geltow Schp.! bei ber letzer Fähre Bl.! Zehlendorf an der Chausse nach Steglit! Sp. Westlich der Stadt!! Ra. Gr. Trebbin Gr. B. Hinter Lantwig Kr. Aeder beim Buschtrug einzeln Schp! Mittenwaldewig Kr. Aeder beim Buschtrug einzeln Schp! Mittenwaldewig Kr. Wachenow H. S. II.! Bucow R. Br. Nöglin; Baylow Kn. Fw. Nach Alt-Ranft hin; Weinberg Kn. Rs. Nft. Bei Warbeck Mihle Bch. zwischen Tornow und Karlswerk!!

† N. damascena L. 3n Garten als Bierpflanze; ftammt

aus Gilb-Europa. Buweilen auf Coutt verwilbert.

† N. sativa L. Stammt aus Gub-Europa; im Gebiet nicht gebaut, aber zufällig verwilbert. B. Bei Steglit Tittelbach!

#### 13. Aquilégia Tourn.

32. A. vulgaris L. Laubwälber, sehr zerstrent. Na heineberg bei Gr. Bähnit Schr. B. Johannisthal Rn.! Alt-Landsberg Gae. Strausberg: Blumenthal R. Mft. Zainhammer; Schlangen-pfuhl Bch. häusig in Gärten gepflanzt und an ober in benselben verwilbert. F. Beim neuen Palais!! im Petower Garten!! Dr. Schlöfgarten Rn.! B. Charlottenburger Schlöfgarten Bl. Kirchhof in Dahlem Kr.

#### 14. Delphínium Tourn.

33. D. Consolida L. Aeder, stellenweise gemein, aber an anberen Orten seltener.

† D. Ajacis L. Zierpflanze aus Gilb-Europa; zuweilen verwilbert: A. Ribersborf E. Rose!

† D. elatum L. Seltenere Zierpflanze aus Mittelbeutschland. Bermilbert B. 3m Bart von Sanssouci Bs.!

#### . 15. Actaea L.

34. A. spicata L. Bergige Laubwälber, felten. Ra. Gr. Bahnit am füboftlichen Gee-Ufer S. Fw. Beim Schlofigarten Rn.!! beim Baa-See Rn.! Rft. Schanzenberg Beh.!! Schützenhaus; Zain-hammer; Spechthausen nach bem Geschirr hin Beh.

## 2. Familie. Berberidaceae Vent.

#### 16. Bérberis L.

35. B. vulgaris L. Sonnige Hügel, Laubwälber, wahrscheinlich wild, sehr zerstreut. Br. Bagow Schr. P. Glindower Ziegeleiberge Schr. Na. Piepenberge in ber Bredower Forst!!\*) K. Rübersdorfer Kaltberge Bl. Br. Büchnitz bei Möglin; Methorser Berge
Rn. Wrietzener Berge Sch. Häusig zu heden angepstanzt und von
da verwilbert, z. B. P. Beim Beinberg bei Baumgartenbrück!!

#### † Epimédium L.

† E. alpinum L. Stammt aus Gubbeutichland. Rur angepflanzt und verwilbert Budow Radig.

## 3. Familie. Nymphaeaceae D. C.

## 17. Nymphaea L.

36. N. alba L. Rur a) melocarpa Caspary. Stehenbe und langiam fließende Gemäffer, häufig, 3. B. B. Savel Bs. Wiesensgräben, Werber gegenüber!! Sp. Grunewald, vom Schlachtensee bis hundekehle!! in ber havel bei Pichelsberg!! Na. Graben mest-

<sup>\*)</sup> Bredower Forft wird bier ber Kurge wegen ber gange zwischen ber Galte-fielle Kinkenkrug und bem Dorfe Zeeftow, fublich von ber Berlin-hamburger Eifenbahn gelegene Borftforper genannt, obwohl 3. B. bie Biepenberge nicht nach Bredom gehoren.

lich von Paulinenau!! Königshorst H. S. Aremmen: Linum H.! Beelitz: Seen bei Rieben und Dobbritow P. Lw. Torfstich bei ben Rennebergen Rt. B. Torfstich vor der Jungfernheide!! Pfühle bei Lantwit W. M. Bei uns sind bisher nur folgende Formen unterschieden:

sphaerocarpa Casp.
 α)c hlorocarpa Casp.

\* flava Casp. Sp. Bichelsberg Caspary. Mft. Dberfee bei Lante Caspary.

\*\* splendens Hentze (als Art). Sp. Krumme Lanke

Caspary. B) erythrocarpa Casp. Sp. Pichelsberg Caspary. B. Lankwith Caspary. Rft. Obersee bei Lanke Caspary.

#### 18. Nuphar Sm.

37. N. luteum (L.) Sm. Wie vorige, meist mit berselben, z. B. P. Havel Bs. Sp. Havel bei Pichelsberg!! Na. Gräben westlich von Paulinenau!! Mangelshorst H. S. Kremmen: im Rhin H.! Beeslitz: Seen bei Rieben und Dobbrikow P. B. Pfühle bei Weißensee!! Lankwitz W. M. im Graben beim Köpnicker Weg!!

## 4. Familie. Papaveraceae D. C.

#### 19. Papáver Tourn.

38. P. Argemone L. Sandige und lehmige Aeder, nicht felsten, z. B. B. B. Bor dem Prenzlauer Thor Rei. bei Schönesberg Bl. Wilmersdorf!! Schmargendorf!! bei der Hasenheibe W. M. Alt-Landsberg Gae.

39. P. Rhoeas L. Wie voriger, gemein.

40. P. dubium L. Bie voriger, nicht felten, z. B. P. Gublich von Bornstedt Bs. Ra. Königshorst H S. B. Beim Kurfürstenbamm W. M. westlich von ber Potsbamer Strafe Garcke. Lehmgrube bei ber Hopfschen Brauerei!! Buschfrug!! Alt-Landsberg Gae.

† P. somniferum L. Stammt aus bem Drient. Als Zierpflanze und ber Samen wegen in Garten baufig, feltener auf Aeckern gebaut. Zuweilen einzeln verwilbert.

#### 20. Chelidónium Tourn.

41. C. majus L. Zäune, Schuttstellen, Gebuiche, gemein.
b) laciniatum Mill (als Art). Mit ber hauptart selten, wohl nur verwilbert P. Beim neuen Palais Schp.! B. Schone-berg an ber Mauer bes botanischen Gartens Schp.!!

# 5. Familie. Fumariaceae D. C.

21. Corydallis D. C.

42. C. cava (L.) Sohw. u. K. Gebiliche, felten. Rur: Kremmen: Tiegow in ber horft bes Pfarrers N.! Linum am Caum H.

E. Grasgarten in Buchholg P.

43. C. intermedia (L.) Mer. Gebülche, Laubwälber, sehr zerftreut. P. Sanssouci, besonders bei der kleinen Fontaine!! Ra. Abhänge nörblich von Kl. Bahnity Sp.! Gr.! Fasanerie bei Königshorst H. S.! Jahnberge bei Paulienenan Kt. Fürstenwalde: Steinhösel Hl.! Br. Möglin: Büchnity Sch. Fw. Weinberg Kn. Schlösberg Rn.! Rft. An der Schwärze zwischen Brunnen und Zainhammer Bch.!! Spechthausen beim Geschirr Bch.

44. C. solida (L.) Sm. Laubwälber, fehr felten. Rur B. Sansfouci unweit ber fleinen Fontaine Schp.! Bs.! und Ruinen-

berg Bs. !

#### 22. Fumária Tourn.

45. F. officinalis L. Aeder, Gartenland, überall häufig. + F. parviflora Lmk. Stammt aus Sübbeutschland. Bers wilbert B. Schöneberg in ber Nabe bes botanischen Gartens Rn. W. M. 1855, 1858!

## 6. Familie. Cruciferae Juss.

#### 23. Nastúrtium R. Br.

46. N. fontanum (Lmk.) Aschs. Gräben, üfer, zerstreut. B. Tornow; Templin Bs. Sp. Pichelswerber D. B. Bestlicher Graben am Markgrasenbamm bei Rummelsburg!! Gesundbrunnen D. Schiffsahrtskanal bei Morithos Bl. Rixbors am Bege nach Ober-Rixbors!! Alt-Landsberg Gae. Mittenwalde an der Rotte Gr. Br. Upstall bei Schulzendorf Rn. Fw. Schl. Rs. 3m alten Gesundbrunnen W. M.

47. N. amphibium (L.) R Br. Graben, Ufer, Gumpfe,

gemein.

48. N. silvestre (L.) R. Br. Graben, naffe Biefen, Sumpf-

ränber, gemein.

49. N. palustre (Leyss.) R. Br. Ufer, Sumpfränder, überschwemmte Stellen, nicht selten, 3. B. B. Tornow bis Templin Bs.
Sp. Saveluser bei Pichelsberg!! Kremmen: Linum; Beet H.! Treb-

bin: Lengburg Gr.! B. Wiesen vor bem Frantfurter Thor !! Gpreeufer bei ber Tidpiden Babeanstalt Bl. Jungfernbeibe Schl. Cooneberg auf bem Wege nach Bilmersborf und nörblich bavon!! gwijchen Bilmersborf und Charlottenburg W. M. jenseit Tempelhof an Bfith-Ien!! Alt-Landsberg Gae.

47 x 48. N. amphibium x silvestre. 3mifden ben Eltern felten. B. Geegericher Solgplat bor bem Unterbaum A. Br.

1854!

#### 24. Barbaraea R. Br.

50. B. lyrata (Gil.) Aschs. Biefen, feuchte Neder, nicht baufig. Br. Bewesin am Lötzfanal!! P. Plantage; Sanssouci; Reuer Gar-ten, wohl nur eingeschleppt Bs. Sp. D. B. Charlottenburg; Johannisthal D. Alt-Landsberg Gue. Mft. Landsberger Biefen: binter Commerfelbe füblich ber Chauffee Beh.!

b) iberica (Willd.) D. C. (als Art, erweitert). Gp. R. Dr. Schlofigarten Rn. Ra. Rach Ribbed bin Bouche! Beffin am Wege nach Paulinenau Rt. B. Acter bieffeit bes Friedrichsfelber Chauffeehaufes, füblich von ber Chauffee 1858!! Reinidenborf; Charlottenburg R. R. Am Rahnsborfer Mühlenfließ nörblich von ber Bahn W. M.!

51. B. stricta Andrzi. Ufer, Graben, gerftreut. B. Moorlante Winkler! B. Ronnenbamm bei Charlottenburg Filly! Graben auf bem Geegerichen Solaplat A. Br.!! Bellevuegarten Bl. Thiergarten unweit ber Fajaneriebriide Rei.! Mft. Um Ranal bei ber Rogafer Schleufe Beh.!

#### 25. Turritis Dillen.

52. T. glabra L. Balber, Gebuiche, gerftreut, meift einzeln. B. Braubausberg Bl. Gp. Pichelsberg D. Grunewald beim Rhinmeifter-Gee!! Bapenberge Kth. Ra. Fintentrug am Bege nach ber Brebower Forft Dieffeit ber Gifenbabn !! Lindholg; gruner Damm zwijchen Königshorst und Sanbhorst H. S. Jahnberge!! Lw. West-lich am Wege nach Scharsenbrück Rt. B. Gesunbbrunnen nach Schönhaufen bin!! Thiergarten!! Dablem D. Schoneberger Grasgarten Bl. Safenbeibe!! R. Boltersborfer Colleufe nach ben Raltbergen bin!! Strausberg: Blumenthal D. Fw. Afagienberg!! Rft. Beh.

#### 26. Arabis L.

53. A. hirsúta (L.) Scop. Biefen, Balbranber, Abhänge, gerftreut. B. Bei ber Drebbrude Bs. Charlottenhof Bl. Sp. Bichelsberg; Bapenberge D. Dr. Schlofigarten Kr. Ra. Briefelang am Bege nach bem Fintentrug!! häufig auf Dammen und Biefen im großen havelländischen!! und Rhinluch H.! Jahnberge!! Trebbin Gr.! B. Jungfernheide an dem kleinen Torssich öftlich vom Pfefferluch Rei.! an der Chausse westlich von Charlottenburg; Spandauer Berg Bl.! Kurssirstendamın W. M. Kreuzberg D. Hasenheide W. M. K. Sildlich vom Alten Grund am Waste!! Alt-Landsberg Gae. Hr. Hammerthal Ht.! Schlößberg Rn. Köthen im Wasserthal!! Rs. Zwischen

Brunnen und Bainhammer an ber Edmarge Beh.

54. A. arenosa (L.) Scop. Bälber, Gebiliche, Graspläte, sandige Higel, Wiesen, zerstrent. Br. Kehir Gr. B. Kirchhof Bs. Sp. Kichelswerber!! Papenberge!! Tegel D. Ra. Mangelshorft H. S.I. Kremmen: Tietow N.! Linum H.! Trebbin: zwischen Lübersbori und Schulzenborf Gr.! Um B. sehr häusig: Lichtenberger Kiet J.! Kriedrichsischer Part!! zwischen Pantow und Rosenthal W. M. süblich an der Jungfernheibe!! Charlottenburger Schlößgarten!! und Gebüsche an der Spree dem Schlößgarten gegenilber!! Wiese Moabit gegenüber!! Böschungen am Schissfahrtskanal zwischen ber Lichtensteins und Poksammer Brücke!! Graspläte bei der Louisen-Insel!! Bellevue Bl. vor Schöneberg an der Potsbanter Eisenkahn W. M.! Lehmgrube bei der Hopfsichen Brauerei!! Hasenheibe Hl. am Kanal vor dem Kottbussertiegarten!! Fw. Brunnenthal!! Rs. Am Kanal; Schwärzewiesen Beim Zainhanmer Bech.!! am Berbellin-See Kr. Biesenthal: am Liednis See bei Utborf Kr.

+ A. pendula L. Stammt aus bem nördlichen Affen. Ber-

wilbert Schoneberg an ber Mauer bes botanischen Gartens!!

#### 27. Cardámine L.

55. C. parviflora L. Sumpfränder, überschwemmte Stellen, selten und unbeständig. B. Beißensee am Psuhl beim Chaussehause Rach 1843 sehr viel! an der Dranke 1857 einzeln Schp.!! Moabit an der Brüdenstraße 1841 Hanstein!

56. C. impatiens L. Schattige Laubwälber, sehr zerstreut. Sp. - Auf bem haffel-Werber bei Tegel A. Br. 1858! Fw. Abhang über ber Chaussee und am klingenden Fließ östlich von der Papiermühle Rn.!! Rft. Schanzenberg; vom Brunnen bis Spechthausen; Geschirr Beh!

57. C. hirsúta I., Fenchte Graspläte, schattige Laubwälber, serstreut, zuweilen unbeständig. P. Sanssouci, besonders bei der Brilde siblich der Fontaine Bs.! Pfauen-Insel Oenicke. Sp. Bichelswerder Baetke! Buckow: Elpsium unweit der Prithagener Biche!! Fw. Schloßgrund am klingenden Fließ Rn.! Rft. Schützenbaus: Zainhammer; Spechthausen Bch.!

b) silvatica Lk. (ale Art). Schattige Laubwälber, felten.

Ra. Nordweftlich vom Fintentrug Sanio!

58. C. pratensis L. Biefen, fehr gemein. Rommt vor:

b) scapigera A. Br. B. A. Br.!

c) uniflora Sternb. u. Hoppe. Sp. Havelufer süblich von Pichelsberg Bl. 1857! B. Unweit bes Reuen Kruges Dr. Berg 1842!

59. C. amara L. Balbstumpfe, an Gräben und Bächen, zerstreut. B. Bom Tornow bis Kaput an ber Havel; Ravensberge bis Bergholz Bs. 1 Ra. Stadtforst Gr.! Lw. Elsthal Rt.! Papiermühle; Felgentreuer Busch Rt. B. Bei ben Fuchsbergen Gs.! bei Französisch Buchholz östlich vom Dorfe!! Jungfernheibe D. Thiergargarten an bem Graben östlich vom alten Chaussehause nörblich ber Chausse!! am Schiffsahrtskanal beim zoologischen Garten!! an ben Gräben nordwestlich vom Hossiger Bl.! Iohannisthal D. R. Rabenstein-Mühle W. M. Br. Kleine Mihle Sch.! Fw. Hammerthal; Schloßberg; Köthen Rn. Rf. Unter bem Schützenhause!! beim Zainshammer sehr viel!!

#### + Hésperis L.

† H. matronalis L. Häufige Zierpflanze aus Sübbeutschland. Berwilbert B. Charlottenburg süblich von Bitleben Bl. Thiergarten beim Hossäger Bl.!!

#### 28. Sisýmbrium L.

60. S. officinale (L.) Scop. Wegränder, Züune, gemein. † S. Irio L. Stammt aus Sübbeutschland. Berwilbert B. Auf dem Pflaster innerhalb des Gitters der Königlichen Bibliothek!! (seit wenigstens 30 Jahren); im Thierarzneischulgarten Re.!! bei der Uhlanenkasenne vor Moadit W. M. an der Berbindungsbahn beim ehemaligen Exercierplat Haeckel!! an der süblichen Mauer des bostanischen Gartens in Schöneberg!!

61. S. Sophia L. Schuttftellen, Zäune, Wegränder, sehr häufig. 
† S. strictissimum L. Im Gebiete nicht einheimisch, sonbern nur angepflanzt und halb verwildert B. Im Schönhauser Park
Bauer!!

62. S. Thalianum Gay u. Monnard. Sanbige Meder, Busgel, Grasplute, fehr haufig.

#### 29. Alliária Adans.

63. A. officinalis Andrzj. Schattige Wälber, Gebüsche, nicht selten. B. Sanssouci sehr häufig! Sp. Tegel D. Na. Finstentrug!! am Jägelitgraben Gr.! Linbholz!! Amtsgarten bei Königs-horst!! Gr. Bähnit im Bart!! B. Schönhauser Part!! Französisch Buchholz D. Pante bei ber Chausserfarge Bl. Moabit bei ber Straf-

anstalt Rei. Thiergarten beim alten Chaussechause!! Kreuzberg!! Tempelhof D. Fw. Brunnen Rn. am Schlofigarten!! Hammerthal Rn. Köthen!! Mft. Eisenspalterei; Beitlage; Spechthausen Bch.

#### 30. Erýsimum L.

64. E. cheiranthoides L. Begränder, Zäune, Gartenland, gemein.

65. E. hieraciifolium L. Gebufche, felten. Rur bie Ba-

rietat:

a) strictum Fl. d. Wett. (als Art). Br. Im Gesträuch am nörblichen Ball bes Löhkanals bei Pewesin Sp.! Schr.! P. Pfaueninsel, wohl nur verwilbert Vocke. B. An einem Zaun auf bem Bebbing Körnicke! in einem Garten auf bem Kreuzberg Caspary!! wohl nur zufällig eingeschleppt.

† E. orientale (L.) R. Br. ift von A. Paalzow nur einmal 1853 B. auf einem Acter unweit bes Schifffahrtstanals vor bem Hal-

leichen Thore in einem Exemplar gefunden worden. .

#### † Brássica L.

\* B. oleracea L. In vielen Barietaten in Garten und auf Medern gebaut.

† B. Rapa L.

- a) annua Koch.
  b) oleifera D. C. \ Auf Aedern gebaut.
- c) esculenta Koch. In Garten und auf Aedern nicht felten gebaut; namentlich P. Teltow die berühmten Teltower Rubchen.

d) campestris L. (als Art). Auf Aedern, an Wegen, nicht ielten.

† B. Napus L.

a) annua Koch. b) oleifera D. C. \ Auf Acdern gebaut.

c) Napobrassica (Br. oleracea z. Napobrassica L.)

In Garten gebaut. Außerbem einzeln vermilbert.

† B. nigra (L.) Koch. hier und ba in Garten gebaut. Buweilen an Wegen, Ackerranbern verwilbert. B. Wiesen biesseit Boxhagen J.! Fw. Am Eingange bes hammerthals Rn.!! seit über 10 Jahren; Falkenberg; Amaltenhof Rn.

#### 31. Sinápis Tourn.

66. S. arvensis L. Aeder, febr häufig. † S. alba L. hier und ba in Garten gebaut. Bermilbert

Trebbin: Schulgenborf Gr.! B. Soben - Schönhaufen; Charlottenburg!! Aringerefelbe W. M. R. Kalfbruche beim Alten Grund!!

#### + Erucastrum Presl.

† E. Pollichii Sch. u. Spenn. Stammt aus Sübs und Westbeutschlaub; mit frembem Samen eingeführt und meist bestänsig. P. Bei der großen Fontaine in Sansspuci 1842 Bch.! später wieder verschwunden. B. Graspläte im Thierarzneischusgarten 1858!! und im Lustgarten Rn.!! (an letzterer Stelle seit 1844 beobachtet); Tempelhof am Damm der Berlin-Anhaltischen Sijenbahn 1856!!

#### † Diplotaxis D. C.

† D. muralis (L.) D. C. In Sübbeutschland einheimisch. Mit frembem Samen eingeschleppt: Br. Möglin als Unkraut in Gareten Rn.!

#### 32. Alyssum L.

† A. saxatile L. Stammt aus Mittelbeutschland. Im Gesbiet nur als Zierpflanze und verwilbert B. An Mauern in Sanssfouci und am Drachenberg Bs.!

67. A. montanum L. Sonnige, sandige Sigel, felten. Rur Br. Muhlenberg bei Deet und Gistutenberg bei Gr. Rreug Sch.!

68. A. calycinum L. Sonnige Higel, Grasplätze auf Sandund Lehmboben, zerstreut. Dr. Bei der Plantage Kr. Na. Möthstower Weinberg!! Lw. An der Eisenbahn nach Trebbin hin Gr.! B. Lichtenberg D. Weißensee süblich der Dranke!! Exercierplatz an der Schünhauser Allee Kt. Inwalidenkirchhof Kt.! Hippodrom!! am Damm der Botsdamer Eisenbahn am nördlichen Ende von Schöneberg!! Areuzberg!! Tempelhof D. an der Chausse jenseit Richord Rei.! K. Rübersdorfer Kaktberge!! Alt-Landsverg Gae. Buckow: Pritzgagen Thiele! Rip. Chaussegeiten zwischen der Stadt und dem Kirchhof Beh.!! und vor Sommerfelde Beh.!! zwischen Hohen-Finow und Köthen!! Karlswerker Hittenplatz H.! Biesenthal Schl.

† A. minimum Willd. Im filböstlichen Deutschland einheis misch. AlteCandsberg nörblich von ber Stadt einmal von Gae.! in Menge gefunden, ob noch jest vorhanden? Wohl nur eingeschleppt.

#### 33. Bertéroa D. C.

69. B. incana (L.) D. C. Wegränder, sonnige Hügel, auf Sand und Lehm meist sehr häufig, 3. B. P. An ber Chausse nach Baumgartenbriid!! Berber!! Sp. Tegel Schl. Na. Zwischen Zeesstow und Bredow!! Jahnberge; Seelenhorst H. S. Lw. Freigraben bei Elsthal; Dobbritow Rt.! B. Stralauer Kirchhof Bl. diesseit

Friedrichsfelbe J. Beißensee Keh. Sippodrom!! Kreuzberg!! Rigborf!! Alt-Candsberg Gae. Rft. Rosenberg!!

#### † Lunaria L.

† L. annus L. Stammt aus Gub Europa. Saufige Biers ?: pflanze. Berwildert in großer Menge B. Im herrichaftlichen Gar- ;; ten bei Betwow!!

#### 34. Eróphila D. C.

70. E. verna (L.) E. Mey. Canbige Bugel, Felber, Batber, gemein.

#### † Cochleária L.

† C. Armorácia L. Hier und ba in Gärten gebaut; an Zäunen, Gräben und Wegen verwilbert. Br. In Pewesin!! Weseram!! B. Vor bem Brandenburger Thor Bs. Dr. Rn. Na. Gr. Lw. Zinsnaer Borstadt Rt. Trebbin: Lübersdorf; Schulzendorf Gr.! Zossen Gr. Fw. Zieglerberg Rn. Mst. Am Finowkanal nach Nieder-Finow hin Beh. Tornow!!

#### 35. Camelina Crtz.

71. C. microcarpa Andrzj. Aecker, Begränber, häufig, z. B. B. Mühlenberg Bs. Ra. Königsborst H. S. B. An ber Landsberger Shaussee J. beim Hamburger Bahnhos!! Witsleben Bl. beim Kurfürstendamm Winkler! Kreuzberg!! am Planuser!! zwischen Kirborst und OberRipbors Rei. Alt-Landsberg Gae. Nft Beh.

72. C. sativa (L.) Crtz. Im Gebiete wohl nirgends gebaut, sondern nur auf Aedern, besonders unter Flachs. Nicht häufig. Lw.

Beinberge H. S. II.!

.b) dentata Pers. (Willd.) als Art. Nur unter Flachs, zersftreut. Br. Pewefin Sp. Trebbin: Schulzenborf Gr.! B. Reinickenborf 1857 A. Br.! Wilmersborf früher Rn.! Nft. Tornow!! Karls-werf Bch.

#### 36. Thlaspi Dillen.

73. T. arvense L. Aeder, Wegränder, Grasplätze, zerstreut, zuweilen nur einzeln. P. Reben einer Reitbahn vor bem Jägerthor Bs. Lw. Frankenfelbe Rt.! B. Seegerscher Holzplatz!! bei ber Inngfernheibe Rt.! öftlich von Schmargenborf!! Wilmersborf!! Schöneberg W. M. Tempelhofer Berg westlich von ber Kunheimschen Fabrit!! vor bem Kottbusser Thore auf dem Wege nach den Wiesen!! Tempelhof!! Alt-Landsberg Gae.

In and y Google

#### 37. Teesdálea R. Br.

74. T. nudicaulis (L.) R. Br. Kiefernschonungen, Sanbselber, häusig. B. Brauhausberg Sanio! hinter bem Kirchhof Bs. Sp. Grunewald!! Pichelswerder D. Pichelsberg Bl. Tegel D. Dr. Gae. Na. Brieflang D. Forst zwischen Möthlow und Buschow!! Ew. Bor Lindenberg Rt. Trebbin Gr.! B. Friedrichsselbe; Nieder-Schönsausen D. Jungsernheide!! Spandauer Berg!! westlich von Wilmersborf Bl. Halenbeide W. M. zwischen Treptow und dem Keuen Krug!! A. Woltersdorf!! Alt-Landsberg Gae. Rft. Beh.

#### + Ibéris L.

† I. amara L. Bierpflanze aus Gubbeutichsand. Berwilbert in Garten. B. Charlottenburg; Schöneberg; Ripborf; Brig Rn.

#### 38. Lepídium L.

† L. sativum L. In Garten, feltener auf fleinen Aderftuden

gebaut und zuweilen vermilbert.

† L. campestre (L.) R. Br. 3m Gebiet bisher nirgends beständig gefunden, sondern auf Aedern, Schuttstellen, an Dämmen hospitirend. Sp. Tegel Kth. B. Am Damm der Berlin-Potsdamer Eisenbahn zwischen dem Schiffffahrtskanal und Schöneberg W. M.1 Treptow auf Schutt 1853 Körnicke! Mfl. 3m herrschaftlichen Garten zu Trampe Beh.

75. L. ruderale L. Schuttstellen, Straßenpflaster, an Zäunen und Wegen stellenweise häufig, aber an anderen Stellen fehlend.
Haufig 3. B. P. Bs. Na. Bahnhof H. S.! Pessin Rt. (Im Luche
sehlend.) Lw. Gottow!! In und um B. sehr gemein!! Speren-

berg bei Boffen!!

#### 39. Capsella Vent.

76. C. Bursa pastoris (L.) Mnch. Gartenland, Begranber, Zäune, fehr gemein.

#### 40. Corónopus Haller.

77. C. squamatus (Forskal) Aschs. Dorfftraßen, Straßenspflaster, zerstreut, aber wohl vielsach übersehen. P. Geltow Schp.! Trebbin: In Schulzendorf Gr.! Lw. Rt.! Felgentreu Rt.! B. Beisgensee D. Schöneberg!! Tempelhof auf dem Gutshofe!! Br. Mögslin Rn. Fw. Martt Rn. Rft. Karlswerter Hüttenplat H.

#### 41. Néslea Desv.

78. N. panniculata (L.) Desv. Lehmader, gerftreut. B.

Neder vor bem Brandenburger Thor Bs.! Na. Königshorst: Beders Rachtloppel H. S.! Zw. Trebbin und Schulzendors!! B. Nördlich!! und westlich von Wilmersdorf Bl. Schmargendors!! Zossen Bl.

#### \* Búnias L.

\* B. orientalis L. In Oft- Europa einheimisch. Bei uns nur felten als Futterfraut gebaut. Br. Frankenfelbe Sch.!

#### † Rapistrum Boerh. .

† R. rugosum (L.) All. In Sübbeutschland einheimisch. Rur mfällig eingeschleppt. B. Seegerscher Holzplat A. Br. 1856!

## 42. Raphanistrum Tourn.

79. R. silvestre (Lmk.) Aschs. Meder, febr gemein.

#### † Ráphanus Tourn.

† R. sativus L. In Garten häufig gebaut; an Zäunen, auf Sout nicht felten verwilbert.

## 7. Familie. Cistaceae Dunal.

#### 43. Heliánthemum Tourn.

80. H. guttatum (L.) Mill. Riefernwälber, fehr felten. Mit-

81. H. Chamaecistus Mill. Sonnige Higel, trochner Waldboben, nicht selten, besonders D. Br. Er. Krent; Deet; Bewesin Schr. B. Hügel bei Baumgartenbrild!! Sp. Papenberge; Tegel D. Dr. An der Chausse Gae. Ra. Bredower Forsthaus!! Königshorft am Seelenhorster Danum H.S.! Lindholz!! Jahnberge!! Kremmen: Linum H.! B. Fuchsberge!! Schönhausen D. an der Chausse vor dem Spandauer Bock!! Tempelhof an der blauten Hölle Bl. Rudower Wiesen D. K. Abhänge nörblich der Boltersborfer Schleus!! Müdersdorfer Kalkberge!! Alt-Landsberg Gae. Ast. Karlswert Bch. Br. Berge beim Landhof Sch.! Methorfer Berge Rn.

## 8. Familie. Violaceae D. C.

#### 44. Viola Tourn.

82. V. palustris L. An und in Simpfen, ziemlich verbreitet. Br. Ketzir Gr. Sp. Grunewald zwischen bem Schloß und ber hunbekehle!! Tegel D. Or. Quaden-Germendorf Gae. Ra. Forft westlich ber Haltestelle Finkenkrug!! Ew. Am Fuß ber Renneberge; bei ben Frankenförder Bübnergarten Rt.! Trebbin: Schulzendorf Gr. B. Zwischen den Fuchsbergen und Friedrichsselde Rei.! Hranzösisch Buchbolz; Buch Kr. Jungfernheide bei den Rehbergen!! Möckernig!! im Thiergarten unweit des Königs-Denkmals!! beim Schöneberger Busch Bl. Hasenheide hinter dem Vilainschen Lokal Rei. Treptow D. K. Nach den Müggelbergen hin Gr. Alt-Landsberg Gae. Stortow: Scabb-Luch \*) bei Stansborf H.! Mft. Beh.!

83. V. hirta L. Sonnige hügel, Gebüsche, sehr zerstreut. Br. Pewesiner Nachthütung Sp. Sp. Pichelsberg Rach! Papenberge D. Ra. Jahnberge Rt.! B. Jungsernheibe D. K. Abhänge an ber Ostseite bes Kalkses nahe seinem nördlichen Enbe!! Bossen: Sperenberger Gipsberge!! Budow: Im Elpsium!! Fw. Weinberg Rn. Alaunwerk Rn.!! Schlosberg Rn.! Rft. Sichwerber!! Karlswerk H. Wönchsbride Bch.! Eisenhalterei; Messingwerk H. Biesentbal: Danne-

wit Schl.

84. V. odorata L. Gebiliche, heden, sehr zerstreut. Na. Briesselang Kr. Lw. Linbenberg Th. B. Beißensee an ber Westseite bes Sees J. I im sogenannten Dustern Keller!! K. Tasborf!! In Bucow!! Br. Büchnitz bei Möglin; Methoofer Berge Kn. Hw. Weinberg! Bieglerberg Kn. Maunwert!! Köthen am Wege nach hohen-Finow!! Leberall in Gärten und öfter verwilbert, z. B. H. Sanssouci; Reuer Garten Bs. Or. Schlösgarten Kn. B. In ben Schlösgärten bei Friedrichsselebe!! Nieder-Schönhausen!! Charlottenburg!! am hofjäger!!

85. V. silvestris Lmk. Schattige Wälber und Gebische, wohl nicht selten. B. Sanssouci Bs.! Templin Bs. Ra. Bei ber Anhaltestelle Finkenkrug!! Gr. Bähnitz am Seeuser S. Lw. Renneberge Rt.! B. Fuchsberge am Bache!! Französisch Buchholz Kr. Jungkernheibe!! Thiergarten beim Hofiäger!! Fw. Zwischen hammerthal und Maunwerk!! Paschenberg bei Falkenberg!! Rp. Eichwerber!! Bechteich; Schorsbeibe am Werbellin-See Kr.

b) arenaria D. C. (als Art). Kiefernwälber, sandige Higel, zerstreut. B. Templin Bs. ! Ep. Bichelswerber!! westlich von Tegel am See!! B. Jungfernheibe!! R. Zwischen ben Müggelsbergen und Rahnsbors!! Zossen Bl.

86. V. canina L. Balber, Gebiliche, Bilgel, gemein.

87. V. persicifolia Schk. (erweitert). Feuchte Gebuiche und Biefen, fehr felten.

a) elatior Fr. (ale Art). Feuchte Gebiliche, bieber nur P. Reuer Barten Be.!

<sup>\*)</sup> Das "Sc" in biefem Ramen wird wie bas frangofifche j gefprochen.

b) stagnina Kit. Reuchte Biefen, febr felten. Br. Beferam bei ber Erante am Langmathenbruch Eichberg! Ra. Gelbelang Philippi!

88. V. mirabilis L. Gebuiche, Laubwalber, nur in ber Obergegend, felten, aber gefellig. Frw. Beim Schlofigarten Rn.!! Dft.

Eichmerber Beh.!!

89. V. tricolor L. Meder, Wegranber, Sügel, gemein.

## Familie Resedaceae D. C.

#### † Reséda L.

† R. alba L. Bierpflanze aus Gub-Europa, vermilbert. † R. lutea L. In Mittelbeutschland einheimisch: bei uns nur eingeschleppt auf Aedern. Ra. Königshorft in Beders Nachtfoppel H. S. /\*) - B. Schöneberg unweit bes botanischen Gartens Rn. 1846!

Br. Bei ber Batlower Mible Rn. 1858!

† R. luteola L. Bei uns nirgende ficher milb, fonbern mobil. uur an Begen, auf Schutt verwilbert; öfter unbeständig. Ra. Tremmen Sp. B. Friedrichsfelbe; Weißensee; Rieder-Schönhausen D. beim hamburger Bahnhof in ber heibestraße!! Kreuzberg D. am Köpnider Thor W. M. an ber Chaussee jenseit Treptow 1853!! Alt-Landsberg Gae.

## 9. Familie. Droseraceae D. C.

#### 45 Drósera I.

90. D. rotundifolia L. Torffümpfe, sandiger Moorboben, micht selten. Br. Bewefin Sp. B. Nuthewiesen Bs. Al. Machenow D. Schönow Kr. Sp. Grunewald!! Spandauer Beibe; Tegel D. Dr. Gae. B. Zwifden Beigenfee und Soben = Schonbaufen A. Br.! in ber Rabe ber Stettiner Gifenbahn beim Gefundbrunnen!! Jungitriheibe!! zwischen Tempelhof und Mariendorf öftlich ber Chaussee!! Aubower Biesen!! Alt-Landsberg Gae. Stortow: Scabp-Luch H.! fw. Sonnenburg Sch.! Rft. Zwischen bem großen und kleinen See Beh.!! Nieber-Finow Kirchner. Biesenthal: Sumpfwiesen nach Lanke bin A. Br.

91. D. anglica Huds. Torffumpfe, viel feltener als bie bo-

<sup>\*)</sup> An biefem Standorte finden fich eine Angahl bei und fonft fehr felten ober gar nicht, bei Magbeburg aber haufiger vorkommender Pflanzen, welche wohl idenfalls aus bortiger Gegend mit fremder Saat eingeschleppt find.

rige, aber gesellig. B. Al. Machenow D. Sp. Zwischen bem Schloß Grunewald und ber Hundekeste!! Beelit: Elsholz Krumbholz. B. Jungfernheibe O. Jaenicke. K. Am westlichen Ende bes Bernsborsfer Sees Jahn! Tasborf D. Rft. Biesenthal: Sumpswiesen nach Lante hin A. Br. zwischen bem großen und kleinen See Beh.!! Niesberskinow Kirchner.

92. D. intermedia Hayne. Torssümpfe, sandiger Moorboben, selten, aber gesellig. B. Kaput H.! B. Jungsernheibe am Schiffshrtstanal Jahn!! und östlich am Pfefferluch Schp.!! Charlot-

tenburg am Soblen Gee W. M.! R. Teufelsfee Kornicke.

#### 46. Parnássia Tourn.

93. P. palustris L. Feuchte, besonders moorige Biesen, sehr häufig.

## 10. Familie. Polygalaceae Juss.

#### 47. Polýgala L.

94. P. vulgaris L. Trodne Balber und Wiesen, Hügel, häufig, 3. B. P. Hinter bem neuen Palais Bs. Br. Gr. Kreut: Eistutenberg Schr. Na. Königshorst H. S. Aremmen: Tietow!! B. Huchsberge!! Jungfernheibe!! bei ber Steglitzer Schäferei Bl. Hassenheibe W. M. A. Erkner!! Br. Landhof; Methorfer Berge Rn.
95. P. comosa Schk. Wie vorige, nicht so häufig, aber ge-

95. P. comosa Sohk. Wie vorige, nicht so häusig, aber geseslig. P. Am Wildpark!! Sp. Tegel D. Na. Große faule Lake beim Kinkenkrug!! am süblichen Kande bes Lindholzes!! Tremmen: Niebebe Schr. Kremmen: Linum H.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Wiesen zwischen ber Stralauer und Franksurter Chaussel!! nordklich von Kranzösisch-Buchholz!! zwischen Pankow und bem Schön-hauser Park!! Schöneberger Buschwiesen Bl., Schp.! Rudower Wiesen!! K. Rübersdorfer Kalkberge!! Wr. Verge (blaublühend) Sch.! Mp. An den Leuenberger Wiesen; Drehnit Bch.! an der Chaussezwischen Fommerselbe und Tornow Bch.!!

96. P. amara L. Trodne Biefen, febr felten. Ra. Rhinluch

H.! R. Bei ben Rübersborfer Kaltbergen Beyrich 1828!

## 11. Familie. Silenaceae Juss.

#### 48. Gypsóphila L.

97. G. fastigiata L. Trodne Canbhilgel, Riefernwälber, febr gerftrent. P. Silgel an ber Griebnit gegenüber Turdohof Bs. !

Or. Quaben-Germendorf auf Anhöhen am Wege nach Behlefanz Gae.! Ra. Forst bei Pausin Gr.! Lw. Bor ben Rauchenbergen Rt.! zwissen Frankenselbe und Gottsborf Rt. B. Am Wege von Ober-Rixborf nach bem Neuen Krug!! Stortow: Friedersdorfer Forst beim kleinen Scaby-Luch H. Buckow: Bei der Eichendorfer Mühle Sch.! Mft. Beim Turnplatz Bech.! zw. bem kleinen See u. d. Eisenbahn und am Eisenbahnbann Beh. Erreicht hier ihre nordwestliche Grenze.

am Eisenbahnbamm Beh. Erreicht hier ihre nordwestliche Grenze.

98. G. muralis L. Sandige Lehmäder, zerstreut. P. Um Wege vom Templin nach Kaput Bs. Zehlendorf!! Or. Kr. B. Bei der Kolonie Hohen-Schönhausen!! Weißensee!! bei der Jungsernseide; Charlottenburg D. Schmargendorf!! Wilmersdorf; Steglit D. Lankwit A. Br. ! Tempelhof!! K. Friedrichshagen; Müggelheim Gr. dei den Kübersdorfer Kalkbergen Gs.! Alt-Landsberg Gae. Rft. Zwischen dem Bahnhof und Zainhammer; Rosenberg Beh.! Biesensthal: Bahnhof; Lanke Jahn!

#### 49. Túnica Scop.

99. T. prolifera (L.) Scop. Trodne Hügel, Wegränder, zerstreut. Br. Deeter Mühlenberg Schr. P. Drachenberg Bs. Baumsgartenbrück Rach.! Ravensberge Schp. Grunewald D. B. Auf dem Exercirplat an der Schönhauser Allee J.! Steglit D. Kreuzberg!! Singang des Einschnitts der Anhaltischen Eisenbahn W. M. Tempelshof D. Rollberge!! A. Rübersdorfer Kaltberge Gr.! Tasborf Schl. Alt-Landsberg Gae. Zossen: Sperenberger Gipsberge!! Bucow: Beim Försterhause Bl. Hw. Monte Caprino; Belvedere; Paschenberg Rn. an der Chausse ibergkaltenberg!! Rp. Drachentopf nach Sommerfelde hin Bch. Strudenberg bei Karlswert H.

#### 50. Dianthus L.

† D. barbatus L. Bierpflanze aus Gubbeutschlanb; jumei-

len verwilbert, 3. B. B. Thiergarten !!

100. D. Armeria L. Higel, Gebilche, sehr zerstreut. Alt-Landsberg Gae.! An ber Berlin-Müncheberger Chausse jenseit Tasborf Nolte. Blumenthal Bouche! Br. Büchnit bei Möglin Rn. Fw. Atazienberg!! Zieglerberg Rn. Schlofberg!! Rft. Eichwerber Bch.!

101. D. Carthusianorum L. Sonnige Bugel, trodne Bal-

ber, fehr häufig.

102. D. deltoides L. Erodne Balber, Biefen, Begranber,

nicht felten.

b) glaucus L. (als Art). Na. Bei ber Haltestelle Fintenstrug Rei. B. Tempelhof an ber Anhaltischen Eisenbahn W. M.!

103. D. caesius Sm. Sonnige Higel, bisher nur bei Fw.,

bort aber nicht selten. Rothe Land; Fischerthal fehr häufig; Afazienberg Rn. am westlichen Abhange ber Schlucht süblich vom Alaunwerf Sch., Rn.!! Uhrenbstehle Rn. Zuerft von H. entbedt. Säufig

in Garten.

104. D. superbus L. Wiesen, Lautwälber, besenders in den Flusniederungen des westlichen Gebiets häusig, sonst selten oder sehrlend. Br. Havelwiesen Schr. Bagow Sp. B. Unter den Sichen in Sanssouci Schp.! hinter dem neuen Palais; zwischen Krampnitz und Korbeck Bs. Sp.; Heiligense D. Na. In und an der Bredower Forst!! beim Weinderg!! Lindholz!! Fredenhorst und Seelenhorster Damm bei Königshorst H.S.! Rhinluch H.! N. B. Wiesen zwischen der Stadtmauer und Borhagen!! Friedrichsselber Park!! Französisch Buchholz Kr. Reinickndorst!! Witmersdors D. Wiesen an der Eisenbahn dieseit Schenberg!! Schöneberger Buschwiesen Bl. Rudower Beisen!! Treptow Bl. K. Dahlewit H. Alt-Landsberg Gae. Zossen: Süblich von Sperenberg!! Bucow: Eicendorster Mühle Sch.! Rst. Kinowthal; Weidendamm Bch. Biesenthal nach Lank bin A. Br.

#### † Saponária L.

† S. officinalis L. Im Gebiet nicht einheimisch, sonbern früher vielsach in Gärten; jett nicht selten an Zäunen verwildert. B. Reuer Garten und baran stoßende Zäune; Eiche Bs. Drewitg Gr.! Dr. Gae. Na. Königshorst an der Fasanerie (gefüllt) H. S.! Lw. Frantenselbe Rt.! B. Friedrichsselbe D. Weißensee Rei. an der Osteset des Exercirplates vor dem Schönhauser Thor!! Pantow D. an der Eisenbahn am Nordrande von Neu-Schöneberg W. M.!! R. Rübersborser Kalkberge D. Fw. Hammerthal; Maunwert; Broigsborf Rn. Rft Kirchhof!! Gartengassen!! Schützenhaus; Warbecks Mühle Bch. Hohen-Finow H.

#### 51. Cucúbalus Tourn.

105. C. baccifer L. Gebuiche, felten. Bisher nur Br. Upftall bei Schulzenborf; Möglin Rn.

#### 52. Viscária Roehl.

106. V. viscosa (Gil.) Aschs. Laubwälber, trodne Wiesen, gerstreut. P. Sanssouci unter ben Eichen Schp.! Sp. Pichelsberg Bl. Bichelswerber D. Papenberge Thiele! Tegel D. Schulzenborf Rei. Na. Brebower Forst!! Lindholf Schr. B. Jungsernheibe Königsbamm!! Rubower Wiesen!! Neuer Krug W. M. A. Abhänge nörblich ber Woltersborfer Scheuse!! Alt-Landsberg Gae. Strausberg: Blumenthal an der Chaussekerg. Budow: Prithagen Thiele! Fw. Ruinenberg Rn. Rs. Beim großen Schlangenpsuhl Bch.

#### 53. Siléne L.

107. S. venosa (Gil.) Aschs. Laubwälber, Weg- und Wiessenränder, nicht selten. P. Am neuen Drangeriehause; Ruinenberg Bs. Sp. Papenberge; Tegel D. Dr. Germenborf Gae. Ra. Bei ber Hattestelle Finkentrug!! Bredower Forst!! Lindholz!! Sandhorst bei Königshorst!! Trebbin Gr.! B. Friedrichsselbe W. M. Chausse vor Pantow Rei. Jungsernheibe D. Charlottenburg Bl. Thiergarsten!! Wiesengberg heiser bieseit Siphorst!! Teptow D. K. Nibersdorfer Kalkberge!! Rft. Beh. Desters auf Graspläten ausgesäte. B. Friedrichshain!! Lustgarten!! um die Petri-Kirche!! Belle-Mlianceplat W. M.

† S. conica L. Sandige Aeder, sehr setten. Nur B. An der Chausse entsbedt, seitdem jährlich in Menge!! jedenfalls aus Sübbeutschland aus

fällig eingeschleppt.

108. S. nutans L. Trockne Bälber, sonnige hügel, nicht selten. P. Brauhausberg Bs. Sp. Pickelsberge!! Grunewald an der frummen Lanke!! Papenberge; Tegel D. Dr. Germendorf Gae. Dammsmühle Kr. Na. Bredower Forst!! zwischen dem Sankfrug und Barnewity!! \*) Lw. Kenneberge Rt. Treddin: Scharfendrilder Forst Gr.! B. Fuchsberge W. M. Friedrichshain J.! (wohl jedensells ausgesäet) Jungsernheide!! beim Spandauer Bock!! beim hollen See!! Hasenbeide!! Br. Batlower Mühle Thiele! Hw. Süblich vom Maumwerk!! Paschenberg!! Aft. Brunnen!! Turnplat Bch. Wald nach Sommerselbe hin!!

109. S. chlorantha (Willd.) Ehrh. Wie vorige, sehr zerstreut. B. Walbrand an ber Griebnit bei Kl. Glienicke Bs. Nistolskoe Bs. Sp. An einer Shanze nordwestlich der Stadt!! Bamberge bei Heiligense Bl. Dr. Birkenwerder Kn.! Trebbin: Löwensborfer und Ahrensborfer Walb Gr.! B. Sübrand der Jungsernsheibe Kn.! K. Rübersborf am Gipsbruch Kn. Wr. Berge beim Landhof Sch.! Batlower Berge Schl. Fw. Monte Caprino; Atazienberg Kn. Mft. Am kleinen See Bch.! Biesenthal bei der hell-

muble A. Br.! Erreicht hier ihre Grenze nach Rordweften.

110. S. Otites (L.) Sm. Sonnige Saibhugel, Kiefernwälber, sehr häufig, z. B. Baumgartenbrild!! Sp. Alte Schanzen nordwestslich ber Stadt!! Bichelsberg Bl. hundefehle W. M. Na. Weinberg; Paulinenau H.S. Jahnberge!! Beelig Bl. Lw. Weinberge Rt.! Trebsbin Gr.! B. Huchsberge J.! westlich von Wilmersdorf Bl. Ha-

<sup>\*)</sup> Das "e" in biefem Ramen hat ben Eon .

enheibe W. M. bieffeit Rirborf!! R. Zwischen Woltersborf und ber Schleufe !! Rubersborfer Kaltberge !! Fm. Leuenberg Bl.

† S. gallica L. Im Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur zusällig mit frember Saat verschleppt ober als Untraut in Garten. Zehlenborf unter Ornithopus sativus Brotero 1858!!

b) quiquevulners L. (als Art). P. Charlottenhof Schp.! Trebbin: Schulgenborf Gr.! Frw. Garten bes Algunwerks Rn.! in

Mt-Ranft Rn.

c) anglica L. (als Art). Br. In Garten zu Möglin Rn.! + S. pendula L. Zierpflanze aus Gib-Europa; verwilbert B. Lanbesbaumschule 1852 Filly!\*) B. Schöneberg an einer Gartenmauer Bl.!

†. S. Armeria L. In West- und Sübdeutschland einheimisch; häusige Zierpstanze. hier und ba in Menge verwildert, aber selten beständig. B. Bs. Psaueninsel Vocke. B. Aecker bei Witzleben 1846 Dr. Lambert! K. Aecker am Nande der Forst an der Straße nach Mummelsburg 1851!! Zossen, Teupitz Gr.

## 54. Melándryum Roehl.

111. M. album (Mill.) Gke. Begranber, Saubfelber, Bilgel, gemein.

† M. rubrum (Weigel.) Gke. 3m Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur als Zierpflanze. Bollfiänbig verwilbert B. Reuer Gar-

ten Bs.! B. Thiergarten beim hoffager, fehr zahlreich Bl.!!

112. M. noctiflorum (L.) Fr. Lehmäder, Gartenland, sehr zerstreut, theilweise wohl nur eingeschleppt. P. Sanssouci beim japanischen Hause Weiland! Dr. Friedenthal Kr. Na. Königshorft in Beders Nachtsoppel H. S.! Trebbin: Aeder bei Schulzendorf Gr.!! B. Wilmersdorf Bouché! Groß-Ziethen Rn.! Hw. Gärten in Altsnaft; Algunwert Rn. RR. Karlswert: Hoben-Kinow Beh.!

#### 55. Coronária L.

113. C. flos cuculi (L.) R. Br. Feuchte Wiesen, gemein. † C. tomentosa A. Br. Zierpflanze aus Gub: Europa; qus weilen verwilbert. Lw. An Zannen ber Pratoriusschen Kabrit 1855!!

## 56. Agrostemma L.

114. A. Githago L. Meder, besonders unter Roggen, gemein.

<sup>\*)</sup> Beitichrift für bie gesammten naturmiffenschaften 1854 S. 441 irrig ale S. procumbens Murr. aufgeführt.

## 12. Familie. Alsinaceae D. C.

## 57. Sagina L.

115. S. procumbens L. Feuchter Sanbboben, Aeder, Gra- ben, febr häufig.

116. S. apétala L. An benfelben Stanborten wie vorige, sehr felten, aber wohl vielfach überfeben. Bisber nur B. Charlottenburg D.!

117. S. mod o sa (L.) Bartl. Moorboben, feuchte Gräben, Simpse, nicht selten, z. B. Sp. An ber Havel bei Pichelsberg!! Grusnewald!! Ra. Bredomsches Borwert!! Paulinenau!! Königshorst H. S.! Lw. Nach Gottow hin Rt. Berkenbriick H. S. II.! B. Biesenwege zwischen ber Stadtmauer und Borhagen!! Rummelsburg Bl. Kolonie Hoben-Schönhausen ind Borhagen!! Rummelsburg Bl. Kolonie Hoben-Schönhausen II. Weißense Rei! Jungsernheibe W. M.! Schöneberg Bl. Tempethof Rei. Ober-Rixbors!! Köpnicker Beg biesseit bes Neuen Kruges W. M. Br. Wiesen beim Spring Sch.!

## 58. Spérgula L.

118. S. arvensis L. Sandige Aecker und Wege, gemein.
b) sativa v. Boenninghausen. (als Art). Hier und da als Futtergewächs gebaut.

119. S. Morisonii Boreau. Sandige Kiefernwälber, besonbers Schonungen, nicht selten. B. Katharinenholz Schp.! Sp. Grunewald; Pichelsberg D. Walb nörblich vom Forsthause Dammsbrilde!! Or. Gae. Na. Börnick N.! Forst zwischen Möthsow und
Buschow!! B. Rummelsburg D. Jungfernheibe!! Spandauer Berg!!
Hafenheibe Schp.! ienseit Treptow!! K. Mahlsborf Kr. bei ben Milggelsbergen!! Alt-Landsberg Gae.

## 59. Spergulária Presl.

120. S. campestris (L.) Aschs. Wegränder, sandige Kiefernwälber, nicht selten, z. B. Na. Paulinenau H. S. B. Theerosen bei Kohlhasenbrild W. M. Ew. Rach Felgentreu und Gottow hin Rt. B. Zw. Moabit und Jungsernheide!! Schöneberg Bl. Neuer Krug!!

121. S. marina (L.) Gke. Graben, Wegranber, nur auf Salzboben. B. Uet am langen Damm Oenicke! Na. Damm zwischen ber Brebower Forft und Zeeftow Schr.!! Damm zwischen bem Nauener Weinberg und. Dreibrilden, unweit bes ersteren H. S.!! beim Selbelanger Jägerhause!! zwischen bem Lindholz und Mangelshorft H. S.! T. Salzbrunn P.

#### 60. Alsíne Wahlenb.

122. A. viscosa Schreb. Sanbig-sehmige Aeder, Higel in D, zerstreut, aber sehr gesellig. B. Pfauen-Insel Bs.! Zehlendors!! Sp. Tegel D. Dr. Duaden-Germendors Rn.! B. Weißensee siblich der Dranke!! Charlottenburg Bauer! nordwestlich von Wilmersdord Schp.!! Steglit D. zwischen Tempelhof und ber Anhaltischen Eisensbahn Garcke!! zwischen Tempelhof und Lankvitz Sanio! K. Tasbors D. Wr. Um Steig nach Möglin Sch.! Mögliner Ader am Katzensee Rn. Methorfer Berge Schl.

## 61. Moehringia L.

123. M. trinervia (L.) Clairv. Laubwälber, Gebiliche, nicht selten, 3. B. Sp. Bapenberge Schl. Ra. Briefelang! B. Friebrichsfelber Bart W. M. Thiergarten!! Boffen: Gubmeftl. von Sperenberg!

## 62. Arenaria L.

124. A. serpyllifolia L. Meder, Bugel, gemein.

#### 63. Holósteum L.

125. H. umbellatum L. Sügel, Begranber, Brachader, gemein.

### 64. Stellaria L.

. 126. S. nemorum L. Feuchte, ichattige Lauhwälber, fehr felten. Dr. Angeblich bei Falfenthal, Liebenberg, Lehnit, Schmachtenhagen Kr. Lw. Elsthal Rt.!

127. S. media (L.) Vill. Meder, Gebuiche, Beden, Begran-

ber, fehr gemein.

128. S. Holóstea L. Laubwälder, nicht häufig. P. Sansfouci Bs.! am Nordrand des Wildparks!! Sp. Papenberge D. Or.
Kreuzdruch; Schmachtenhagen Kr. Na. Briefelang!! Lw. Renneberge Rt.! Trebbin: Scharfenbrücker Forst Gr.! B. Französisch
Buchholz D. Thiergarten bei den Zelten und beim Hofjäger!! nördlich vom zoologischen Garten!! Alt-Landsberg Gae. Fw. Hammerthal Kn.!! Nft. Schützenhaus!! Brunnen Beh. Cichwerder!! Chorin;
Bechteich Kr.

129. S. glauca With. Sumpfwiesen, nicht selten, z. B. P. Kriedrich-Wischelmsbride Vocke! Kremmen: Tiegow!! Linum H.1 B. Lichtenberger Kiety!! Beißensee J.! nordöstlich von Französisch Bucholz!! Jungfernheibe!! Wisseben Rei. nördlich von Wilmersdorf W. M.! Schöneberger Fenn Bl. Tempelhos!! Wiesen vor dem Kottbusser Thor!! Rubower Wiesen Rei.! Br. Reichenberg Sch.!

130. S. graminea L. Gebüsche, Graben, Begrander, hanfig. 131. S. uliginosa Murr. An Graben, Sümpsen, zerstreut. B. Bei ber Friedrich-Wilhelmsbrücke Vocke! Sp. hundekehle!! Ew. Am Bege nach Gottow Rt.!! B. Beißensee am Psuhl nördlich vom Chaussechanse Rei.! in der Nähe der Dranke A. Br.!

132. S. crassifolia Ehrh. Torffünnfe, sehr zerstreut, boch meift gesellig. Sp. Zwischen bem Rhinmeister-See und Paulsborn sehr häusig!! am nördlichen Ende des Grunewald-Sees!! B. Jung-ternheibe im Sumpf silblich vom Kanal westlich vom Plögense!! Busch-trug Thiele! K. Tasborf D. Br. Batlower Luch Sch.! Rft. Zwischen großen und kleinen See; Drehnit Beh.! Biesenthal am Bege nach Lanke.

#### Moénchia Ehrh.

M. erecta (L.) Fl. Wett. Aeder, sehr selten und schwerlich einheimisch. Na. Gr. Bähnitz einmal von Walter zahlreich gesunben, später nicht wieder.

#### 65. Malachium Fr.

133. M. aquáticum (L.) Fr. Feuchte Gebiische, Laubwälsber, banfig.

## 66. Cerastium L.

134. C. glomeratum Thuill. Graben, feuchte Gebuiche, Aefler, jehr zerstreut. Sp. Tegel Jablonsky. Ra. Briefelang Baner.! B. Stralau; bei ben Fuchsbergen Bouché! zwischen Rixborf und Johannisthal Bauer!

C brachypétalum Desportes. Abbange, sonnige Bugel, febr felten. Bisber nur: Fm. Schloftberg ehemals Sch.l (Außerhalb

ber Grenze am Oberdamm bei Reu-Tornow Sch. !)

135. C. semidecandrum L. Connige Bugel, trodue Bal-

ber, Brachader gemein.

b) glutinosum Fr. (als Art). An ähnlichen Orten, selten, aber wohl mehrsach übersehen. Br. Ketzilr auf bem Werber Schr.! Gr. Kreuter Kiefern westlich vom Wege nach Deet Schr.!

136. C. caespitosum Gil. Begranber, Balber, Graben, gemein.

137. C. arvense L. Trodne Grasplätze, Balbranber, febr baufig.

# 13. Familie. Elatinaceae Cambessèdes. 67. Elátine L.

138. E. Hydropiper L. Am kahlen, schlammigen User stehenber Gewässer und innerhalb berselben, selten, oft unbeständig. B. Weißensee am Psuhl nörblich vom Chaussechause!! an ber Oranke am süblichen User!! Tempelhof an einem Psuhl nörblich von ber Chaussee nach Marienbors!!

139. E. hexandra D. C. Wie vorige, selten und unbestäubig. B. Weißensee an einem Pfuhl nörblich vom Chausseehause 1851!!

feitbem nicht wieber; an ber Drante 1858 febr viel!!

140. E. Alsinastrum L. Wie vorige, weniger selten. B. Am Saupsubl vor bem Königsthor Jahn! Beißensee an bem Pfuhl nördlich vom Chaussell: Tempelhof an mehreren Pfühlen!! Cantwit A. Br.! Gr. Ziethen v. Chamisso! Br. Batlow Sch.!

# 14. Familie. Linaceae D. C.

#### 68. Linum L.

\* L. usitatissimum L. 3m Gebiete nicht fehr häufig gebaut. An Aderranbern, auf Schutt nicht felten in einzelnen Exemplaren.

141. L. catharticum L. Sumpfwiesen, Graben, baufig.

## 69. Radíola Dillen.

142. R. multiflora (Lmk.) Aschs. Feuchter Sanbboben, besonders in Gräben und auf Aedern, zerstreut. P. Wildpark Schp. Heibe bei der Griebnitz Bs. Gr. Glienick Vocke. Sp. Heiligensee; Tegel D. Or. Gae.! Ra. D. Paulinenau Rt.! Beelig: Elsholz Krumbholz. T. Berghorst P. L. Benseit der Ziegeleien Rt. zwischen dem Vorsthause Lindhorst und Gottow!! Trebbin: Zelle bei Schulzendorf Gr. B. Beim Hegemeister!! Kolonie Hohen-Schöhausen!! nördlich von Weißensee!! in einer Vertiesung dei der Pankstraße!! Jungsernheide; Charlottendurg D. westlich von Schöneberg Schp.!! Tempelhos!! Br. Baylow Sch.! Nst. Vor Macherslust an der Oberberger Chaussee Bch.

## 15. Familie. Malvaceae R. Br.

#### 70. Malva L.

143, M. Alcea L. Gebuiche, Beden, Walbranber, fonnige Sugel, befondere in D, gerftreut. Br. Bewefin Schr. B. Bornftebt Sp. D. Dr. Kr. Ra. Brebower Forfthaus einzeln!! Gr. Bahnit Gr.! B. Friedrichsfelbe; Beigensee D. Tempelhof, in einer Bede füblich vom Dorfe Rei. R. Rübersborfer Raltberge Schl.! Alt-Landsberg Gae. Boffen: Sperenberg bei ber Winbmuble, auch weißblübenb!! Budom Bl. Br. Lanbhof; Schulzenborfer Upftall; Buchnit bei Doglin Rn. Frw. Ruinenberg!! Schlogberg Rn.!! Faltenberg Beh. Mft. Mühlteich bei Boben-Finow H.

144. M. silvestris L. Baune, Dorfftragen, baufig.

+ M. mauritiana L. Seltnere Bierpflange aus Gub-Guropa. Sier und ba verwilbert. Dr. Rn. B. Tempelhof Rn. R. Rüber8borf Rn. Fm. Sammerthal Rn. Mft. Rieder-Finom Rn.

+ M. crispa L. Stammt aus bem Drient. Bier und ba in Dorfgarten und aus benfelben verwilbert. B. Templin Sp. Fm. Beinberg; Maunmert; Amalienhof Rn.

+ M. verticillata L. In Afien einheimifch. Gelten in Gar-

ten. Bermilbert: Gp. Caatwintel Kornicke!

145. M. neglecta Wallr. Begranber, Dorfftragen, gemein. 146. M. rotundifolia L. Bie vorige, viel feltener. Br. In Saringen, jest verschwunden Schr.! Gp. Rubleben Kr. Beeftow!! B. Malchow Kornicke!! Schmargenborf C. Bouche!! Schoneberg Kornicke!! Frm. Rothen Rn. Rft. Chorin auf bem Umtebof!!

#### 71. Althaea L.

147. A. officinalis L. Graben, Baune, gerftreut, gern auf Salzboben; theilmeife mohl nur vermilbert. Br. Bewefin Schr. Deferam Schr.!! Garingen; Rostow Schr. B. Grube Kornicke! Gp. Kaltenhagen Kornicke. Beiligenfee D. Tegel früher W. M.! Benningsborf bieffeit ber Brude links Beh.! Ra. Rachttoppel bei Rubborft H. S.! E. Salgbrunn an ber Quelle Lo! Rn.! Rt.! Trebbin: Schulgenborf an ber Beftfeite Gr.!! B. Blantenfelbe R. Alt-Lanbs-Jack to find berg Schoen. Mittenwalbe nach Ragow bin Gr.

A. rosea (L.) Cav. Baufige Bierpflanze aus Afien.

## 16. Familie. Tiliaceae Juss.

#### 72. Tília L.

† T. platyphylla Scop. 3m Gebiete mir nicht ale einhei-

mifch befannt, fonbern nur an Stragen u. f. w. angepflangt.

148. T. ulmifolia Scop. Laubwälber, sehr zerstreut; oft nur strauchartig. Sp. Tegel Schl. Ra. Bredower Forst!! Lindholz!! (wie bieser Name beweist, schon seit Jahrhunderten). Fw. Schl. Biesensthal: Lanke Schl. Angepflanzt nicht so häufig als die vorige.

# 17. Familie. Hypericaceae D. C.

73. Hypericum L.

149. H. perforatum L. Trodne Balber, Gebüsche, gemein. 150. H. quadrángulum L. Laubwalber, Gebüsche, zerstreut. Sp. Papenberge; Tegel D. Na. Brebower Forst!! Lindholz sehr häufig!! B. Nördlich vom zoologischen Garten!! und süblich von bemselben am Bege uach Bilmersbors!! Alt-Landsberg Gae. Fw. Falkenberg Kirchner. Rft. Chaussegraben ber Berliner Chaussee biesset bes Meilensteins; Lenenberger Wiesen Beh!

151. H. tetrapterum Fr. Graben, Bace, Ufer, nicht felten. Ra. Stadtforst!! Em. Bürgerbusch Rt.! B. Friedrichsselbe im Part!! vor ber Jungfernheibe!! Charlottenburg am hohlen See Kornicke! Graben ber Wiese biesseit Schöneberg an ber Potsbamer Eisenbabn!!

Tempelhof!! zwischen bem Bufchtrug und Ober-Rirborf!!

152. H. humifusum L. Feuchter Sanbboben, besonbers auf Medern, zerstreut. B. Ravensberge Bs. Sp. Bichelsberg Kth. Grusnewald; Heiligensee D. Tegel Schl. Or. Gae. Beelit: Elsholz Krumbholz. Lw. Hinter von Ziegeleien Rt. ! zwischen Frankenförde und Billichendorf Rt. B. Weißensee!! Wilmersdorf D. Schöneberg; Steglit Bl. Lankewit A. Br. Tempelhos!! beim Forsthaus Ober-Wirsdorf!! K. Mibersdorfer Kaltberge Bl. Alt-Landsberg Gae. Zossen: Zwischen Sperenberg und Kummersdorf!! Bernau Bch. Mst. Somsmerselbe; Karlswert Bch. Helberg Bl.

153. H. monta um L. Trodne Balber, Bigel, zerftreut. B. Brauhausberg Bs. Ravensberge Schp.! Sobes Savelufer bei Distolstoe Bs.! Gp. Bichelsberg beim Teufelsgraben!! \*) Papenberge

<sup>\*)</sup> So nenne ich ber Rurge megen bie vom Teufelsfenn nach ber Savel berabfuhrenbe, ben Abzugegraben bee Fenns enthaltenbe Schlucht; einen Ramen fant ich fur biefelbe auf feiner Rarte.

Thiele! Tegel D. Or. Jenseit Lehnitz Kr. Na. Bredower Forst!! Lindholz!! B. Jungsernheibe!! Hasenheibe einzeln W. M. K. Zwisshen Erkner und Woltersborf W. M. Nübersborser Kalkberge!! Bosgelsborf Kth. Alts-Landsberg Gae. Storkow: Friedersborser Forst H. Fw. Beinberg!! Schloßberg Rn.!! Rft. Beh.

## 18. Familie. Aceraceae D. C.

#### 74. Acer L.

\* A. tataricum L. Bierftrauch aus Gilboft-Europa.

154. A. Pseudoplatanus L. Laubwälber, felten. Ra. Bresbower Forst in bem abgetrennten Theil nach Brebow bin strauchsartig!! hier und ba an Strafen u. f. w. angepflanzt.

† A. dasycarpum Ehrh. Stammt aus Norbamerita. Sier

und ba angepflangt; verwilbert B. Pfauen-Infel Bt.

\* A. saccharinum L. Stammt aus Rorbamerita. Gel-

tener angepflangt, 3. B. B. Sasenheibe Schp.

155. A. platanoides L. Laubwälber, felten. Na. Briefelang, nur ftrauchartig!! Fafanerie bei Königshorst!! Säufig an Stragen u. f. w. angepflanzt.

156. A. campestre L. Laubwälber, sehr zerstreut. Sp. Tegel D. Ra. Briefelang!! Bredower Forst!! Habnberge!! Fasanerie

bei Königshorft!! Seltener angepflangt.

## \* Negundo Mnch.

\* N. aceroides Mnch. Zierbaum aus Norbamerita.

# Familie Hippocastanaceae D. C.

## \* Aésculus L.

\* A. Hippocastanum L. Stammt aus Oftindien; jetzt an Begen, in Dörfern und Städten überall gepflanzt.

# Familie Ampélides H. B. K.

## \* Ampelopsis Michaux.

\* A. quinquefólia (L.) R. u. Schult. Stammt aus Nordamerika. Zu Lauben u. s. w. häufig angepflanzt.

#### \* Vitis L.

\* V. vinifera L. Stammt aus Gild-Europa? Im Gebiete fehr häufig an Spalieren und auch in Bergen tultivirt, boch nur ber Trauben wegen. Besonbers gablreich P. Bei Werber.

# 19. Familie. Geraniaceae D. C.

## 75. Geránium L.

+ G. macrorrhizum L. Bierpflanze aus Gubbeutschlanb.

Berwilbert Dr. Schlofigarten Rn.1

157. G. pratense L. Fruchtbare Wiesen, sehr zerstreut, vielleicht theilweise verwilbert. B. Bei Stansborf Schoen. Dr. Kr.
Na. Sandhorst H. S. 1 B. Wiesen jüblich von der Chaussee nach Friedrichsselbe, diesseit des Chausseehauses J. 1! Rst. Schleifmühle (wohl
nur verwildert); Graben der Chaussee nach Sommerfelde Bch.

158. G. palustre L. Feuchte Gebüsche, nicht selten, z. B. Br. Bewesin am lögkanal! B. Teltow Bl. Sp. Tegel D. Na. An der Eisenbahn westlich von der Hattestelle Finkenkrug sehr viel!! Lindholz Schr. Dechtow H. S. Gr. Bähnig Schr. Lw. Beim nördlichen Kirchhos; Felgentren Rt.! Trebbin: Zwischen Schlzendorf u. Reuendors!! B. Biesen diesseite Friedrichsselbe J.1 und dei d. Kuchsbergen!! Friedrichsselbe!! Jungsernheide D. Wiesengräben diesseit Schöneberg sehr viel!! bei Ober-Kirdors!! Reuer Krug Rei. K. Tasborf D. Alt-Landsberg: Eggersdorf Bl. Nst. Brunnen!! Rogäser Milbsel!! Biesenthal A. Br.! Lanke A. Br.

† G. pyrenaicum L. Im Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur früher als Zierpflanze kultivirt, jest verwilbert B. Charlottensburg: Graspläte um die Lirche Ascherson sen.!! Schlofigarten Bl.

bier nur weißblübend. Rft. Soben-Finow im Bart Rn.!

159. G. sanguíneum L. Lichte Laubwälber, Gebüsche, trockne Wiesen, zerstreut. P. Glindower Berge Schr. Sp. Papenberge Thiele! Dr. Schmachtenhagen Gae. Na. Bredower Forst!! Lindsholz Schr. Jahnberge H. S. Linumer Rhinluch H. B. Kuchsberge!! Aubower Wiesen!! Köpnicer Weg Bl. A. Rübersdorfer Kallberge!! AlteLandsberg Gae. Zossen: Sperenberger Mühlberg!! Fw. Schloßegarten Bch. Mazienberg!! Nft. Brits beim Torsstich; großer See Bch.

160. G. pusillum L. Begränber, Aeder, Gartenland, gemein. † G. dissectum L. Lehmäder, sehr selten und wohl nicht einheimisch. Sp. Tegel R. Or. Kr. B. Bor bem Prenzlauer Thor

1857 Rei.!

161. G. columbinum L. Sonnige Bilgel, Begranber, be-

sonbers in D, sehr zerstreut. B. Glindom Schr. Sp. Bichelswerster Kth. B. Heinersborf Schl. Schmargenborf im Hohlweg W. M.! K. Bei ber Woltersborfer Schleige!! Mibersborf D. Zossen: Sperenberger Gipsbriche!! Br. Frankenfelbe Sch.! Fm. Alazienberg!! Ziegeleien; Schlößberg; Paschemberg Rn. Mft. Cichwerber Bch. Karlswerk: Hittenblat H.

162. G. molle L. Begranber, Gebuiche, Grasplate, nicht felten, 3. B. B. Sansjouci!! an ber Bestieite bes Schlachtenjees!! Sp. Bichelsberg!! B. Charlottenburg: Grasplate in Liebow!!

163. G. Robertianum L. Gebuiche, Baune, Beden, gemein.

## 76. Eródium L'Héritier.

164. E. cicutarium (L.) L'Heritier. Sanbfelber, febr gemein.

## 20. Familie. Balsaminaceae Rich.

## 77. Impátiens L.

165. I. noli tangere L. Feuchte Lanbwälber, Quellen, Sumpfränder, sehr zerstreut; zuweilen nur eingeschleppt auf holzpläten. B. Simmal auf einem holzplat vor dem Berliner Thor Krumbholz. Sp. Zwischen Bichelsberg und der Friedrich-Wilhelmsbriicke D. Dr. Im Stintgraden dei den Strohbergen Rn. Zerpenschleuse Kr. Na. Brieselang Gr! Lw. Lindenberg Th. B. Seegerscher holzplat anienem Graden Bl.! Alt-Landsberg Gae. Br. Nöglin: Büchnit; Batlower Wiese Rn. Fw. Brunnenthal!! Hammerthal; Papiermühle; Föthen Rn. Mf. Bom Brunnen dis Spechthausen an der Schwärze Beh.! Hohen-Finow Kn.

† I. parviflora D. C. Stammt aus Oftasien; aus bem bostanischen Garten zu Berlin entschlichft, schon hier und ba ein unvertilgbares Untraut. B. Bei ben Augustinschen Gemächshöusern Bs. im Park bei Paret Hechel! B. In mehreren Gärten ber Stadt, besonbers im Universitäts- und Thierarzneischulgarten!! in ber Seektraße westlich von ber Chausse zahlreich Hl., Rt.! Schöneberg: in mehreren Gärten ber Potsbamerstraße und am Zaume des ehemaligen Institutsgartens!! &. Gegenüber ber Seibensabrit Gr.!

#### \* Balsámina D. C.

\* B. hortensis D. C. Befannte Zierpflanze aus Afien.

# 21. Familie. Oxalidaceae D. C. 78. Oxalis L.

166. O. Acetosella L. Schattige Balber und Gebüsche, zerstreut. P. Sanssouci; Duelle ber Ravensberge Bs. Sp. Zwischen Dallgow und Seegeseld!! Heibe nach Nieder-Neuendorf hin!! Schönwalde Kr. Tegel D. Dr. Gas. Zerpenschleuse Kr. Ra. heibe zwischen Falkenhagen und dem Finkenkrug!! Station Finkenkrug!! Briefelang!! Forihaus Jägelig H. S. B. Friedrichsselber Park!! FranzösigeBuchholz D. Schönhauser Park!! Mödernig bei Königsbamm!! Thiergarten bei den Zelten; zwischen dem Buschkrug und Ober-Rixdorf W. M.! Alt-Landsberg Gas. Müncheberg: heidekrug!! Br. Büchnig bei Möglin Rn. Fw. Brunnen; hammerthal Rn. Fapiermühle!! Köthen Rn. Np. überall!! Biesenthal: Lanke Sehl.

† O. stricta L. Stammt aus Nordamerika, jeht als Gartenunkraut völlig eingebürgert. P. Sanssouci!! Werder!! Sp. Kth. Lw. Rt. B. z. B. Park von Französsich-Buchholz und angrenzende Aecker!! Thiergarten sehr viel!! Alt-Landsberg!! Kw.!! Rft.!!

† O. corniculata L. In Silb-Europa einheimisch. Bei uns nur verwilbert. B. Sanssouci an Treibhäusern 1858 Bs.! Bl.

# Familie Rutaceae Juss.

## + Ruta Tourn.

 $\dagger$  R. gravéolens L. Stammt aus Sübbeutschland. Hier und ba in Gärten und aus benselben verwilbert. B. Charlottenburg; Tempelhof Rn. Fw. Rn.

# Familie Xanthoxylaceae Adr. Juss.

#### \* Ptélea L.

\* P. trifoliata L. Bierftrauch aus Norbamerita.

## 22. Familie. Celastraceae R. Br.

## \* Staphyléa L.

\* S. pinnata L. Stammt aus Gubbeutschland. hier und ba angepflangt.

## 79. Euónymus Tourn.

167. E. europaea L. Balber, Gebuiche, gerftreut. Gp. Tegel D. Ra. Bredower Forst!! Königshorst: Fasanerie H. S. 2m. Freigraben bei Elethal Rt.! B. Friedrichsfelbe; Rieber-Schonhaufen; Reinidenborf D. Moabit Bl. zwifden Rirborf und bem Bufchfrug öftlich ber Chauffee!! Boffen: Rach bem Forsthaufe bin Bt. Wr. Upftall bei Schulzenborf; Buchnit bei Möglin Rn. Fw. Ruinenberg; Hammerthal Rn. Rst. Eichwerber!!

\* E. verrucosa Scop. Zierstrauch aus Ostbeutschland.

## 23. Kamilie. Rhamnaceae R. Br.

#### 80. Rhamnus L.

. 168. R. cathartica L. Laubwälber, Gebuiche, zerftreut. B. Tornow bis Templin Bs. Sp. Tegel Kih. Na. Linbholg!! Sanb-horft H. S. Kremmen: Tiehow!! Rhinluch H.1 B. Schöneberger Bufd Bl. R. Tasborf Kth. Baufig gepflangt.

## 81. Frángula Tourn.

169. F. Alnus Mill. Feuchte Gebiliche, häufig, 3. B. Sp. Grunewalb!! Tegel Kth. Ra. Canbhorfi H. S. Lw. Elsthal Rt. B. Jungfernheibe!! Cooneberger Buid Bl. Buweilen angepflangt.

# Familie Terebinthaceae D. C.

#### \* Rhus Tourn.

\* R. Cotinus L. Säufiger Zierstrauch aus Gub-Europa.

\* R. typhina L. Stammt aus Norbamerifa. Baufig in Barts u. f. w. angepflangt.

## 24. Familie. Papilionatae L.

#### 82. Sarothamnus Wimm.

170. S. scoparius (L.) Koch. Trodne Balber, fonnige bugel, nicht felten, 3. B. Br. Lehnin Schr. B. Zwischen Baumgarten-briid und Betow!! Ep. Grunewalb!! B. Fuchsberge!! Tempelhof auf ben rauben Bergen Bt. Reuer Erug W. M. Blumberg Schl. Konigswufterhaufen !! Fm. Am flingenben Fließ!!

#### 83. Genista L.

171. G. pilosa L. Trodne Balber, Beiben; ftellenweise baufig. P. Birichheibe!! Braubausberg Torges! Gp. Bichelsberg!! Trebbin: Scharfenbrilder Forft Gr. B. 3milden Gefundbrunnen und Schonhaufen!! Jungfernbeibe!! Spanbauer Berg Bl. Safenbeibe!! amifden Treptow und bem Neuen Rrug!! Mit. Beh.

172. G. tinctoria L. Laubwälber, trodne Wiefen. Br. Norblich von Bewefin!! B. Wald nach bem Tornow bin Bl. Gp.; Grunewald; Tegel D. Dr. Gae. Da. Bredower Forft!! Lindhola!! amiichen bem Canbfrug und Barnewit!! T. Riebelhorft im Geggebuid P. B. Beigensee D. Jungfernheibe bei ber Scharfrichterei!! und am Blogenfee!! Steglit; Tempelhof an ber blanten Bolle Bl. Safenbeibe !! Rubower Biefen !! Reuer Rrug !! Alt-Landsberg Gae.

173. G. germanica L. Trodne Balber, gerftreut. Gp. Grunewald!! Papenberge Thiele! Tegel!! Dr. Gae. Berpenichleufe Da. Brebower Forft!! Lindholg Schr. Trebbin: Scharfenbrilder Forft Gr. B. Jungfernheibe in ber Rabe ber Brilde beim Plopenfee febr baufig!! Safenheibe D. Rubower Wiefen Bl. R. An ber Gifenbahn öftlich von Friedrichshagen!! Alt-Landsberg Gae. Fw. Leuenberg Bl. Mft. Am Wege nach bem Bainbammer Boh.

174. G. anglica L. Sandiger Moorboben, febr felten. Rur Ra. An ber Weftfeite bes Bolchow zwijchen bem Sanbtruge und Bufchow Schr.! Meußerfter Stanbort gegen Gilboften in biefer

Gegenb.

## † Cvtisus L.

\* C. Laburnum L. Hänfiger Zierbaum aus Silbbeutschlanb. † C. nigricans L. Im Gebiet nicht einheimisch, sondern nur bier und ba angepflangt und verwilbert: B. Drachenberg; Braubausberg in ber Rabe bes Turnplates Bs.

\* C. capitatus Jacq. Säufiger Zierstrauch, junachst in Schlefien wilb. Berwilbert B. Bei Schweizerhof unweit Behlenborf W. M.

\* C. elongatus W. K. Desgleichen, aus Ungarn.

## \* Lupinus L.

\* L. luteus L. Auf Sanbboben überall als Futterfraut und Grünbünger gebaut.

+ L. angustifolius L. 3m Gebiet meift nur einzeln unter ber vorigen Pflange, feltener gebaut.

#### 84. Onónis L.

175. O. spinosa L. Durre Bugel, Triften, Begranber, baufig.

176. O. repens L. Bie vorige, nicht felten.

## 85. Anthyllis L.

177. A. Vulneraria L. Dürre Higel, Weg- und Walbränder, trodne Wiesen, besonders in D, zerstreut. Br. Gr. Krent Schr. B. Beim neuen Palais Bs. Baumgartenbrüd und Geltow häusig!! Petow!! Glindow Schr. Sp. Faltenhagen; Papenberge D. Na. Chaussegräben Gr.! Jahnberge H.S. B. Weißensee an der Dranke J.!! Französsich Buchbolz R. sil.! Andower Wiesen!! A. Am nordösstichen User des Kalkses!! Wr. Landhof Sch.! zwischen Möglin und Frankesselbe Rn. Fw. Broigsdorf Rn. Rs. Chaussee nach Sommerfelde!! Pfingstderg; Chaussee nach Schoin Bch. Karlsewert Rn.

## 86. Medicágo L.

† M. sativa L. Banfig gebaut und nicht felten auf Gras-

plagen, an Begen verwildert.

† M. media Pers. Seltener gebaut, hier und ba verwilbert. Br. Gr. Kreut Schr. B. Bornim Weiland! Uet Bs. B. Weißensie A. Br.! Wilmersborf nach ber Hundekehle zu!! K. Rübersborfer Kalkberge!! Fw. Schlofberg; Broigsborf Rn.

178. M. falcata L. Connige Bugel, Begranber, besonbers

in D, meift nicht felten.

179. M. lupulina L. Grasplate, Begranber, gemein.

180. M. minima (L.) Lmk. Sonnige Higel, meist in D, sehr zerstreut. P. Baumgartenbrück, Abbang über bem Wirthshausell. Sp. Bor bem Berliner Thor W. M.! Na. Weinberg bei Möthlow!! Lw. Bei ben Ziegeleien Rt.! K. Rübersborfer Kaltberge!! Zossen: Sperenberger Gipsbrüche Rt.!! Bucdow: Prithagen Thiele! Wr. Batlower Berge Schl. Fw. Königshöhe Rn. Schloßberg Rn.!! Chausse über Faltenberg Bch.!! Rst. Hausberg; Pfingsiberg; beim Stadtsförster; am Wege nach Lichterselbe bei ber Schenne; beim Holländer Bch.!

## \* Trigonella L.

† T. foenum graecum L. Im Gebiet nur versuchsweise im Großen gebaut: Br. Bei Frankenfelbe Soh.!

#### 87. Melilótus Tourn.

181. M. dentata (W. K.) Pers. Gräben, Begränber, auf Salzboben, felten. B. Chauffeegraben bei Bornim Weiland! Ra. Damm zwiichen bem Rauener Beinberg und Dreibruden in ber Rabe

bes erfteren Schr.! zwischen Bertefeld und Deutschhof Gr.! bei ber

Lütiche R.

182. M. macrorrhiza (W. K. erweitert) Pers. Biefen, Graben, gerftreut. Dr. Am Rangl Kr. Ra. Beggraben beim Gelbelanger Jagerhaufe!! I. Galabrunn an ber Galggnelle Rt.! Treb. bin: Schulgenborf Gr. ! B. Auf ben Wiefen bei Borhagen J.! Beiffenfee D. Frangofifch - Buchbolg Kth. an ber Chauffee jenfeit bes Buidfruges W. M.! Alt-Landsberg Gae Fm. 3mijden bem Maunwert und Faltenberg Beh. Mft. Am Finowtanal Beh.! an ber Oberberger Chauffee Bch.

183. M. officinalis (L.) Desr. Begranber, fonnige Sugel, Da. Baulinenau!! B. Steglit Kih. zwifden Bilmers. borf und Schoneberg!! Lehmgrube bei ber Sopficen Brauerei!! Tembelbof!! an ber Chauffee nach Ronigswufterhaufen vom Rollfrug bis jenseit bes Buschfruges!! R. Raulsborf Thiele! Alt-Landsberg Gae. Fm. Chauffee nach bem Maunwert!! Rft. Finowtanal Beh.

184. M alba Desr. Un abnlichen Orten ale bie vorige, meift

D. nicht felten.

+ M. coerulea (L.) Lmk. Stammt aus Gubbeutichland. Gelten in Garten gebaut und einzeln verwilbert.

#### 88. Trifólium Tourn.

185. T. pratense L. Wiesen, Begränber, baufig. Beif:

blübend &m. Bulichendorf Rt.! Ueberall gebaut.

186. T. alpestre L. Trodne Balber, bejonbere Laubholi, gerstreut. Br. Bewefin am Bege nach Wachow!! P. Pirschheibe!! Tornow Bs. Brauhausberg Rt! Sp. Pichelsberg Bl. Papenberge D. Tegel A. Br. Na. Briefelang!! Brebower Forft!! Em. Binnaer Forft nach Felgentreu ju Rt. Trebbin: Scharfenbriider Forft Gr.! Jungfernheibe bei Ronigsbamm!! Charlottenburger Schlofigarten Bl. Spanbauer Berg!! norblich am goologischen Garten!! gwijchen Bib leben und bem boblen Gee!! Safenbeibe D. Rubower Wiefen!! Ropnider Beibe D. R. Boltersborf D. Alt-Landsberg Gae. Budow: Brithagen Schl. Fm. Sch. ! Mft. Brunnen!! nach Commerfelbe bin!!

T. incarnatum L. In Gilb-Europa einheimisch; bei uns

nur felten gebaut.

187. T. arvense L. Brachader, überall baufig.

Laubwälber, Gebuiche, gerftreut. 188. T. medium L. 23. Rutbewiesen Bs. Gp. Bor ben Papenbergen; Tegel A. Br. Ma. Bei ber Balteftelle Fintentrug! Ctabtforft Gr. ! awifden bem Canbtrug und Bufchow!! E. Riebelhorft P. 2w. Lehmgruben Re.! Chauffee bieffeit Bantow Rei.! an ber Jungfernbeibe Li. bei Bitleben Winkler. Schmargenborf D. westlich von Wilmersborf Bl. Rubomer Biefen D. R. Rübersborfer Raltberge D. Alt-Landsberg Gae. Boffen: Gipsbruche bei Sperenberg!! Fm. Beim Maunmert!!

Mft. Brunnen Beh.

189. T. rubens L. Laubwälber, befonbers an Abhangen, fel-Da. Bei Gr. Babnit Bs. R. Balb am Raltfee norblich ber Boltersborfer Schleufe A. Br. 1852!! Fw. Bei Connenburg 1858 Sch.! Rft. Bei ber Monchsbriide Bch.! Celten gebaut, fo Br. Frantenfelbe Sch.!

190. T. fragiferum L. Biefen, befonbers auf Calgboben, meift M. gerftreut. Br. Lebnin; Beferam Schr. B. Bornim; Rubfort; Tornow; Nuthewiesen Bs. Ra. Luch weftlich vom Brebower Forft!! beim Gelbelanger Jagerhaufe!! B. Biefen gwifchen ber Frantfurter und Stralauer Chauffee J.! Chauffeegraben bei ber Rummeleburger Strafanftalt!! Biefen weftlich ber Botebamerftrage Hanstein! fühmeftlich von Schöneberg W. M.! füblich von Tempelhof Schp.! Rubower Diefen!! R. Bernsborf Jahn! Alt-Landsberg Gae.

† T. resupinatum L. Stammt aus Gub-Europa; jufallig eingeichleppt. B. Beißenfee an einem Pfuhl öftlich vom Dorfe Wink-ler 1857! A. Br. 1858!

191. T. montanum L. Trodue Biefen, Laubwälber, fonnige Bügel, gerftreut. Br. Beferam!! Bewefin am Bege nach Bachow!! und am Löttanal!! B. 3. B. Braubausberg Bs. Runereborf P. Sp. Papenberge D. Ra. Briefelang!! T. Riebelhorft P. Trebbin: Schulgenborf Gr. B. Rummeleburg D. Wiesen norblich ber Fuchsberge J.! Rubower Biefen!! R. Rilbereborfer Raltberge!! Alt-Lanbsberg Gae. Rft. Chauffee nach bem Babnhof Beh. an ber Chauffee bei ber Commerfelber Bindmuble Beh.!! Rarlowert Beh.

192. T. ropens L. Triften, Biefen, Begranber, baufig, auch

bier und ba gebaut.

193. T. hýbridum L. Wiefen, an Graben, nicht häufig. B. Tornow Be. Ra. Linumide Butung H. ! B. Reinidenborf D. Cob's neberg Thiele! Chifffahrtstanal vor bem Unhaltischen Thor W. M. Rubower Wiesen D. an ber Chauffee zwischen Treptow und bem Reuen Krug Winkler. Mft. Am Ranal nach ber Babeanftalt hin unb bei berfelben Bch.! Biejenthal auf Wiefen nach Lante hin A. Br. Sier und ba gebaut und bann fich lange haltenb, fo g. B. Kolonie Doben-Schonbaufen W: M. Beifenfee an ber Drante!!

194. T. agrarium L. Wiefen, Sumpfranber, Bebuiche, febr gerstreut. B. Sanssouci Bs. Sp.; Tegel; Rieber-Reuenborf D. Ra. Briefelang W. M. ! B. An ber Chaussee Dieffeit hermsborf W. M. ! Beifenfee J. Steglit Bl. Tempelhof an mehreren Pfühlen!! Rubower Biefen!! R. Kranichsberge Kih. Rft. Beim Schütenbaufe Beh.

195. T. procumbens L. Stoppel- und Brachfelber, Gras-

196. T. filiforme L. Biefen, feuchte Grasplate, Begran-

ber, häufig.

#### 89. Lotus L.

197. L. corniculata L. Biefen, Begranber, Gebifche, gemein.

198. L. uliginosa Schk. Wiesen, Sumpfränder, nicht so bäufig, 3. B. B. Golm; Neuendorf; Bergholz Bs. B. Wiesen diesseit Boxhagen J.!! Jungfernheibe; zwischen dem Thiergarten und Moabit Bl. Wilmersdorf im hopfenbruch W. M. Buschtrug!!

## 90. Tetragonólobus Scop.

199. T. siliquosus (L.) Rth. Wiesen, an Graben, besonbers auf Salzboben, sehr zerstreut. Br. hinter ber Lünower Ziegelei Schr. Pewesin süblich vom Lötztanal öftlich von ber Brücke Schr.!! Wachow Schr.! Ra. Berge auf ber alten Bleiche bes Amts häusig Bs.! jenseit Berge im Chaussegraben Bch. und von bort an mehreren Stellen bis zwischen Selbelang und ber Errlebenschen Meierei H.S.! Baruth Rbh.

\* T. purpureus Mach. Stammt aus Süb-Europa; bei uns nur selten als Gemisepstanze gebaut, so Or. Zehlendorf Rn.!

## + Galéga Tourn.

† G. officinalis L. Stammt aus bem öftlichen Europa; bei uns nur selten in Garten und außerhalb berselben hier und ba verwilbert. Sp. Jochmann! Tegel Kth. Or. Kr. B. Schöneberg Rn. Tempelhof Kth. Rft. Am Kanal und sonst an Gartenzäunen Boh.

b) africana Mill. B. Sanssouci Bs.!

## + Colútea L.

† C. arborescens L. Saufiger Zierstrauch aus Gubbeutschland; verwilbert 3. B. R. In ben Kalfbruchen bei ben hinteren Bergen!!

## \* Robinia L. .

\* R. Pseudacácía L. Zierbaum aus Nordamerita, überall angepflanzt.

## \* Caragana Lmk.

\* C. arborescens Lmk. Şäufiger Zierstrauch aus Sübost-Europa, \* C. frutescens (L.) D. C. Zierstrauch aus bem süböstlichen Europa.

## Qxýtropis D. C.

O. pilosa (L.) D. C. Sonnige Abhänge, trodne Bälber, sehr selten und zweiselhaft. B. Jenseit bes Tornow Drees! später nicht wieder gesunden. Br. Batslower Berge Schl.! nach Sch. durch Urbarmachung ausgerottet.

## 91. Astrágalus L.

200. A. Cicer L. Sonnige Higgs, Begränder, nur D, sehr zerftreut. B. Baumgartenbrild Rach! A. Br. Na. Gr. Bähnig am Steig nach Nauen Gr.! Müncheberg: Zwischen Jahnsselbe und Obersborf und bei Obersborf Jahn! Budow am See R. zwischen Bollersborf und bem Fischerhause Walter! Prithagen Sch. Br. Methorfer Berge Rn. Fw. Weinberg bei ber Ruine !! beim Schloß-

garten!! Mft. Bor Soben-Finow Beh. Karlewert Beh.!

201. A. glycyphyllus L. Wälder, Gebüsche, zerstreut. Br. Bewesin am lötztanal Schr.!! B. Katharinenholz Schp. Geltow; Baumgartenbrück Bs. Wildpark Schp.! Brauhausberg Bs. Sp. Grunewald; Papenberge; Tegel D. Na. Falkenhagener heibe D. wissichen Finkenkrug und Brieselang W. M.!! beim Bredower Forsthaufe!! Lindholz!! zwiichen bem Sandrug und Barnewity!! T. Riesbelhorst P. Lw. Forst nach Gottow zu Rt. B. Jungfernheibe am Kanal!! Hasenheibe W. M.!! Köpnider Heibe D. K. Woltersdorst!! Alt-Laubsberg Gae. Zossen. Zossenberger Gipsbrüche!! Buctow: Elysium Bt. Fw. Beim Brunnen Bt. Alaunwert!! bei der Papiermühle!! Leuenberg Bt. Mst. Bch. z. B. an der Oberberger Chausseam Waldeingang! Sichwerber!! Spechthausen Bt.

202. A. hypoglottis L. Sonnige Bilgel, febr felten. Mit Sicherheit jett nur R. Rilbersborfer Kaltberge Baetke! Muncheberg

nach bem Beibetrug bin Thiele!

203. A. arenarius L. Sanbhügel, dürre Kiefernwälber, zerftrent. Erreicht hier seine Bestgrenze. Dr. Zwischen Quaben-Germenborf und bem Sarnow Rn.! Gr. Buhnig Gr.!! B. Fuchsberge!! Bebding; zwischen Beinickenborf und hermsborf; Hasenbeite D. K. Zwischen Woltersborf und ber Schlense A. Br.!! Rübersborfer Kalkberge D. Tasborf bei ber Ziegelei am Stienitz-See Rn. Stortow Buek. (Wr. Süblich vom Wege nach Biesborf Sch.!)

## 92. Coronilla L.

204. C. varia L. Laubmalber, Grasplätte, Begrander, gerftreut. B. Reuer Garten; Tornom Bs. Gp. Rach ben Papenber-

bergen hin Schl.! Dr. Zerpenschleuse Kr. Na. Fliederhorst bei Königshorst H. S.! Beelit: Dobbrikom Rt. Salzbrunn P. Trebbin: westlich von Neuendors!! B. Friedrichshain J. Weißensee Kth. Schönhauser Part!! Französsich-Buchbolz Kr. Neinickendors D. beim Part Birtenwäldchen Bl. hippodrom W. M. Mudower Wiesen D. K. Mibersdorfer Kaltberge!! Tasdorf v. Chamisso! Alt-Landsberg Gae. Zossen: jüblich von Sperenberg!! und auf den Sipsbergen!! Varunt Rbh. Hw. Maunwert!! Ast. Beh. Biesenthal A. Br.

## 93. Orníthopus L.

205. O. perpusillus L. Kiefernwälber, Sanbfelber, zerstreut. B. An ber Chausse nach Spandau; nach Kl. Machenow hin Bs.! Sp. Vickelsberg!! Pichelswerder!! Tegel an der Chausse nach B. D. Dalbborf Schl.! Zwischen Lw. und Frankenselbe Rt.! Trebbin: nach Glau hin Gr. B. Marzahn H. Kolonie Hohen Schönhausen J. Weißensee nach Malchow hin!! zwischen dem Gesundbrunnen und Schönhausen!! und bei der Pantstraße!! Jungsernheide!! Hasenheide; Tempelhof D. Birken nordwestlich vom Reuen Krug Bl. K. Nach Silkenarund din Gr. Wr. Möglin Sch. Rf. Rosenberg Bch.!!

\*O. sativus Brotero. Auf sandigen Aedern hier und ba gebaut. In ben Felbern ber Serradella finden sich öfter mehrere ber Flora fremde Pflanzen, so Silene gallica L., Ormenis mixta D. C., Chrysanthemum segetum L., Echium violaceum L., Polypogon

monspeliensis Desf.

## + Onobrýchis Tourn.

† O. viciaefolia Scop. Im Gebiet nicht einheimisch, sonbern hier und da gebaut und an Wegrändern u. s. w. verwisdert. So P. Friedrich-Wilhelmsbrücke Bs. Dr. Zerpenschleuse am Kanal Jahn. Na. Möthlower Weinberg!! B. Einschnitte der Berlin-Potsdamer und Berlin-Anhaltischen Eisenbahn!! A. Nüdersdorfer Kallberge!! Bucow: Prithagen Thiele! Fw. Falkenberg!! Rft. Am Wege nach dem Bahnhose; Karlswerk Beh. am Hohen-Kinower Milhlenberg H.

#### 94. Vícia L.

206. V. sopium L. Laubwälber, Gebüsche, zerstreut. P. Pfauen-Insel Schp.! Sp. Papenberge D. Na. Bei ber Haltestelle Kinkenkrug!! Brieselang!! Fasanerie bei Königshorst!! B. Friedrichsfelbe R.! Friedrichshain!! (eingeschleppt) Schönhauser Park!! Reinickenborf D. Jungfernheibe Schl. Charlottenburger Schlösgarten; Thiergarten Bl. am Kanal zwischen ber Kottbusser und Schlesischen

Strafie!! an ber Chauffee nach Treptow!! Köpnider heibe D. Alt-Lanbsberg Gae. Fw. hammerthal!! Rft. Unter bem Schützenhause!!

† V. sativa L. Baufig gebaut, auch ale Mengfrucht. Unter

ber Gaat bier und ba vereinzelt.

207. V. angustifolia Rth. Brachader, Sanbselber, trodne Balber, nicht selten, z. B. B. Baumgartenbrud!! Brauhausberg Bs. Sp. Pichelsberg Bl. Grunewalb!! Lw. Rt.! B. Friedrichshain Tietz! Spandauer Bock W. M. nörblich vom zoologischen Garten!!

Rreugberg an ber Anhaltischen Gifenbahn!! Tempelhof!!

208. V. lathyroides L. Dürre, sonnige Higel, Graspläte, besonders D, zerstreut. P. Belvedere Radecke! Baumgartenbrück!! Tornow Bs. Brauhausberg Sanio! Ep. D. Pichelswerder!! Papenberge D. Hermsdorf Baeyer! B. Aummelsburg J. diesseit Kranzösssisch Buchbolz Schp.! Exercierplat vor dem Schönhauser Thor!! Grasplat süblich vom Schönhauser Part!! diesseit Moadit 1853!! Grasplat nördlich vom zoologischen Garten!! südwestlich von Schöneberg Bl. Areuzberg in der Lehmgrube bei der Chaussee Hanstein! K. Mügsgelberge Jochmann! Alt-Landsberg Gae. Fw. Am Baa-See Rn.! Rft. Bch.

#### 95. Cracca Rivin.

209. C. multiflora (Lmk. ex p.) Aschs. Biefen, Gebüsche,

Begränter, gemein.

210. C. tenuifolia (Rth.) Godr. u. Gr. hügel, zwischen Gebische, besonbers D, sehr zerstreut. Br. Bewesin am Lögkanal Schr.! Ra. Gr. Bähnit beim Sandtrug Schr. Möthlower Weinberg!! Kreuzberg in der Lehmgrube bei der Hopfschen Brauerei!! K. Rübersdorfer Kalkberge D. Zossen: Sperenberg bei der Windmilhste!! Budow: Prithagen Thiele! Br. Batsower Mühle Thiele! Fw. Hinter dem Weinberg Rn. Kalkenberg Bch. Ast. Warbed's Mühle; am Eichwerder; Karlswerk Bch.! an der Chausse dieseit Hohen-Fisonow Bch.!! zwischen Hohen-Fisonow und Köthen!! Bei Biesenthal A. Br.!

211. C. villosa (Rth.) Gren. u. Godr. Aeder, auf Canb und Lehm, besonders unter Getreide, nicht selten, ost in ungeheurer Menge, 3. B. B. Sp. Kth. B. Rummelsburg!! nach Hobens Ghönbursen hin!! Webding!! beim Hamburger Bahnbos!! Charlottenburg!! neder zwischen dem Anhaltischen und Halleschen Abor!! bei Tempelshos!!! Viestelle Brit!! Alte-Landsberg Gae. Fürstenwalde: Steinhösel Ht.! Br. Batsower Mühle Thiele! Nft. Bei Hohen-Finow!!

## 96. Ervum Tourn.

212. E. pisiforme (L.) Peterm. Abhange, in Gebilichen,

sehr selten. Nur Fw. Mazienberg Rn!! Abhänge westlich vom Maunwert Rn.!! Fallenberg Rn. In bieser Gegend zuerst von Schl. entbeeft.

'213. E. silváticum (L.) Peterm. Schattige Laubwälber, selsten. Nur im Obergebiet. Fw. Baa-See; Hammerthal Rn. Nft. Abhänge unter bem Schilhenhause Beh.!! Spechthausen; Oberberger

Chauffeebaus Beh.!

214. E. cassubioum (L.) Peterm. Trodne Bälber, besonbers unter Laubholz, zerstreut. P. Alt-Geltow Bs.! Eiche Bs.! Brauhausberg Bl. am Bann-See Schp. Sp. Pichelswerber auf der Nordseite!! Inseln bei Saatwinkel Bl. Tegel Schl.! Dr. Zerpenschleice Kr. Na. Im Park von Gr. Bähnitz am nordwestlichen Seesuser! B. Jungsernheibe bei Königsdamm!! an der Chausse dieseise Spandauer Bock!! nörblich am zoologischen Garten!! Hasenheide D. Buickfrug westlich von der Chausse W. M.!! A. Friedrichshagen Schl. zwischen der Boltersdorfer Schleuse und dem Alten Grund!! Alt-Landsberg Gae. Bucow: Prithagen Walter! Fw. Akazienberg; Schlosberg Kn. süblich vom Alanuwert!! Rft. Schützenhaus; Eisenspaterei; Mönchsbride Bch.!

215. E. hirsutum L. Meder, Wiefen, überall baufig.

216. E. tetraspermum L. Wegränder, Wiesen, sehr zerstreut. B. Baumgartenbrud jenseit ber Brude!! B. Friedrichofelbe Körnicke! Friedrichofain J.!! zwischen Steglit u. Lichterfelbe W. M. Rft. Chausse nach Chorin; Rogajer Schleuse Bch.

† E. monanthum L. Hier und ba, besonders als Mengfrucht gebaut, und in Folge bessen verwilbert, so P. An ber Chausse nach Eiche Bs.! Gr. Glienicke Vocks B. Lichterfelbe W. M.! Bei

Strausberg und Sobenftein Jahn!

## \* Lens Tourn.

\* L. esculenta Mnch. Im Gebiet nur an einzelnen Orten gebaut.

## + Pisum Tourn.

\* P. sativum L. Ueberall gebaut.

† P. arvense L. hier nicht gebaut, aber oft einzeln unter bem vorigen.

## 97. Láthyrus L.

217. L. tuberosus L. Lehmhügel, Aderrander, selten. Bisher nur B. Baumgartenbrud jenjeit ber Brücke Rn.! Bs.! B. Kreuzberg in ber Lehmgrube östlich ber Anhaltischen Sigenbahn Sanio!

218. L. pratensis L. Biefen, Gebuiche, gemein.

219. L. silvester L. Trodne Wälber, besonders unter Kiefern, zerstreut. B. Pirscheide Rn.! an der Chaussee den Jägerschieße ständen gegenüber viel Bs. Sp. Grunnewald D. Dr. Friedrichsthal Kr. zwischen Hammer und Zerpenschleuse Jahn! Beelig R. B. Jungsernheide; Hascheide D. Mariendorf Kr. Alte-Landsberg Gae. Müncheberg R. Bucow: Pritgdagen Walter. Hw. Baa See Rn. Königshöhe Rn.!! Weinberg; Schlosberg Rn.! Nft. Beim Schiftens

hause; Spechthausen Beh.!

220. L. paluster L. Wiesen, besonders A, zerstreut. P. hinter dem neuen Palais Bs. Baumgartenbrück jenseit der Brücke!! Ruthewiesen Bs. Marquard Schp.! Sp. Pichelsberg D. Papenberge Thiele! Tegel am See A. Br. Dr. Schmachtenhagen Rn. Na. zwischen Finkenkrug und Briefelang W. M.! Lindholz an der Eisendahn! Königshorst am Damm nach Sandhorst!! Lw. Wollenhütten Rt. Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Auf den Wiesen zwischen der Stadtmauer und Borhagen!! Friedrichsfelde D. süblich der Jungsernheide Schp.! an der sausen Spree Bl. Charlottenburg an der Spree westlich vom Schosgarten!! auf Sumpfwiesen südwestlich vom Spandauer Boch Hl.!! Schöneberg D. am Schifffahrtskanal unweit der Anhaltischen Eisenbahn W. M.! Kreuzberg in der Lehmgrube westlich der Chausse W. M.! (ein sehr auffallender Standort) beim Neuen Krug!! Zossen: westlich von Sperenberg!! Rs. Am Trödelsteig Bch.

221. L. vernus (L.) Bernh. Schattige Laubwälber, sehr zerstreut. Or. Schmachtenhagen Kr. Bernöve Jahn. Na. Brieselang!! Brebower Forst A. Br.!! Hahnberge Gr.! Lindholz H. Fasanerie bei Königshorst H. S.!! Alt-Landsberg Gae. Blumenthal bei Strausberg Kr. Müncheberg beim Heibekrug R. Fw. Hammerthal Rn. Rft. Abhang unter bem Schübenhause!! beim Brunnen Bch.!!

222. L. niger (L.) Wimm. Sonnige Laubwälder, sehr zersftreut. Sp. Papenberge Rn.! Tegel Kth. Dr. Schmachtenhagen Kr. Ra. Briefelang D. Linbholz H. S.! Gr. Bähnit beim Sanblrug Sehr. Br. Methorfer Berge Schl. Fw. Monte Caprino; Alaziensberg; Zieglerberg Rn.! Mft. Eichwerber!! vom Schützenhause bis Spechtbausen Bch.

223. L. montanus Bernh. Trodne Wälber, nicht selten z. B. Brauhausberg Torges! Sp. Grunewald Schp. Forst nach den Bapenbergen hin!! Tegel Bl. Na. Bredower Forst!! Briefelang!! Lw. Renneberge Rt.! B. Silblich von Friedrichsfelde Rei.! Jungsfernheide!! Thiergarten W. M. nörblich am zoologischen Garten!! Rudower Wiesen!! R. Nach den Miggelbergen zu Gr.! Alt-Landsberg Gae. Rst. Schützenhaus!!

b) tenuifolius Rth. (als Art). Ew. Forst nach Felgeutren

hin Rt.1

#### \* Phaséolus L.

\* P. multiflorus Willd. Aus Amerita? Gebaut.

\* P. vulgaris L. Mus Indien? Ueberall gebaut.

## 25. Familie. Amygdalaceae Juss.

## \* Amygdalus L.

\* A. nana L. Bierftrauch aus Gilboft-Europa.

#### \* Pérsica Tourn.

\* P vulgaris Mill. Aus Borber Affen; an Spalieren gezogen.

#### 98. Prunus L.

\* P. Armeniaca L. Säufig in Garten. 224. P. spinosa L. Balbrander, sonnige Sügel, zerstreut, 3. B. B. Baumgartenbriid!! Glindower Geel! jenfeit Tornow; RL. Glienide Bs. Sp. D. Bichelswerber!! Tegel D. Ra. Fasanerie bei Königsborft H. S. R. Rübersborfer Raltberge!! Alt-Lanbeberg Boffen: Sperenberg bei ber Bindmuble!! Br. Metborfer Berge; Buchnit bei Möglin; Upftall bei Schulgenborf Rn. Mft. Gichwerber!! Chorin; Berbellin-Gee Kr. Richt felten gu Beden angepflangt.

\* P. insiticia L. Sier und ba in Garten.

\* P. doméstica L. Um Raufajus wild; überall in Garten. 225. P. avium L. Laubmalber, febr felten. Ra. Kaltenbagener Beibe D. B. Thiergarten!! ob wild? In Garten überall, an Chauffeen nicht felten gepflangt.

\* P. Cerasus L. Ueberall in Garten, nicht felten an Stra-

Ben gepflangt.

226. P. Padus L. Laubwälber, feuchte Bebuiche, febr ger-Ra. Briefelang R. Linbholg H. Alt-Landsberg Gae. Mit. Schorfheibe am Berbellin-See Kr. Baufig in Barts gepflangt und bier und ba häufig verwilbert, fo B. Thiergarten!!

\* P. serotina Willd. Bierftrauch aus Norbamerita.

\* P. Mahaleb L. Bierftrauch aus Gubbeutschland, febr baufig gepflangt.

## 26. Familie. Rosaceae Juss.

## + Spiraea L.

+ S. opulifolia L. Zierstrauch aus Norbamerita, nicht selten gepflanzt. Berwilbert: Sp. Tegel westlich vom Bart A. Br. B. Schöneberg an einem Graben stibwestlich vom botanischen Garten W. M.!!

\* S. ulmifolia Scop. Zierstrauch aus bem süböstlichen Deutsch-

lanb.

\* S. crenata L. Bierftrauch aus Ungarn.

† S. salicifolia L. Zierstrauch aus Sibost-Europa. Häufig angepflanzt und hier und ba völlig vermilbert; so Sp. Im Torffumpf zwischen bem Grunewald- und hundelehlen-Gee!! B. An ber faulen Spree füblich ber Jungfernheibe Bl.

\* S. Douglasii Hooker. Zierstrauch aus Kalifornien.

#### \* Sorbária A. Br.

\* S. sorbifolia (L.) A. Br. Saufiger Zierstrauch aus Gi-

#### 99. Ulmaria Gil. erweitert.

227. U. pentapétala Gil. Feuchte Biesen, Gebüsche, häufig. 228. U. Filipéndula (L.) A. Br. Trockne Biesen, sonnige Hügel, lichte Bälber, zerstreut. Br. Eistutenberg bei Gr. Kreut Schr. B. Läusebuich auf bem Bornstebter Felbe Bs. Pirschheibe Schp. Baumgartenbrück Bs. Sp. Pichelsberg; Inseln bei Saatwinkel Bl. Na. haltestelle Finkenkrng W. M. beim Bredower Forsthause!! Briesselang!! B. Rördlich von den Huchsbergen J. im stüdichen Theil der Ingernheibe!! nördlich am zoologischen Garten!! Steglit Schl. Rusdower Wiesen!! K. Ribbersdorfer Kalkberge Schl. Jossen! Sperenderg!! Br. Möglin Kn. Frw. Brunnen Bl. Aft. In der Chausse zwischen Trampe und hekelberg Bl.

#### \* Kérria D. C.

\* K. japonica (L.) D. C. Baufiger Zierstrauch aus Japan.

#### 100. Geum L.

229. G. urbanum L. Schattige Laubwälber, gemein.

230. G. rivale L. Feuchte Biefen, Gebuiche, nicht felten, g. B. B. &p. Dieffeit bes Schwanentrugs!! Ra. Briefelang!! beim Brebower Forsthause!! Königsborft H. S. Kremmen: Tiegow!!

Rhinluch H.1 Lw. Elsthal; Felgentreu Rt. Trebbin Gr. B. Am Fuß ber Fuchsberge!! Schönhauser Park Bl. Thiergarten!! am Kanal zw. bem Kottbuffer u. Schlesischen Thor!! zw. bem Buschfrug u. ber Spreeheibe W. M. Rft. Wiesen nach bem Eichwerber hin!!

229 × 230.G. urbanum × rivale. Mit ben Ettern.
a) intermedium Ehrh. Mit-Landsberg beim flabtischen

Forftbaufe Gae.

b) Willdenowii Buek. Ra. Briefelang D. B. Thiergarten D. Rft. Cichwerber; Zainhammer Beh.

### + Waldsteinia Willd.

† W. geoides Willd. Seltene Zierpflanze aus Ungarn, ver- wilbert P. Sanssouci Bs.!

## 101. Rubus L. \*)

231. R. fruticosus L. Balber, nicht felten.

232. R. Koehleri W. u. N. Wälber. Sp. Nach ben Papenbergen bin nach Sonder.

233. R. caesius L. Balbranber, Meder, gemein.

234. R. Idaous L. Schattige Balber und Gebufche, nicht felten.

235. R. saxátilis L. Balber, seht zerstreut. P. Sanssouci jenseit der Sichen Schot! Sp. Papenberge!! Bamberge Kih. nordwestlich vom Wirthshause bei Tegel!! Dr. Zerpenschleuse Kr. B. Friedrichsselbe D. Jungsernheibe, besonders sildwestlich vom Plötzensen und im süblichen Graben des Artillerie-Schiesplatzes!! K. H. Rübersdorfer Kalberge Bl. Rft. Bei den Leuenberger Wiesen; Darre; Bainhammer Beh.! Pechteich Kirchner.

## 102. Fragária L.

236. F. vesca L. Wälber, Gebüsche, grafige Hügel, nicht selten 237. F. collina Ehrh. Wie vorige, zerstreut. Br. Zwischen Bewessen und Wachow Schr.! P. Bei Bornstedt Radig. Na. Brieselang Thiele! Sp. Pichelswerder Kr. B. Schmargenbors W. M. Wilmersborf D. Kollberge Schp. K. Wald am Kalkee nörblich der Woltersborfer Schleuse A. Br.!! Rilbersborfer Kalkberge Schl.! Alte Landsberg Gae. Wr Wrietener Berge Sch.! Wethovser und Batslower Berge Schl. Fw. An der Chaussee jenseit Faltenberg Bch. Rft. Warbeds Mühle; hinter dem Kirchhof Bch. Wald vor Sommer-

<sup>&</sup>quot;) Die ftrauchartigen Rubus-Arten biefer Begend bedurfen noch eines genaueren Studiums.

felbe Beh.!! Monchebriide Beh. Biefenthal: Balbrand bei ber Hellmühle A. Br. Dannewit Schl.

b) Hagenbachiana Lang. (als Art). Sonnige Bugel, fel-

ten. Br. Gistutenberg bei Gr. Rreut Schr.!

238. F. elatior Ehrh. Schattige Wälber, Gebüsche, selten. Sp. Dorngebisich beim Rhinmeister See A. Br.!! B. Früher zahlereich in einer Vertiesung sübwestlich von Schöneberg; zwischen Schmargendorf und bem Grunewald Bl. (Br. Dornkuschmühle bei Levan Sch.!) Aft. Schanzenberg; Schüftenhaus; Brunnen; an ber Chaussein ber Rähe ber Leuenburger Wiesen Bch.! In Gärten hier und da und in Folge bessen wohl nur verwilbert. B. Friedrichsselber Fart!! Thiergarten!!

#### 103. Cómarum L.

239. C. palustre L. Moorwiesen, Torssümpse, nicht selten, 3. B. Br. Gr. Kreut am Eiskntenberge Sehr. P. Beim Wildpark!! Ep. Grunewald!! Tegel Sehl. Na. Im großen Luch nörblich vom Lintholz H. S. Krenmen: Beeter Luch H.! Lw. Frankensörte; Velgentren let Trebbin: Schulzenborf Gr.! B. Rummelsburg kkh. Sungfernheibe!! Witseben!! Schulzenborf Gr. B. Rummelsburg kkh. Sungfernheibe!! Witseben!! Schulzenberger Fenn U. Köpnicker Beg vor bem Renen Krug IV. M. K. Am Wege nach ben Müggelbergen!! Wr. Möglin Um.

## 104. Potentilla L.

\* P. fruticosa L. Hanfiger Zierstrauch aus Südost-Europa. 240. P. supina L. Heuchte, fandige Stellen, Ufer, Dorfftrassen, sehr zerstreut; zuweilen unbeständig. P. Gr. Glienicke Vocke! Dr. Onaden-Germendorf Kr. B. Lichtenberg J.! an einigen Pfühlen bei Weißense einzeln 1853 und 1857!! Schmarkendorf Bl. Schönesberg A. Br.!! K. Tasborf D. (Tw. Alt-Ranft Rn.)
241. P. norvégica L. Heuchte, moorige Stellen, sehr selten

241. P. norvegica L. Feuchte, moorige Stellen, sehr selten und unbeständig. Dr. Nach Quaden : Germendorf hin Gae.! B. Beißensee am Psuhl beim Chaussehause nördlich der Chaussec 1845

Garcke 1857 Schp.!!

242. P. Anserina L. Triften, Grasplätze, Begranber, ge-

† P. rocta L. Zierpflanze aus Mittelbeutschland, verwilbert P. Pfauen-Injel Vocke. Sp. Karlshöhe 1842 C. Hoffmann! K. Kirchbof Gr.!

243. P. argentea L. Begrander, trodne Balber, fonnige

Bügel, gemein.

244. P. collina Wib. Wie vorige, felten. Gp. Bichelsberg am Ausgange bes Teufelsgrabens!!

245. P. reptans L. Feuchte Grasplate, Graben, Sumpfranber, febr baufig.

246. P. mixta Nolte. Sumpfranber, fehr felten. B. An einem fleinen Pfuhl norböftlich ber Kolonie Hohen-Schönhaufen und

einigen benachbarten Gumpfen viel 1858 A. Br.!!

247. P. procumbens Sibth. Kiefernwälder, besonders an etwas feuchten Stellen, auch sonst an feuchten Orten, zerstreut. P. Withpart Schp.! am Schlachtensee Vockel Sp. Pichelsberg beim Teufelsgraben Bl. Tegel nordwestlich vom Wirthshause!! Or. Bei der Friedensthaler Glashütte Rn.! Trebbin: Schause!! Or. Bei der Friedensthaler Glashütte Rn.! Trebbin: Schause!! Or. Bei dern.! B. An Gräben östlich der Kolonie Hohen-Schönhausen J.! in einer Bertiesung bei der Pankstraße östlich vom Gesundbrunnen A. Br.!! Jungfernheibe im südlichen Theise an mehreren Stellen!! im Walte zwischen Schungendorf und der Hundekelle!! am Köpnicker Wege diesseit des Reuen Kruges Körnicke. K. Am Kalkse nördlich der Boltersdorfer Schleuse!! Alt-Landsberg Gue. Fw. Sch.! Nst. Bei den Leuenberger Wiesen; Orebnit Beh.!

248. P. silvestris Neck. Bie vorige, febr baufig.

249. P. verna L. Trodne Bälber, Grasplätze, sehr zerstreut. B. Neuer Garten Weiland! Katharinenholz Schp.! Pirschheibe an ber Havel Sanio! Brauhausberg Sanio! Sp. Grunewalb D. Na. Haltestelle Finkenkrug!! B. Jungsernheibe im südöstlichen Theile!! Moabit diesseit der Kirche!! Bucow: Prithagen Thiele! Zossen: Gr. Machenow Bl. Aft. Bch.!

250. P. in can a Mnch. Bie vorige, sehr häufig, 3. B. P. Bfauen-Insel Vocke! Birscheibe Sanio! Sp. Pickelswerber!! Kremmen: Rhinluch H.! B. Fuchsberge!! Jungfernheibe!! Moabit!! beim Spanbauer Bod!! Charlottenburger Schloggarten!! Rurfürstenbamm W. M.! hippobrom!! R. Erkner!! Rübersborfer Kalkberge Schl.!

Alt-Landsberg Gae. Boffen Bl. Fm. Faltenberg Beh.!

251. P. opåca L. Wie vorige, zerstreut. P. Pfauen - Insel Vocke! Ruinenberg Bs. Katharinenholz Schp. Pirschheide!! Templin; Tornow Bs. Brauhausberg Bs.! Babelsberg Bs. Sp. Pichelswersber!! Papenberge; Tegel D. Na. Zwischen ber Haltestelle und dem Finkenkrug!! an der großen faulen Lake!! B. Friedrichsselbe D. Jungfernheide bei den Rehbergen!! Spandauer Bock; Bellevue Bl. Sippodrom und nördlich vom zoologischen Garten!! jenseit Teegtig Bl. jenseit Treptow westlich von der Chausse!! K. Miggelberge!! Tasborf D. Ult-Landsberg Gae. Zossen: Wald sibilich von Sperensberg!! Wr. Megdorfer Berge; Büchnitz; Upstall Rn. Fw. Maziensberg!! Ms. häufig, z. B. Zwischen dem Schützenhause und Schanzenberg!! Kichwerder!! Pfingstberg bei Karlswerk H.

252. P. alba L. Trodne Balber, besonders unter Laubholg,

Gebüsche, sehr zerstreut. Sp. Nörblich von ber Dunbekehle!! Pichelsberg beim Teufelsgraben!! Papenberge D. Na. Bredower Forst!! B. Nörblich ber Fuchsberge J.! Französisch Buchholz Kr. Jungfernsheibe süblich vom Kanal bei ber Brücke am Plötzensee!! in ber Anspslanzung nörblich vom zoologischen Garten, in ber Nähe bes Hippobroms\*) Bl.!! Rudower Wiesen!! Alt-Landsberg Gae.!

#### 105. Alchemilla Tourn.

253. A. vulgaris L. Laubwälber, Gebiliche, sehr zerstreut. B. Sanssouci, wohl nur verschleppt Schp.! Sp. Westlich von Tegel Sanio! Or. Zerpenschlene an ber Chausse Jahn! Ra. Fintenkrug Thiele! B. Johannisthal Bl. Alt-Landsberg Gae.! Münscheberg: beim heibekrug!! Rft. Eisenhammer Beh.! Sommerselbe; Leuenburger Wiesen; Drehnit Beh. Pechteich Kr.

254. A. arvensis (L.) Scop. Acter, tesonbers auf Sandsboben, zerstreut. B. Tornow Bs. nördlich am Glindower See!! 3chslendorf!! Dr. Zehlendorf Rn.! Am. Brand bei Frankenförde Rt.! Gr. Beeren Bs. B. Kolonie Hohen-Schönhausen!! Kantow; vor dem Rosenthaler Thor Schl. Tempelhos!! Zossen: Zwischen Kummersdorf und Sperenberg!! Br. Nögliner Ader an der Büchnig Rn. Rft. Beh.!

#### 106. Rosa Tourn.

\* R. lutea Mill. Sanfiger Zierstrauch. Berwilbert Fw. Alaun- mert Rn.

† R. pimpinellifolia D. C. Desgleichen, an ben Küften Rordbeutschlands und in Mittelbeutschland wild. Berwilbert: Sp. Tegel A. Br ! Fw. Caugrund, Königshöhe Sch.!

\* R. cinnamomea L. Zierstrauch aus Mittelbeutschland.

255. R. canina L. Balber, Begranter, baufig.

R. coriifolia Fr. Dilgel, Begranber, nahe an ber öftlichen Grenze bes Gebiets (Br. Berge; Dornbuich-Mühle bei Bevap Sch.!) wohl auch innerhalb beffelben aufzufinden.

256. R. rubiginosa L. Bugel, Balber, gerftreut. Gp. Te-gel Schl. B. Fuchsberge Rei.! gwijchen ber Jungfernheibe und Moa-

<sup>\*)</sup> Diefer Standort ift von Intereffe, ba er zeigt, eine wie große Wiberftandsfraft die einheimische Flora unter Umftänden gegen Kultureinftusse hat.
Das Gebusch, unter welchem diese bubsche Pflanze wächst, besteht großentheich aus ziemlich dicht gerpflanzter Spiraes oppulifolia und salicifolia, Amelanchier-, SalixArten u. s. w. Dennoch ist die Flora ganz die eines wilden Laubgebusches; mit ber Potentilla alda oder in geringer Entfernung sinden fich Hypericum quadrangulum, Trifolium alpestre, Ervum cassubicum, Ulmaria Filipendula, Betonica officinalis, sammtlich hier nicht gerade gemeine Pflanzen.

bit!! Spandauer Bod!! Tempelhof Schl.' Rollberge Schp. R. Dab-

lewit Schl. Mft. Balb nach Commerfelbe bin!!

257. R. tomentosa Sm. Wie vorige, zerstreut. Sp. Pickels werber!! Papenberge Thiele! Grunewald D. Inseln bei Saatwinkel Bl. Tegel östlich ber Chaussel! B. Jungfernheibe im süböstlichen Theile!! Kurfürstendamm Bl. sübsich von Tempelhof Rei.! Rollberge Schp. Johannisthal D. K. Woltersdorf westlich vom Kalfsee A. Br.! Rübersdorfer Kalfberge D. Wr. Frankenselbe Sch.! (Vevan Sch.!) Budow: Prithagen Schl. Mst. Wald nach Sommerfelbe hin!!

† R. pomifera Hermann. Ra. Um Wege westlich vom Brebower Forsthause!! von Körniche und Rach entbedt; zwar anicheinend wild, boch sicher unsprünglich angepflanzt. hier und ba in

Gärten.

\* R. centifolia L. Bierftrauch, überall in Garten.

R. canina × rubiginosa. Sügel, Balber, febr zerftreut. B. Schöneberg D. A. Rübersborfer Kaltberge!!

## 107. Agrimónia Tourn.

258. A. Eupatoria L. Beg- und Balbranter, Gebuiche,

häufig.

259. A. odorata Mill. Begränber, Gebufche, selten. Na. Haltestelle Fintenfrug!! hier am 30. Juli 1854 von Körnicke und mir zuerst für bas Gebiet entbedt; beim Bredower Forsthause einzeln!! Sahnberge in ber Nauener Stadtsorst!!

## 108. Sanguisorba L.

260. S. officinalis L. Feuchte Wiesen, Gebüsche, zerstreut B. Glindow Schulz! Al. Glienicke Bs. Sp. Grunewald bei der Rhinmeisterbrücke!! Fapenberge Schl. Tegel Kih. Na. Briejelang W. M.!! Bredower Forst beim Forsthause!! Wiese nordwestlich der Stadt Gr. Arenmen: Arunnne Horft bei Linum H.! Lw. Frankensche Kit.! Trebbin: Zwischen Schulzendorf und Nenendorf!! Im B. bäusig: Friedrichsselber Park!! Jungfernheibe dieseit des Plötzenses!! zwischen Charlottenburg und der Jungfernheibe A. Br. Thiergarten!! zwischen Schaftlichen Garten und Wilmersdorf W. M.!! Wiesen an d. Berlin-Potsdamer Eisenbahn diesseit Schöneberg W. M.!! Rudower Wiesen!! am Schiffshrtskanal vor dem Schlesischen Thor Rei. Alt-Landsberg Gae.!

## 109. Potérium L.

261. P. Sanguisorba L. Sonnige Bugel, Wegranber, sehr zerstreut, in D. P. Glindower Berge Schr. A. Rübersdorfer Kaltberge!! Boffen: Sperenberg auf ben Gipsbergen!! Budow: Pripbagen Thiele! Br. Berge 'Sch.! Fw. Zieglerberg Rn. süblich vom Maunwert!! Faltenberg Bch. an ber Chaussee biesseit Hoben-Finow Bch.!! In Gemisegurten gebaut und in Folge bessen bier und ba auf Grasplätzen verwildert; so B. Garnisonplantage Bs.! Ruinen-berg W. M.! Sanssouci; Neuer Garten Bs. B. Friedrichshain J.!! Charitégarten Helmrich! Thiergarten Hl.

# 27. Familie. Pomariae Lindl.

## 110. Crataegus L.

262. C. oxyacantha L. Walbründer nicht häufig. Ep. Tesgel D. Na. Briefelang D. Fasanerie bei Königshorst H. S.! B. Jungfernheide D. Wr. Methorfer Berge Schl. Fm. Zwiichenham merthal und Alaunwert!! Nft. Beh. 3. B. Cichwerder!! Häufig zu

Beden gepflanzt, auch als Bierftrauch mit gefüllter Blüthe.

263: C. monogynus Jacq. Walbründer, Higel, häufiger als voriger. P. Baumgartenbrüd!! Glindower Berge A. Br.! Ep. Pischelswerder Rn. Or. Wandelit Schl. Na. Lindholz!! Trebbin: 3wijchen Schulzendorf und Neuendorf!! B. Schönhaufen; Jungfernsheide D. K. Nübersdorfer Kalkberge!! Zoffen: Sperenberg!! Fm. Sch.! Nft. Bch. z. B. Eichwerder!!

## + Cotoneaster Medikus.

† C. vulgaris Lindl. Seltener Zierstrauch aus Mittelbeutschlant. Angepflanzt und verwildert B. In ber Rabe bes hegemeisters jenfeit Rummelsburg Thiele! Rach.

## + Méspilus L.

† M. germanica L. Stammt aus Mittelbeutschland; bei uns nur hier und da in Garten und an einigen Orten halb wild: so Ep. Tegel Kth. Or. Bötsow an Backöfen Un. Fw. Sammerthal; Maunwerf Un.

## \* Cydónia Tourn.

\* C. vulgaris Pers. In Garten bier und ba angepflangt.

## \* Amelanchier Medikus.

\* A. vulgaris Mnch. Bierftrauch aus Mittelbeutichland.

\* A. canadensis (L.) Torr. u. Gr. Desgl. aus Norbamerifa.

## 111. Pirus L.

264. P. communis L. Rur

a) glabra Koch. Laubwälber, Aderranber, felten. Na. Brebower Forst!! Lindholg!! Pft. Betelberg Bl. In Garten, an Wegen überall gepflangt.

265. P. Malus L. Mur

b) ac er ba D. C. (als Art). Laubwälber, selten. Na. Brieselang O. Jaenicke. Lindholz!! B. Buch Kr. Ueberall angepflanzt. 266. P. aucuparia (L.) Gaertn. Nicht selten in Laubwäls

bern. An Wegen häufig gepflangt.

\* P. Aria (L.) Ehrh. Stammt aus Mittelbeutschland; nicht felten in Bartanlagen gepflanzt.

\* P. torminalis (L.) Ehrh. Rur bier und ba angepflangt;

im Bebiet in neuerer Beit nicht wilb gefunden.

## 28. Familie. Onagraceae Juss.

## 112. Epilóbium L.

267. E. angustifolium L. Trockne Wälber, Sanbhügel, zerstreut. Br. Lehnin Schr. P. An ber Norbseite bes Schosses anssonic Schp. Neblitz; Pirschheibe; Reuendorf Bs. Pfauen-Insel Schp.! am Wannses Bl. Sp. Grunewald D. zwischen Sp. und Pichelsberg Schl.! Papenberge; Tegler Heibe D. Dr. Kanal; Strobberge; Legebruch Gae. dieseit Zerpenschleufe Kr. Na. Bredower Forst!! Rhinsluch H. Trebbin: Beim Forsthause Lenzburg Gr.! B. Jungsernseite Am Schissenach!! in der Sandgrube an der Chausse jenseit Rixdors!! Alt-Landsberg Gae. Zossen Zossen Zossenschlen für von Sperenberg! Stortow: Scaby-Luch am westlichen Kanal H.! Br. Methorfer Berge Rn. Fw. Nonte Caprino Rn. Abhang über der Chausse westlich vom Hammerthal!! Schlosberg Rn. Kl. 3. B. Forst zwischen der Oberberger und Stettiner Chausse!!

268. E. hirsütum L. (ex. p.) Gräben, Ufer, zerstreut. P. Bornstebt am See Bs. Kl. Machenow Schl. Priort Gr.! Sp. Piechelsberg; Fapemberge D. Dr. Gae. T. Schlacher Mühlenstieß bei Berghorst Rt.! B. Diesseit bes Hegemeisters!! Dranke bei Beisensee!! an ber Vanke biesseif kranzösisch Buchholz östlich ber Chaufee!! zwischen Schweberg und bem zoologischen Garten!! Treptow Kth. K. Tasborf v. Chamisso! Alt-Landsberg Gae. Zossen: Rach

Gr. Machenom bin Bl. Fw. Papiermuble Rn. Mft. Bch.

269. E. parviflorum Schreb. Graben, Sumpfwiesen, nicht selten, 3. B. B. Muthewiesen Bs. Sp. Grunewald: Rhinmeister-See!! Tegel D. Or. Gae. Na. Haltestelle Finkentrug!! bei Lobeofund H.S. Kremmen: Rhinluch H.! Ew. Rt.! Trebbin Gr.! B. Beißensee in ber Nahe bes Sees!! bei ber Torfftraße!! Wilmersborf

W. M. Tempelhof D. zwijden bem Buidfrug und Dber - Rirborf!!

R. Tasborf Kth. Dit. baufig!!

270. E. montanum L. Schattige Balber und Gebuiche, zerfirent. B. Pirichheibe Schp.! Sp. Papenberge Thiele! Tegel D.
Ra. Bredower Forst!! Stadtforst Gr.! Lindholz D. B. Jungsernheibe D. Thiergarten!! R. Mübersborfer Kaltberge Dr. Klotzsch.!
Fm. Sch.! Rft. Beh. Biesenthal: Lante Schl.

271. E. roseum Schreb. Graben, feuchte Gebuiche, gerftreut. Br. Lehnin Schr. Sp. Grunewalb; Tegel D. Lw. Schulsteig Rt.! in Frankenforbe Rt.! B. Friedrichsfelbe in einem Garten!! Jungsfernheibe; Thiergarten; Treptow D. Rft. Brunnen; Gartengassen

Beh. Delmiible!!

272. E. tetragonum L. Gräben, Ufer, sehr zerstreut. Sp. Tegel D. Trebbin: Gräben westlich von Neuendorf Gr.!! B. Schoneberger Fenn Bl. K. Kalkbrüche beim Alten Grund A. Br.!! Tas-borf D

273. E. palustre L. Sumpswiesen, nicht selten, z. B. P. Ruthewiesen Bs. Sp. Grunewald in den Torssümpfen!! Kremmen: Rhinluch H.! Lw. Mollenhütten Rt.! B. Wiesen bei Borhagen J.I an den Pfühlen dei Weißensee!! Schöneberger Fenn Bl. Wilmersdorf im Hopfenbruch W.M. Tempelhof Schp. Aft. Bch. Biesenthal nach Lanke hin A.Br.

## + Oenothéra L.

† O. biennis L. Canbfelber, Flugufer, fehr häufig, 3. B. B. Baumgartenbrud!! Lw. Elsthal Rt. B. An ber Landsberger Chausses. J. Charlottenburg im Eisenbahneinschnitt beim Schiefhause!! beim Schifffahrtskanal, besonbers im hippodrom!! westlich von Wilsmersborf Bl. an ber Chausses jenjeit Rixborf!! Alt-Landsberg Gae.

† O. muricata L. Wie vorige, viel seltener. Rur Ra. Gijenbahnbamm zwischen ben haltestellen Finkenkrug und Seegeselb Schr. B. Charlottenburg an ber Gijenbahn beim östlichen Ausgange bes Einschnitts beim Schießhause!! unter bem Etablissement auf bem Spanbauer Berge A. Br.!

O. biennis X muricata. Mit ben Eltern. B. Charlot-

tenburg beim Chieghaufe!!

Diese nordamerikanische Gattung ift feit 250 Jahren in Europa eingewandert.

#### 113. Circaea L.

274. C. lutetiana L. Schattige Laubwälber und Gebufche, zerstreut. B. Sanssouci Schp.! Dr. Kr. B. Thiergarten beim Hofjäger!! und beim alten Chaussehause!! Alt-Landsberg Gae. Fw. Bapiermuble Ru. Rothen v. Muffling! Mft. Brunnen Beh. Bain-

bammer !!

275. C. alpina L. An Walbfümpfen, Elsbrüchern, sehr zerstreut. Dr. Sarnow Rn.! Rft. Stadtbruch; Leuenberger Wiesen Beh.! an ber Schwärze beim Zainhammer; erster Bach vor Spechthausen Beh.

## 114. Trapa L.

276. T. natans L. Stehende und langsam fließende Gemäsfer, sehr zerstreut. P. Charlottenhof Bs.! ob wild? K. Müggelsee
Gr. Wernsborfer See Baeyer! Jahn!

# 29. Familie. Halorrhagidaceae R. Br.

## 115. Myriophyllum Vaillant.

277. M. verticillatum L. Gräben, stehende Gewässer, nicht selten, 3. B. Br. Kehür Gr. P. Ruthe; hinter bem Neuen Palais Bs. Sp. Grunewald Kth. Ra. Station Finkenkrug Kei. Königshorsk H. S. Kremmen: Linum H.! B. Aungsernheide Kth. Schöneberge Fenn Bl. zwischen Rixborf und Dber-Rixborf!! Rubower Wiefen!! R. Woltersdorf!! Alte Landsberg Gae. Rt. Trödelsteig Bch.

278. M. spicatum L. Seen, langsam sließende Gewässer, nicht so häufig. P. Ruthe; hinter bem Neuen Palais Bs. Sp. Pichelsberg Kth. Hundefehlen-See Bl. Tegel D. Dr. Gae. Kremmen: Linum H.! B. Beißensee in der Dranke!! Plögensee!! Charlottenburg: Hohler See Bl. jenseit Rixdorf D. Alt-Landsberg Gae. Mft. Trödelsteig Beh.

# 30. Familie. Hippuridaceae Lk.

## 116. Hippúris L.

279. H. vulgaris L. Gräben, stehenbe und langiam fließenbe Gemässer, nur A, zerstreut. Br. Weseram Schr. P. 3w. Templin und Tornow Bs. Neuendorf Bch. Wannjee Schl. Sp. Havel bei Bichelsberg!! Bichelswerber!! bei ben Papenbergen D. Saatwinkel; Tegel Bl. Na. In einem Graben nordwestlich von Paulinenau!! Königshorst H. S. Buschow Schr. Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Spree bei ben Zelten; Charlottenburg D. nach Stralau bin!! und bei Treptow D. A. Woltersdorf am Flatenbee!! Alte Landsberg Gae. Zossen bei ben Weinbergen Bl. Mittenwaste H. S. II.! Fw. Maungraben Rn. Rft. Kanal bei Nieder-Finow nach Liepe hin Beh.!

## 31. Familie. Callitrichaceae Lk. 117. Callitriche L.

280. C. stagnalis Scop. Stebente Gemaffer, gerftreut. Bis-

ber nur B. Charlottenburg Bauer! Alt-Lantsberg Gue.
b) microphylla Kützing. B. Lichtenberg Jahn!

281. C. verna L. Graben, Geen, Fluffe, gemein.

282 C. auctumnalis L. Geen, Muffe, bisber faft nur in ber Savel und in ben mit ihr gusammenhangenben Geen. B. Beim Tornow Weiland! Baumgartenbrud Genicke! Vocke! Glindower Gee Jahn! Gp. Tegler Gee Oenicke! B. Ranal öftlich ber englischen Gasanstalt Bauer!

b) decussata Lk. (als Art). In tiefem Baffer auf festem

Grunde. B. Glindower Gee auf Mufchelgrund Schr.!

## 32. Familie. Cerataphyllaceae Gray. 118. Ceratophyllum L.

283. C. submersum L. Stebente Bemaffer, felten, bod wohl mehrfach überfeben. Ra. Pfubl in Falfenhagen Körnicke. B. In einem Graben bei ber Scharfrichterei 1855 Sanio! Alt ganbeberg: Befendahl Gae.! Budow: Pfubl in Bollersborf Thiele!

284. C. demersum L. Stebende und langfam fliegenbe Be-

mäffer, gemein.

285, C platvacanthum Cham, u. Schl. Wie vorige, febr felten. B. In einem Teich im Thiergarten unweit bes großen Sterns Körnicke!!

# 33. Familie. Lythraceae Juss.

119. Lythrum L.

286. L. Salicaria L. Graben, feuchte Bebuiche, gemein. 287. L. Hyssopifolia L. Un Gumpfrantern, in Graben, an überichmemmten, fpater trodnenden Stellen, febr gerftreut. B. Lehmgruben bei Abrensborf bei Caarmund Bs.! Beclit: Elsholg an ber Chauffee Rn.! Em. Rach Frankenforde ju Rt.! Trebbin: Coulgenborf bei ber Belle Gr. B. Rolonie Soben = Edonhaufen Kornicke! Beifenfee am Bfubl norblich vom Chauffeebaufe einzeln!! Beinersborf Schl. Lantwit 1855 A. Br.!

## 120. Peplis L.

288. P. Portula L. Wie voriges, nicht gerabe selten. P. Birschheibe vor bem baierischen Häuschen Schp. an ber Muthe Bs. Zehlenborf am krummen Fenn!! Sp. Tegel D. Ra. Falkenhagen D. Aremmen: Wolfslake Bch. T. Berghorst P. Lw. Schöneweibe am Gänseplan!! bei Frankenfelbe Rt.! B. Weißensee!! Jungsernheibe beim Pfefferluch W. M.! Charlottenburg am hohlen See!! Wilmersborf D. Schöneberg Schp.!! Tempelhos!!

# Familie Philadelphaceae Don.

## \* Philadelphus L.

\* P. coronarius L. Zierstrauch aus Gubbeutschland, überall in Garten.

## 34. Familie. Cucurbitaceae Juss.

## \* Cucúrbita L.

\* C. Pepo L. Ueberall in Garten.

## + Sicyos L.

† S. angulata L. Schlingpflanze aus Norbamerita, zur Befleibung von Lauben u. f. w. Buweilen verwilbert, fo B. Am alten Schafgraben öftlich vom hofiager!!

## \* Cúcumis L.

\* C. sativus L. Ueberall in Garten.

#### 121. Bryónia L.

289. B. alba L. Heden, Zänne, vielleicht ursprünglich nicht einheimisch. Br. Weseram Schr. P. Bornim Schp.! Baumgarten brück!! Sp.!! Or. Liebenberg Kr. Na. Königshorst H. S.! Kremmen: Linum H. Lw. Frankenjörde Rt. B. Wilmersborf Thiele! beim Dustern Keller Schp. Rft. Vorstadt; Zainhammer Bch. Biessenthal: Lanke A. Br.

290. B. diooca Jacq. Bie vorige, viel feltener. B. Pantow an ber Gubseite R.! Frangöfijch-Buchholz Kr. A. Kaulsborf D.

# 35. Familie. Portulacaceae Juss.

## + Portulaca Tourn.

† P. oleracea L. Stammt aus Gub-Europa; bei uns nur als Gartenunfraut und an Zäunen, selten. B. Sanssouci Schp.! Beelity: Elsholz Krumbholz. B. Dieffeit bes zoologischen Gartens Thiele! bei ber v. b. hept-Brude W. M. Schöneberg in Garten Bl. † P. sativa Haw. In Gemiljegarten baufig gebaut.

#### 122. Móntia Micheli.

291. M. fontana L. Feuchte Aeder, an Pfählen, besonders D, sehr zerstreut. B. Pirschheibe Schp.! T. Berghorst P. Lw. Frankenförde Re.! B. Zwischen Französisch-Buchholz und Buch Jahn? Charlottenburg am hohlen See A. Br.! Steglig D. Tempelhof am Pfuhl sudwestlich vom Dorfe!! Br. Bahlow Sch.!

## + Claytónia L.

† C. perfoliata Donn. Stammt aus Nordamerita. Seleten als Gartenunkraut: B. Bellevne 1852 C. Arndt.

# 36. Familie. Paronychiaceae St. Hilaire.

## 123. Corrigíola L.

292. C. litoralis L. Feuchte Sanbstellen, Sandwege, Flußuser, zerstreut. B. haveluser nördlich von Geltow Radig! Schp.!
2w. Frankenförde; Felgentren Rt. Straße von Scharsenbrild nach
Kummersdors!! Trebbin: Zelle; zwischen Christinendors und Gabsdors
Fr.! B. Friedrichsselbe D. Weißense Sanio! Gesundbrunnen R.1
Sübrand der Jungfernheide bet der Birkenstraße!! Schöneberg sübwestlich vom botanischen Garten!! bei der Hasenheide D. R. Kth.
Wernsdorf Jahn! Fw. Am Mauntanal Kn.

#### 124. Herniária Tourn.

293. H. glabra L. Canbfelder, trodue Grasplate, fehr häufig.

## 125. Illécebrum Tourn.

294. I. verticillatum I. Feuchte Sanbfelber, ausgetrodenete Gräben, Moorboben, sehr zerstreut, im süblichen Gebiet häufiger. Beelit: An ber Chausse westlich von Elsholz Rn.! Ew. Bei Lind-horst nach Gottow hin!! nach Berkenbrud zu H. S. II.! Brand bei

Frankenförde; am Fußsteig nach Felgentreu; jenseit ber Ziegeleien Rt. jenseit bes Windmühlenberges Rt.! Trebbin: Zelle Gr. ! B. Friedrichsfelbe; Gesundbrunnen; Reinickendorf D.

# 37. Familie. Scleranthaceae Lk.

#### 126. Scleranthus L.

295. S. annuus L. Canbige Meder, gemein. 296. S. perennis L. Canbfelter, trodne Balber unb Grasplate, haufig.

# 38. Familie. Crassulaceae D. C.

## 127. Bulliarda D. C.

297. B. aquatica (L.) D. C. Fenchte, janbige Stellen, Ufer, außerst felten. B. Weißensee am Pinhl beim Chausseehause nur einmal im Just 1836 von Sonder! gesunden.

#### 128. Sedum L.

298. S. maximum (L.) Sutt. Trodne Bälber, sonnige Dügel, zerstreut. P. Ruinenberg Bs. Karlöberg Schp. Brauhausberg Bs. Sp. Pichelswerber, Nordscite!! Papenberge D. Tegel Bl. Or. Gae. Na. Bredower Forst an den Piepenbergen!! Lindholg!! Jahrberge siblich von Al. Bähnig!! Lw. Nach Lindenberg hin Rt. B. Friedrichsselbe W. M. Pankow D. Jungsernheide; Spandauer Bod!! Charlottenburg beim Schüssenhause!! Fippodrom!! siblich von Schrneberg Bl. Kreuzberg; Fasenbeier; Mollberge D. Alte-Landsberg Gae. Bossen Bl. Fw.!! Nft. sehr viel!!

† S. his panioum L. Bierpflanze aus Guto Europa. B. Bwiichen Steglit und Tempelhof einmal von Racht gefunden. Wohl

nur zufällig ausgefäet.

299. S. villosum L. Torffilmpfe, sehr zerstreut. Sp. Grunewald am westlichen Ufer des Sees dem Schloß gegenüber!! und bei der Hundekehle!! Na Zwischen Selbelang und Retwom Gr. ! B. Lanfwit Bouché! Rft. Drehnig an der Eisenbahn; zwischen bem großen und kleinen See am Wege nach Brit Beh.!

300. S. acre L. Connige Sigel, trodne Balber, Mauern,

gemein.

301. S. mite Gil. Die voriges, nicht felten.

302. S. reflexum I. Connige Hügel, Kiefernwälber, zer-ftreut. B. Pfingstberg; Ruinenberg; Brauhausberg Bs. nach bem

Bannfee bin Schp. Gp. Bichelsborf D. Bichelswerber !! Bichelsberg !! Grunewald an ber frummen Lante Rt.!! Tegel D. Trebbin: Edulzenborf Gre! B. Norbseite bes Schöneberger Fenns Bl. R. Rahns-borf D. hügel zwijchen Woltersborf und ber Schleuse!! Alt-Lanbsberg Gae. Müncheberg Bl. Budow: Priphagen Schl.! Br. Berge nach Biesborf bin Sch.! Fm. Mlaunmert H. Pajchenberg; Falfenberg Beh. Much nicht felten in Gemufegarten.

## 129. Sempervívum L.

\* S. tectorum L. In Gubbeutschland einheimisch, im Gebiet febr baufig auf Dachern angepflangt. Da. Canbhugel beim jubifchen

Begrabnigplat, ficher nur angepflangt!!

303. S. soboliferum Sims. Durre Canbhugel, Riefernwalber, felten. Br. Berge, jett verichwunden Sch. Dift. Bei Barbeds Mühle Beh. Walbrand zwijden ber Berliner Chauffee und bem Turnplat Beh.!! Chorin öftlich von ber Chauffee Beh. Erreicht bier feine Grenze nach Mordweften. Sier und ba auf Mauern und Dadern gepflangt.

## 39. Familie. Grossulariaceae D. C. 130. Ribes L.

† R. Grossularia L. (erweitert). 3m Gebiet wohl nicht einheimisch, fondern nur zufällig verwilbert. B. Un ber Mordfeite bes Chlachtenfees!! Gp. Pichelswerber!! Ra. Bei ber Salteftelle Kintenfrug!! B. Jungfernheibe Schl. (Br. Malgmühle im Clogebuid Sch.!) Rft. Hach Commerfelbe bin!! Ueberall in Garten.

† R. alpinum L. 3m Gebiet nicht einheimisch; baufig in Barts angepflangt; auch bier und ba balb wild, fo B. Thiergarten!!

304. R. nigrum L. Feuchte Laubwälder und Gebuiche, Berftreut. P. Ruthewiesen Bs. Gp. Pichelsberg Bl. Tegel D. Ra. 3m und am Briefelang!! Em. Burgerbuich Rt. B. Fuchsberge!! Jungfernheibe!! Dieffeit Treptow!! Alt Landsberg Gae. Fm. Geltener in Garten.

305. R. rubrum L. Bie voriges, jehr zerstreut. Sp. Tegel D. Ra. Briefelang D. B. Schönhaufen D. Jungsernheibe an ber Bestieite ber Mödernit!! (Tbiergarten!! ob wild?) (Br. Malgmühle im Elegebuid Sch.!) Rft. Un ber Comarge unterhalb bes Bainbammers Beh.!! In Garten baufig.
\* R. auroum Pursh. Sanfiger Zierftrauch aus Rorbamerita.

\* R. sanguineum Pursh. Bierftrauch aus Rorbamerita.

# 40. Familie. Saxifragaceae Vent.

## 131. Saxifraga L.

306. S. Hirculus L. Moorwiesen, sehr zerstreut. Or. Wiesen nordwestlich von Grüneberg R.! Strausberg bei ben Lilien-Convallienwällen Gae.! Biesenthal: Moorwiesen westlich ber Stadt am

Bege nach Lante bin Jahn!

307. S. tridactylitis L. Feuchte, sandige und lehnige Aetter, Higel, Mauern, zerstreut. B. Communs Schp. Sanssouci; Kirch-hofsmauer Bs. Sp. Schl.! an der Südsseite von Pichelswerder Bl. Dr. Schlofigarten Rn.! Na. Falkenhagen D. am Bege vom Finernug nach Brieselang!! im großen havelländischen Luche auf Dämmen und Mauswurfsbügeln, sehr verdreitet, z. B. bei kuhborst!! Königsborst H. S. Dreibriden!! Kremmen: Linum: Krumme Horst H.! Tiehow!! Lw. Felgentreu; Frankensörde Rt. B. Friedrichsselbe D. Französsisch-Buchholz!! zwischen Pankow und dem Schönbauser Park!! jenseit Treptow!! Br. Baylower Biese; Kunersborf an der Büchnit; Schulzendorf am Upstall Rn. beim Landhof Rn.! Rf. z. B. auf den Höhen nach dem Eichwerder hin!!

308. S. granulata L. Sonnige Hügel, trochne Wälber und Wiesen, nicht selten. P. Pfingstberg; Ruinenberg Bs. Beim Neuen Balais!! Baumgartenbrück Schp. Brauhausberg; Babelsberg Bs. Sp. Bichelswerber!! Pichelsberg!! an der frummen Lanke!! Schoß Grusnewalb!! Tegel D. Bredower Forst!! Lindholz an der Eisenbahn! Dreibrücken auf dem Damm nach Lobeossund zu !! Lobeossund H. S. Kremmen: Rhintuch H.! B. Diesseit Französisch-Bucholz!! Jungsfernheide D. Giesensbors!! nördlich am zoologischen Garten!! Stegstiger Hölzschen Bl. jenseit Tempelhos!! Kreuzberg!! Hascheide am Sildrand!! Rollberge D. Teeptow Keh. Br. Kunersbors: Büchnigkungsläcken Beichalbors; Wetzborser Berge Rn. Fw. Bei der Papiermilbse!! Rein Schulzendors; Wetzborser Berge Rn. Fw. Bei der Papiermilbse!! Rein Schulzendors! Wathenbause!! Walb nach Sommerselde bin!!

## 132. Chrysosplénium Tourn.

309. C. alternifolium L. Feuchte Walbstellen, Quellen, Moorwiesen, zerstreut. Br. Götzer Elsbruch Schr. P. Quelle an ben Ravensbergen Bs. Sp. Tegel am See westlich vom Park!! Hundetehle Bl.! Na. Haltestelle Finkenkrug!! beim Forsthause Jägerborf Gr.! B. Am Markgrasenbanm W. M. bei ben Fuchsbergen D. östlich von Französisch-Buchholz!! Pankow an ber Norbseite!! Schönhauser Park!! Reinidendorf D. Thiergarten bei ber Statue Fries

brich Wilhelms III. und bei der Fasaneriebrücke!! zwischen dem Buschkrug und Ober-Nipdorf W. M. A. Süblich vom Alten Grund am Kaltsee!! Alt-Landsberg Gae. Mincheberg: Heiderug!! Wr. Büchnitz bei Möglin Rn. Fw. Sch.! Rft. Wiesen an der Schwärze vom Brunnen auswärts!! am Ende des Weidendamms!!

# 41. Familie. Umbelliserae Juss.

## 133. Hydrocótyle Tourn.

310. H. vulgaris L. Moorwiesen, Ufer, feuchte Walbstellen, nicht selten. B. Ruthewiesen; Tornow; Ablage; Templin Bs. Schlachtenses Schp. Sp. Grunewald Bl. Tegel D. Or. Gae. Na. Gr. Königshorst H. S. Kremmen: Am Rhin H. Ew. Lindhorst!! zwischen Frankenselbe und Frankensorden let. Trebbin: Schulzendorst Gr.! B. Bublieibe bei der Eisenbahn J. Jungsernheide am Rögensele!! Thiergarten Bl. Tempeshos!! Alt-Landsberg Gae. Stortow: Friedersdorf H.! Rst. Stadtbruch; Leuenberger Wiesen Bch.

#### 134. Sanícula Tourn.

311. S. europaea L. Schattige Laubwälber, sehr zerstreut. Sp. Tegel Th. Vogel! Or. Liebenberger Bark N.! Na. Bredower Forst D. A. 3w. Woltersborf und ben hinteren Bergen R. Blumenthal D. Fw. Zwischen bem hammerthal und Maunwerk!! Mft. Cichwerber Beh. Schanzenberg Beh.! vom Schügenhause bis Spechthausen Beh. Karlswerk beim Betriebsgarten H.

#### 135. Astrántia L.

312. A. major L. Fruchtbare Biefen, fehr felten. Nur Trebbin: Schulzenborf, Biefen westlich vom Dorfe und nach ber Kummersborfer Forst zu Gr.!

## 136. Erýngium Tourn.

313. E. campestre L. Sandige Triften, sehr selten. Na.

Bei Tremmen Sehr. Etin Sehl.

† E. planum L. 3m Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur zufällig an Zäunen verwilbert. B. Beim Michaels-Kirchplat 1857 Tietz!

#### 137. Circuta L.

314. C. virosa L. Grüben, Ufer, Floßbolz, nicht selten. B. Bornstebt; Ruthe; Tornow Bs. Sp. Grunewald!! Pichelsberg Schp. Bichelsborf; Tegel D. Dr. Gae. Kremmen: Rhinluch H. Lw. Am

Fußsteig nach Kolzenburg Rt. B. Auf Floßholz in ber Spree (trot aller polizeilichen Berbore)!! Diesseit Stralau und Rummelsburg!! Reinickendorf D. am Plötzenies W. M. Tempelhos!! Zossen: Zwischen Rummersdorf und Sperenberg Gr.! Storkow: Friedersdorf H.! Rft. Finowkanal Beh. Biesenthal nach Lanke hin A. Br.

b) tenuifolia Froelich (als Art). Tiefe Gumpfe, feltener.

Sp. Grunewalb!! B. Jungfernheite Thiele!

# 138. Ápium L.

315. A. graveolens L. Salzwiesen, sehr felten. Beelit: Salzbrunn an ber Salzquelle P. Rn.! Rt.! Baufig in Garten und auf Medern gebaut.

#### \* Petroselinum Hoffm.

\* P. sativum Hoffm. Befanntes Rüchenfraut aus Gub-Europa.

#### 139. Helosciádium Koch.

316. H. repens (Jacq.) Koch. Feuchte Triften, Moorwiesen, sehr zerstreut. P. Baumgartenbrück Schp.! Sp. Bei den Papenbergen Kth. T. Niebelhorst P. Lw. Felgentreu Kt. B. Beim Lichtenberger Kietz C. Bouché jun.! Weißensee Schl. bei der Köpnicker Heide Bouché. Baruth Rbh.

#### 140. Falcária Rivin.

317. F. sioides (Wib.) Aschs. Wege und Aderränder, besonders auf Lehmboden in D, nicht selten. Br. Weseram Schr. K. Muinenberg Bs. Sp. D. Na. sehr häusig!! Kirchhof zu Königsthorst; Dechtower Forst H. S. Br. Felgentren Kr. B. Friedrichöstelte D. Biesdorf Schl. Friedrichöhain!! bis Lichtenberg J. Weißeuser D. Schwargendors!!! Wilmersdors!! Schwersg!! Kreuzberg!! Tempelhessehr häusig!! A. Kanlsdorf D. Alte-Landsberg Gae. Zossen: Sperrenberg!! Wr. Möglin Rn. Fw. Weinberg Kn. Nst. Beh.

## + Ammi Tourn.

† A. majus L. In Gilb-Guropa einheimisch; im Gebiet nut selten mit Lugernesamen eingeschleppt. Bei Werneuchen 1841 Gae.

## 141. Aegopódium L.

318. A. Podagraria L. Laubwalber, Gebuiche, Gartenlant, gemein.

#### 142. Carum L.

319. C. Carvi L. Biefen, Begranber, febr baufig.

## 143. Pimpinella L.

320. P. magna L. Laubwälber, Gebüsche, trodne Wiesen, zerstreut. Br. Lünowsche Zäune Schr. P. An ber Sibseite von Telstow W. M.! Sp.; Papenberge D. Tegel Kth. Na. Brieselang D. Lindholz Hertzsch. Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Friedrichsselber Park!! süblich vom zoologischen Garten!! Schöneberger Busch Bl. Rudower Wiesen!! bei Johannisthal!! A. Milbersdorf Kth. Altzandsberg Gae. Bucow: Prithagener Mühle Sch.! Wr. Bahlower Mühle Thiele! Nft. Weibendamm Bch.

321. P. Saxifraga L. Balber, Sügel, Begranber, gemein.
b) hircina Leers (ale Art). Un benfelben Orten, viel

feltener. Cp. Schilbhorn!! Ra. Jahnberge H. S.!

c) nigra Willd (als Art). An benfelben Orten, auf Lehmsboben in D, nicht felten, 3. B. Bewefin Schr. Ra. sehr häufig!! B. Kolonie Hohen-Schönhausen!! beim Gasthof zur weißen Taube J.! Wilmersborf!! Kreugberg!! R. Rübersborfer Kalkberge!!

† P. Anisum L. In Silb-Europa einheimisch. Hier nicht gebaut, nur hier und ba, zuweilen zahlreich, verwilbert, boch unbeständig. B. Wiesen vor dem Franksurter Thor 1857 J.!

#### 144. Bérula Koch.

322. B. angustifolia (L.) Koch. Gräben, Bäche, zerstreut. B. Am Tornow Bs. Ruthewiesen Bs.! beim Schlachtensee Vocke. Sp. Tegel Kth. B. Friedrichsfelde D. in der Panke oberhalb bes Gesundbrunnens Winkler!! Charlottenburg D. zwijchen dem Buschtrug und Ober-Rixdors!! K. Tasborf D. Alt-Landsberg Gae.!! Zossen: Süblich von Sperenberg!! Wr. Am Baglower Fließ Sch.! Nft. Weidendamm; Finowkanal Bch. an der Oberberger Chaussebiesseichtes biesseich der Mönchsbrücke!!

#### 145. Sium L.

323. S. latifolium L. Gräben, Sümpfe, gemein. \* S. Sísarum L. In Asien einheimisch, häusig gebaut.

## 146. Bupleurum Tourn.

324. B. tenuissimum L. Salzhaltige Triften, fehr felten. Rur Ra. Beim Selbelanger Jägerhause Körnicke! H. S.! Zuerft von A. R. Philippi entbedt.

Micherson, Mora. 2. Abthl.

325. B. falcatum L. Gebüsche, sehr selten. Rur B. An ber Sübseite von Tempelhof C. Bouché sen! Ob noch jett zu finden? † B. rotundisolium L. Im Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur als Gartenunkraut. Or. Schlofigarten Rn.!

## 147. Oenanthe L.

326. O. fistulosa L. Gräben, an Sümpfen, nicht selten, z. B. B. Beim Kirchhof Rt.! Sp. Pichelsberg; Heiligensee; Tegel D. Dr. Gae. Na. Gr. am Lindholz!! Königshorft H.S. Kremmen: am Rhin H. Trebbin: Schulzenborf Gr.! B. Friedrichsselbe Baetke! Stralau Bl. diesseit Borhagen J. Jungfernheibe D. Wiesengräben biesseit Schöneberg!! Rudower Wiesen Scho. Alt-Landsberg Gae. Stortow: Friedersborf H.! Nft. Am Finowkanal; bei der Kalmusbrilde Bch.

327. O. aquática (L.) Lmk. Gumpfe, Graben, fehr häufig.

#### 148. Aethúsa L.

328. A. Cynapium L. Baune, Gartenland, Meder, febr haufig.

#### 149. Séseli L.

329. S. annuum L. Sonnige Hilgel, Gebüsche, sehr zerstreut. Br. Am Grenzwall zwischen Bewesin und Wachow nach bem See zu Sp.! Schr.! Deet auf einem Gügel nordwestlich vom Springberg Schr.! Ra. Jahnberge!! B. Früher an einem Graben nörblich von Reu-Schöneberg Fr. Otto! scheint jetz verschwunden. Bucow: Reichenberger Heibe Sch. Fw. Broigsborf Icn.! Rft. Karlswert Bch.!

## 150. Cnidium Cuss.

330. C. venosum (Hoffm.) Koch. Feuchte Wiesen, an Gräben, zerstreut. Br. Ketilr Gr. P. Bei ber Pirscheibe Schp.! Sp. Tegel am Nanbe ber Forst nach Berlin bin A. Br.! Na. Im Lindholze an ber westlichen Spitze!! Trebbin: Schulzenborf; Zelle Gr.! B. Wiese bei ben Fuchsbergen Dr. Marsson; nörblich von Reiniden vorst!! Wiesen zwischen bem Spandauer Bod und Pickelsberg seinzeln Schp.!! Sübwesseitet bed Schöneberger Vusches Bl. an ber Eisenbahn biesseit Schöneberg!! Chaussegraben am Krenzberge Schp. am Köpnider Weg kurz nach seiner Trennung von ber Chaussee!!

## 151. Sílaus Bess.

331. S. pratensis (Lmk.) Bess. Trodne Biefen, Gebüsche, selten. B. Stralau C. Bouché sen.! ob noch jett?

#### † Levisticum Koch.

† L. paludapifolium (Lmk.) Aschs. Stammt aus Sub-Europa; hier und ba gebaut und halb wilb. P. Pfauen-Insel Bs. Or. Kr.

## 152. Selínum L.

332. S. Carvifolia L. Wiesen, Laubwälder, zerstreut. Sp. Grunewald bei ber Rhinmeisterbrücke!! Tegel D. Or. Gae. Ra. Sahnberge in ber Stadtsorst!! Lindholz sehr häufig!! Trebbin: Zwischen Schulzendorf und Reuendorf Gr.!! B. Rummelsburg; Reimidendorf; Jungfernheibe D. silblich vom zoologischen Garten Thiele! Rudower Wiesen Bl. K. Süblich von Friedrichsbagen in der Nähe des Milggelses Bl. Mft. Leuenberger Wiesen Bch. Biesenthal nach lanke hin A. Br.

## 153. Ostéricum Hoffm.

333. O. palustre Bess. Feuchte Wiesen, sehr selten. Na. Beim Bredower Forsthause jett sehr einzeln Körnicke!! zuerst von Philippi entbedt.

## 154. Angélica L.

334. A. silvestris L. Feuchte Wiesen, Landwälber, nicht seletn. B. An der Havel zwischen Tornow und Templin Bs. Ep. Paspenberge; Tegel D. Staaten Kr. Or. Gae. Na. Beim Bredower Forsthause!! Kremmen: Rhinluch H.! Trebbin Gr.! B. Friedrichsseleber Part!! dieseit Rummelsburg!! zwischen dem Gesundbrundend Pantow!! nördlich von Wilmersdorf W. M. Wiesen am Schiffsahrtstanal bei der v. d. Heydt-Brücke!! Schöneberg!! süblich von Ripdorf!! K. Tasdoorf D. Alt-Landsberg Gae. Ast. An d. Schwärze; am Kanal Bch. Biesenthal nach Lante hin A. Br.

## 155. Archangélica Hoffm.

335. A. sativa (Mill.) Bess. Graben, Ufer, fehr zerstreut. B. Bart von Buchow-Karpzow 1858 Sp.1 Sp. Savel bei Bichelsberg einzeln Bl.1 Or. An ber Havel bei ber chemischen Fabrit und am Kanal nach Pinnow bin Rn.! T. Am Schlalacher Mühlenstieß bei Berghorst P., Rt.! Ew. An ber Nuthe oberhalb Elsthal!! und nach

ber Papiermuble bin Rt.1 Rft. Am Finowfanal aufwärts bis Schöpf-furt Bch.1

#### 156. Peucédanum L.

336. P. Cervaria (L.) Cuss. Sonnige hügel, trodne Laubwälber, sehr zerstreut. Br. Eisstutenberg bei Gr. Kreut Schr.! Sp. Papenberge D. Na. Bredower Forst süblich vom Forsthause Körnicke 1856!! Ew. Weinberg bei Dobbritow Rn.! Rt.! K. Rübersborfer Kaltberge Gae. Zossen: Sperenberger Gipsberge!! Fw. Sonnenburg Sch.! Weinberg!! Paschenberg Bch.!! Rst. Karlswert Bch.!

337. P. Oreoselinum (L.) Mnch. Trodne Wälber, Wiesen, Higel, nicht selten. B. Baumgartenbriid!! Al. Glienicke Bs. Sp. Im Glacis W. M. Papenberge D. Tegel Bl. Dr. Schmachtenhagen Gae. Na. Bredower Forst!! Beinberg!! Linbholz!! Jahnberge!! Kremmen: Rhinluch H.! Trebbin: Bestlich von Neuendors!! Buchseberge!! beim Gasthof zur weißen Tanbe J.! Pankow Kth. Jungfernheibe!! Charlottenburg; Wilmersdorf D. Schmargendorf am Hohlewege!! Hasenbeide D. Rudower Wiesen!! A. Schl. Woltersdors!! Alteandsberg Gae. Honow!! 30ssen! Sperenberg!! Fw. Belvedereberg!! Köthen Rn. Nst. Beim Brunnen!!

## 157. Thysselinum Rivin.

338. T. palustre (L.) Hoffm. Sumpfige Wiesen, Gebüsche, häusig, z. B. P. Authewiesen Bs. Schlachtensee!! Sp. Grunewald!! Or. Gae. Na. Beim Bredower Forsthause!! Luch nördlich vom Lindholz H.S.! Aremmen: Rhinluch H.! Ew. Felgentreu Ret.! Schösneweide!! B. Oberhalb bes Hegemeisters!! Wuhlheide J.! süblich von der Inngsernheide!! Witzleben W.M.! beim Kursürstendamm!! Tempelhof D. südlich von Kirdors!! Rudower Wiesen!! Rst. Beh. Biesenthal nach Lante hin A. Br.

#### † Anéthum Tourn.

† A. graveolens L. Stammt aus Gub. Europa. Saufig in Garten und nicht felten auf Schutt u. f. w. einzeln verwilbert.

#### 158. Pastináca Tourn.

339. P. sativa L. Biefen, Wegrander, fehr häufig.

#### 159. Heracléum L.

340. H. Sphondýlium L. Biefen, Graben, Wegranber, fehr häufig.

b) discoideum. Doch häufiger ale bie Sauptart.

## 160. Tordylium Tourn.

341. T. maximum L. Seden, febr felten. Rur Fw. Am Schlofigarten Rn.!

## 161. Laserpícium Tourn.

342. L. pruténicum L. Laubwälber, trodne Wiesen, sehr zerstreut. Sp. Papenberge Lessing! Na. Falkenhagener Beibe D. Lindholz H. S.! B. Audower Wiesen!!

## 162. Daucus Tourn.

343. D. Caróta L. Biefen, Begranber, Bilgel, gemein. Bau-fig gebaut.

## 163. Caúcalis L.

344. C. daucoides L. Lehmäder, felten. Fm. Beinberg Rn. Aft. Bei Barbeds Muble Beh.!

#### 164. Tórilis Adans.

345. T. Anthriscus Gmel. Gebüsche, Zäune, gemein. 346. T. infesta (L.) Koch. Aderränder, Hügel, sehr selten, aber wohl mehrsach übersehen; vielleicht nur eingeschleppt. B. In der Lehmgrube östlich der Anhaltischen Eisenbahn Hl.!! und bei der Hopfschen Brauerei Winkler!! spärlich, aber seit über 10 Jahren stets wieder gesunden. Zuerst von Bauer entbeckt.

#### 165. Anthriscus Hoffm.

347. A. silvestris (L.) Hoffm. Gebuiche, Balber, febr baufig.

† A. Corofolium (L.) Hoffm. In Silb-Europa einheimisch; bekanntes Rüchengewächs; hier und ba in Menge verwilbert, boch

unbeständig.

. 348. A. Scandix (Scop.) Aschs. An Zäunen, Dorfstraßen, nicht selten, z. B. P. Pfingstberg Bs. nach Tornow hin Bl. Sp. Schl. B. Exercirplat vor bem Schönhauser Thor!! Pankow!! Charlottenburg Schl. Gisenbahn biesseit Schöneberg W. M. bei ber Popfschen Brauerei!! an ber Chaussee nach bem Rolltrug Rei.

## 166. Chaerophyllum L.

349. C. témulum L. Laubwälber, Gebuiche, an Zäunen bäufig.

350. C. bulbosum L. Wie voriges, sehr zerstreut. Br. Frilber in bem (jetzt urbar gemachten) Bachower Werber Sp.! Bilbparkstation Bs. Na. Im westlichen abgetrennten Theil ber Bredower Forst!! Bredow nach Nauen hin Gr.! T. Buchholz P. B. Charlot-tenburg D. Wilmersborf Bl.! Kirchhof zu Brig R.! beim Buschtrug Rei.! Nst. An einem Graben westlich von Hohen-Finow Bch.

#### 167. Conium L.

351. C. maculatum L. Dorfftraßen, Zäune, zerstreut. Br. Bewesin Schr. P. Bornstedt Schp. ! Al. Machenow bei ber Mühle W. M. Sp. D. Bichelsborf!! Trebbin: Schulzenborf!! Reuenborf!! B. Beißense W. M. Charlottenburg; Wilmersborf D. Schöneberg Bl. Tempelhof beim Kirchhose!! beim Buschtrug!! Nft. Auf einem Holzplat an ber Oberheibe; Sommerselbe; Tornow; Trampe Bch.

### + Coriandrum L.

† C. sativum L. Stammt aus Sub-Europa; bei uns nur selten gebaut und verwilbert; stets unbeständig. Rft. Beh.! bei Karls-werk einmal in Menge Beh.

# 42. Familie. Araliaceae Juss.

#### 168. Hédera L.

352. H. Helix L. Laubwälder, zerstreut. Rur an ben gesperrt gebrudten Orten blübenb. B. Sanssouci!! Ra. Briefelang!! Stabtsorft Gr. Linbholz Rn.! Fasanerie bei Königshorft H. S.!! Trebbin Gr. Hw. Bei ber Ziegelei!! Hammerthal Kn. Rst. Beim Zainhammer!! Ueberall angepstanzt und an häusern und Zäusnen nicht selten blübend.

# 43. Familie. Cornaceae D. C.

## 169. Cornus Tourn.

353. C. sanguinea L. Lanbwälber, Gebüsche, zerstreut. Br. Bewesin am Lötzkanal Schr. P. Linbstedt Bs. Sp.; Papenberge; Tegel D. Or. Gae. Na. Bredower Forst!! Stadtsorst (Dahnberge)!! Lindholz!! Lw. Beim süblichen Kirchhof Rt. B. Huchsberge Rei. Jungfernheibe D. zwischen Buichtrug und Ober-Nirvors Rei. Treptow D. Alt-Lanbsberger Forst Gae.! Hw. Bei der Papiermilble Rn. Rs. Kniebusch; Schülzenhaus; Zainhammer Bch. Auch angepflanzt.

+ C. alba L. Saufiger Bierftrauch aus Norbamerifa. Bermilbert B. Stralau Ru. in ber Modernit A. Br.! Charlottenburg Rn. an ber Spree zwischen ben Belten und Bellevue!! zwischen Steglit und Lantwig in einer Elslafe Thiele!

† C. mas L. Bierftrauch aus Mittelbeutschland. Richt felten

gepflanzt.

## 44. Familie. Loranthaceae Don.

#### 170. Viscum L.

354. V. album L. Im Gebiet fast nur auf Riefern schmarobend, zerstreut. Sp. Grunewald Schp. Bichelsberg Bl. Stadtsheibe; Tegel Kth. Ew. Gottow!! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Jungfernheibe Kth. Thiergarten!! Hasenheibe!! Alt-Landsberg Gae. Fw. Afazienberg Sch.! Rst. (Birken) Bch.

# 45. Familie. Caprifoliaceae Juss.

#### 171. Adoxa L.

355. A. Moschatellina L. Schattige Laubwälder, Geblische, zerstreut. B. Sanssouci!! Sp. Papenberge D. Na. Brieselang!! Fasanerie bei Königshorst H. S.! Gr. Bähnitz Gr.! Lw. Freigraben bei Elsthal; Bürgerbusch Rt. Trebbin: Nach Kliestow hin Gr. B. Friedrichsselbe D. Franz. Buchholz Schp. Schönhauser Park!! Altelandsberg Gae. Wr. Büchnitz bei Möglin Rn. Fw. Sch.! Papiermühle!! Nst. z. Eichwerder!! Schanzenberg!! Zainhammer!!

## 172. Sambúcus Tourn.

† S. Ebulus L. İm Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur an Zäunen, in Gärten verwilbert. P. Bornstebt in ber Nähe bes Sees Bs. Pirschheibe Schp.! B. Charlottenburg Rn.! biesseit ber Moabiter Brücke!! Br. Möglin Rn.

356. S. nigra L. Feuchte Laubwälder, Gebiliche, zerstreut. Sp. Grunewald!! beim Schwanentrug bieffeit Schönwalde!! Ra. Fasanerie bei Königshorst H. S. B. Fuchsberge!! Rft. Zwischen Tornow

und Soben-Finow !!

S. racemosa L. Im Gebiet nicht einheimisch; in Anlagen bier und ba gepflanzt.

#### 173. Viburnum L.

357. V. Opulus L. Feuchte Gebuiche, nicht selten. B. Sanssouci; Wilbpart Bs. Sp. D. Pichelsberg Bl. Saatwinkel!! Tegel
D. Na. Bredower Forft Rei. Stadtforst beim Beinberg!! Fafa-

nerie bei Königshorst H. S. Gr. Bahnit Schr. Lw. Felgentreuer Bulch Re.! Trebbin: Schulzenborf Gr.! B. An ber Spree bieffeit Stralau Schp. Fuchsberge J. Jungfernheibe in ber Mödernit!! Schoneberger Bulch Bl. jenseit Rixborf!! Jobannisthal; Treptow D. Rft. An ber Schwärze Bch. am fleinen See!! Auch Zierstrauch.

\* V. Lantana L. Säufiger Zierstrauch aus Mittelbeutschland.

## 174. Lonicéra L.

358. C. Periclymenum L. Gebuiche, Laubwälber, sehr zersstreut. B. Sanssouci Schp. Or. Kr. Na. Brieselang Schl. B. Jungfernheibe am Oftrande ber Mödernith!! Thiergarten!! Br. Hasselberg Sch. Nft. Diesseit Bornemannspfuhl Bch. hier und ba angepflanzt.

\* L. Caprifolium L. Saufiger Bierftrauch aus Gubbeutich-

land.

359. L. Xylósteum L. Laubwälber, felten. Lindholz Rn. Mft. Schanzenberg Beh.!! Abhang unter bem Schützenhause!! Zuweisten angepflanzt.

\* L. tatarica L. Bierftrauch aus Dft-Europa.

## 175. Linnaea Gronovius.

360. L. borealis Gronovius. Schattige Kiefernwälber, sehr zerstreut. Sp. Teufelsgraben bei Pichelsberg unweit ber Havel!! Tegel uordwestlich vom Wirthshause!! hier 1789 zuerst in ber Mark von Willdenow entbeckt\*). Fw. Nach Köthen zu Dr. Berg.

# 46. Familie. Rubiaceae D. C.

361. S. arvensis L. Lehmäder, selten. B. Sanssouci unweit bes Obelisten Bs.! im Feigengarten Schp. (eingeschleppt). Na. Bei ben Scheunen Gr.! Königshorst in Beders Nachtloppel H. S.! B. Sübwestlich von Charlottenburg R. A. Rübersborf Schl. Fw. Weinberg Rn.!! beim Schlosgarten Rn. Nst. Karlswert nach Nieber-Finow hin Bch.

<sup>\*) 3</sup>ch verbanke bie genaue Bestittellung bieses Datums bem grhrn. A. r. Humbolde. Sein außerst freundliches Schreiben, beffen Mittheilung ich mir leiber verfagen muß, beweift, ein wie lebhaftes Intereffe ber allumfaffenbe Geift bes großen Naturforschers auch fur die specielle Naturgeschichte seiner heimath behalten hat.

## 177. Aspérula L.

362. A. tinctoria L. Connige Sugel, trodne Balber, gerftreut. B. Birichbeite Schp.! Gp. Grunemalb; nach Ralfenbagen bin D. Bavenberge Thiele! Schulgenborf Rei.! Ra. Bievenberge !! Brebower Forftbaus!! B. Fuchsberge J.! Jungfernheibe bei ber Scharfrichterei!! R. Friedrichsbagen Gr.! Rubereborfer Ralfberge!! Landhof Rn. Fw. Bieglerberg Rn. Pafchenberg Beh.!! Rft. Monchsbrude: Schutenhaus Bch.! Birtenallee nach bem Brunnen Bch.

363. A. cynanchica L. Bie vorige, nicht felten. Br. Retilr Gr. Gistutenberg bei Gr. Rreut; Lebnin Schr. Betershof bei Be-B. Ruinenberg Bs. Baumgartenbriid!! Braubausberg Bs. Sp. Bicelsborf!! Grunewalb!! Papenberge; Tegel D. Ra. Jahnberge!! amijden Mothlow und Bujdow!! Beelit Bt. Im. Beinberg bei Dobbritom Rt.! B. Tucheberge!! beim Bafthof gur weifen Taube J.! Boffen: Sperenberg!! Baruth Rbh. Br. Lanbhof Rn. Berge bei ber fleinen Duble Sch.! Sm. Thiele!

364. A. odorata L. Schattige Laubwalber, gerftreut. Gp .: Bapenberge D. Tegel Kth. Dr. Sarnow Rn.! Liebenberg Rn. Berpenfchleufe Jahn. Ra. Briefelang Be.! am Jagelitgraben Gr. Lindholg!! Fafanerie bei Königshorft H. S.!! B. Thiergarten beim Forfterhause Rei.!! Fm. Beinberg Ru.! zwijchen bem hammerthal und Mlaunwert!! Rft. Schangenberg; Rupferhammer Beh. vom Brunnen bis Spechtbaufen Beh.! am Berbellin-Gee H. Biefentbal: Lante Schl. In Garten gebaut.

#### 178. Gálium L.

† G. Cruciata (L.) Scop. Im Gebiet wohl nicht einbeimifd. fonbern nur eingeschleppt bei Budow Radia!

365. G. Aparine L. Gebuiche, Laubwalber, Meder, gemein. b) Vaillantii D. C. (ale Art). Meder, gerftreut, aber mobil

oft iiberfeben. B. Bor bem Ronigstbor !!

c) spurium L. (als Art). Meder, befonbere unter Klachs. nicht häufig. B. Beißenfee hinter bem Gafthofe A. Br.! Reis

nidenborf A. Br.! Schoneberg Thiele! 366. G. uliginosum L Feuchte Biefen, Sumpfranber, nicht felten. a. B. B. Um Schlachtenfee!! Cp. Tegel Schl. Sauptgraben bei ber Gelbelanger Brude H.! (G. tricorne bei D.) Im. Rach Frankenfelbe bin Rt.! Bertenbrud H. S. II.! Trebbin: Schulgendorf Gr.! B Friedrichsfelbe Schl. Beigenfee J.! Wilmer8borf Thiele! Tempelhof!! Rubower Wiefen Bl. R. Tasborf A. Br.!

367. G. palustre L. Bie voriges, baufig.

368. G. boreale L. Trodne Biefen, Balber, gerftreut. Br.

Gohlitzer Fichten Sp. P. Bornstebt bei den Teichen Bs. Sp. Grunewald; Papenberge Thiele! Tegel D. Dr. Germendorf Gae.! Ra. Jahlberge!! zwischen dem Sandfrug und Barnewity!! Lw. Zwischen Frankensörbe und Gottsborf Rt.! Trebbin: Schulzenborf; Neuenborf Gr.! B. Fuchsberge J.! Jungsernheibe, besonders süböstlich vom Plögensee!! Hippodrom!! Rudower Wiesen!! Strausberg: Listenscondlien-Wälle Gae. Br. Methorfer Berge Thiele! Fw. Monte Caprino Ra. Nft. Schützenhaus; Brunnen Bch.

369. G. verum L. Trodne Balber, fonnige Bugel, gemein.

370. G. Mollugo L. Wiesen, Graben, Gebuiche, gemein.

371. G. silvaticum L. Schattige Laubwälber, zerftreut. Na. Brevower Forst!! Lindholz Schr. Fasanerie bei Königsborst H. S.! B. Thiergarten bei ber Löwenbrilde einzeln 1857 Rei.! und unweit bes Försterhauses beim zoologischen Garten W. M. Strausberg Gae.! Fw. Brunnen Rn. süblich vom Alaunwert!! Nst. Schüzzenhaus!! Brunnen!! Biesenthal: Lanke Schl.

372. G. saxatile L. Feuchte Walbstellen, Gräben, sehr zerstreut. Sp. Grunewalb; Stadtheibe D. Na. Zwischen Falkenhagen
und bem Finkenkrug Rn.! B. Jungferuheibe; Löpnider heibe D.

† G. silvestre Poll. Gebuiche, jehr felten. B. Nörblich vom zoologischen Garten Körnicke, W. M.1 jebenfalls wohl zufällig eingesichleppt und seit mehreren Jahren wieder verschwunden.

369 × 370. G. verum x Mollugo. Gebüsche, Wegrander,

mit ben Eltern gerftreut.

# 47. Familie. Valerianaceae D. C.

## 179. Valeriána L.

373. V. officinalis L. Feuchte Wiesen und Gebülche, nicht selten, 3. B. B. Bornstebt; Ruthewiesen Bs. Sp. Bichelsberg; Papenberge Kth. Na. Königshorst H. S. Lw. Oberhalb Elsthal!! Bürgerbusch Rt. B. Friedrichsselbe; Jungfernheibe Kth. Charlottenburg; Schöneberger Busch Bl. zwischen Rieders und Treptow!! Rubower Wiesen Rei. Storkow: Friedersborf H. Br. Batlower Wiesen Rn.

b) minor Koch. Sonnige Hügel, nicht häufig. R. Rill bersborfer Kalfberge D. Rft. Unweit bes Zainhammers!!

374. V. dioeca L. Feuchte Biefen, Sumpfranber, baufig.

## 180. Valerianella Tourn.

375. V. olitória (L.) Poll. Aecker, Begränder, häufig. 376. V. carinata Loisl. Aecker, selten. B. Tempelhof Fritzsche! Ob wirklich einheimisch?

377. V. dentata (L.) Poll. Aeder, besonders auf Lehmboben, zerstreut. Sp. Kth. Na. Beders Nachtsoppel bei Königshorft H.S. B. Charlottenburg Kth. zwischen Wilmersdorf und dem Grunnewald Garcke. Steglitz Kth. bei Tempelhof!! Rollberge Kth. Kei den Rübersdorfer Kaltbergen Kth. Budow: Prithagen Waltert 378. V. Aurscula D. C. Wie vorige, sehr zerstreut. Trebin: Schulzendorf Gr.! B. Zwischen Wilmersdorf und dem Grunewald Garcke. Schöneberg Thièle! Tempelhof Schp.! Riptorf Bl.

## 48. Familie. Dipsacaceae D. C.

## 181. Dípsacus Tourn.

379. D. silvester Mill. Begränder, wüste Pläte, hügel, sehr zerstreut. Br. Pewesin an der Dorftrift; Zachow Schr. P. Bornstedt Schp.! Bs.! Na. Tremmen Gr. Baruth Roh. Fw. Hammerthal!! Schlosberg!! Schlosgrund!! Nft. Hollander; Karlswert; hohen-Finower Felb Bch.

380. D. pilosus L. Feuchte Gebuiche, nur im Obergebiet, felten. Fm. Falkenberg Beh. Rft. An ber Schwärze; Karlswert Rn.

#### 182. Knaútia L.

381. K. arvensis (L.) Coult. Begränder, Biefen, Balber, gemein.

#### 183. Succisa M. & K.

382. S. praemorsa (Gil.) Aschs. Trodne Biefen, Balbränber, häufig; weißblühend Lw. Klinkermühle bei Gottsborf Re.!

## 184. Scabiósa L.

383. S. Columbaria L. Trodne Wälber, Wiesen, zerstreut. B. Beim Neuen Palais Ad. Müller! Wannsee Bl. Sp. Pichelswerber!! an ber Havel bei Schilbhorn!! Hunbekehle Bl. Papenberge D. Bamberge Kth. Tegel D. Na. Bredower Forst!! Lindholz H. Kremmen: Rhinsuch H. Lw. Rauchenberge Rt.! B. Jungfernheibe!! Charlottenburger Schlößgarten!! Spandauer Berg!! Wigleben Bl. Kübersdorf D. Alt-Landsberg Gae.! Mittenwalde Kr. Zossen! R. Rübersdorf D. Alt-Landsberg Gae.! Mittenwalde Kr. Zossen! Baruth Rbh. Wr. Mehdorfer Berge Rn. Fw. Sch.! Nft. Schüben-haus; Brunnen Bch. Stadtforst!! Chorin!!

b) ochroleuca L. (als Art). Connige Bügel, fehr felten.

Rur Müncheberg: Tempelberg Buek!

384. S. suavsolens Desk. Sonnige Hilgel, Kiefernwälber, zerstreut. Br. Eiskutenberg bei Gr. Kreut Hechel! B. Sanssonci bei der Mindmilhte Schp. hohes Seeuser süböstlich der Nebliger Fähre Bl. Katharinenholz Bs. Baumgartenbrild!! Sp. Schilhvorn!! Papenberge Beyrich! Dr. Kr. Na. Weinberg ehr viel!! Jahnberge Rremmen: Linum auf der trummen Horst H.! Lw. Kauchenberge Rt. B. Huchsberge!! beim Plötzense Schp. Budow Bl. Wr. Batsower Mühle; Methorfer Berge; Blichnitz; Upstall Rn. Landhof Sch.! Fw. Weinberg Rn.! Atazienberg; Broigsborf Rn. Nft. Hausberg Bch.!

b) ochroleuca. Gehr felten mit ber Stammart. Na

Jahnberge 1858 Rt. !!

# 49. Familie. Compositae Adans.

## 185. Eupatórium Tourn.

385. E. cannabinum L. Graben, feuchte Gebiliche, nicht felten, 3. B. Br. Gr. Kreut Schr. B. Bornstebt; Tornow Bs. Teltow Bl. Sp. Tegel Kth. Na. Königshorst an ber Fasanerie H. S. Kremmen: Linum H.! Lw. Destlich ber Stabt!! B. Stralau Kth. Friedrichsfelber Park!! Jungsernheibe Kth. Thiergarten W. M. zwischen bem zoologischen Garten und Wilmersbors!! Stordow: Scabp-Luch H.

## 186. Tussilago Tourn.

386. T. Farfara L. Lehmader, Ufer, an Quellen, Sugeln, gerftreut. Br. Lebnin Schr. B. Beim Babnhof Schp. ! Chauffee jenfeit Rl. Glienide; an ben Abbangen nach bem Templin bin Bs. D. Bichelsberg Kr. Bermsborf A. Paalzow! Dr. Kr. Ra. Fallenbagen D. Gr. Bahnit Gr. Trebbin: Coulgenborf Gr. B. Beinersborf D. am Eichengraben unweit ber Bante Hanstein; Schmargenborf D. Bilmereborf Gilbfeite !! am Ginichnitt ber Anhaltischen Gijenbahn zwischen Schoneberg und Tempelhof W. M.!! R. Mableborf D. am Raltfee füblich bom Alten Grunb!! Mit = Landsberg Gae. Boffen: Sperenberg am See!! Stortow: Am Scharmilbelfee bei ber Biestower Mühle C. Schultze! Budow: In ber Gilberfeble!! An ber Büchnit Rn. Frw. Bei ber Laugerei!! Sammerthal; Biegetei Rn. Mft. Beh. 3. B. beim Gesunbbrunnen!! Rarlswert Bl. Biefenthal: am Liepnitiee bei Utborf Kr. Gelten auf ausgeworfener Torferbe: B. Jungfernheibe Hanstein. Stortow: Scaby-Luch H.!

#### 187. Petasítes Tourn.

387. P. officinalis Mnch. Feuchte Biefen, an Bachen, Graben, zerftreut. Na. Dprop Kr. Gr. Bahnit Gr. Tremmen hinter bem Pfarrgarten Schr. Dechtow H. T. Buchholz P. Lw. An ber Nuthe diesseit des Bürgerbusches Rt.! Trebbin: Lübersdorf Gr.! B. Giesensdorf westlich vom Dorse!! K. Mahlsdorf Bl. Alt-Landsberg Gae. Ms. Vorstadt; Aupserhammer; Spechthausen Bch. Hohen-Finow H. Häusig in Parks angepstanzt und halb wild, so K. Sanssiouci!! Bornstedt; Neuer Garten Bs. Na. Amtsgarten bei Königsborst H. S.! B. Friedrichsselber Kark!! (hier nur die weibliche Pflanze) Schönhauser Schlosgarten!! Thiergarten!! Wr. Möglin; Lübersdorf An. Biesenthal: Grünthal Kn.

† P. albus (L. erweitert.) Gaeren. Im Gebiet nicht einheismisch, sonbern nur angepflanzt und verwilbert B. Im zoologischen

Garten am Bach Bl., Tietz!

388. P. tomentosus (Ehrh.) D. C. Sandige Ufer ber größeren Gewässer, selten. P. Havelufer bei ber Pirschheibe Bl. Sp. Pichelsberg!! Sübseite von Pichelswerder!! Fw. An der Badestelle Rn.! Seltener angepflanzt und halb wild: P. An einem Graben in Sanssouci Bs. B. Im Thiergarten Bl.!! Erreicht hier seine Grenze nach Siben.

## 188. Aster L.\*)

389. A. Linósyris (L.) Bernh. Sonnige Hügel, sehr zersftreut. Na. Jahnberge Rt.!! Fw. Fahnenberg bei Sonnenburg Sch. Belvebereberg!!

390. A. Amellus L. Bie vorige. R. Rübersborfer Kaltberge Rn.! Budow: Elpfium Lessing! Fm. Fahnenberg bei Con-

nenburg Sch.! Mft. Rarlewert Bch.!

391. A. Tripolium L. Salzwiesen, an Graben, sehr zerstreut. B. Uet westlich vom Dorfe Weiland! Schp.! Ra. In ber Nähe bes Beinberges am Damm nach Dreibrilden Bch.! H. S.!! Selbelanger Jägerhaus!! Beelit: an ber Salzquelle bei Salzbrunn Li.! Rt.! Trebbin: An ber Nuthegrabenbrude bei Tremsborf R.!

† A. brumalis Nees. Wahrscheinlich aus Norbamerita. Bei und häufig angepflanzt und zuweilen verwilbert. B. Charlottenburger Schlofigarten viel!! am alten Charlottenburger Chauffeehaufe!! an ber Brüdenallee am Zaun bes Bellevue-Gartens einzeln Bt.!!

† A. novi Belgii L. Stammt aus Norbamerita; nicht felten angepflanzt und verwilbert.

a) serotinus Willd. (als Art). B. Bellevue am Spree-

<sup>\*)</sup> Die vermilberten Arten biefer fcmierigen Gattung find größtentheils son Dr. C. H. Schultz bip. beftimmt.

ufer!! Thiergarten zwischen bem hofjäger und ber Fasaneriebrude!! Charlottenburg beim Forsthause unweit Bipleben W. M.!

b) squarrosus Nees. B. Beibengebifde an ber Berlin-

Potsbamer Gifenbahn bieffeit Schoneberg Kornicke!!

c) minor Nees. B. Beibengebuiche bei ber Brude am Cornow!!

† A. luxurians Spr. In Norbamerita einheimisch; bier nur berwilbert. B. Am Spreeufer zwischen ben Zelten und Bellevne Bl. !! \*)

392. A. salicifolius Scholler. An Gräben, sehr selten. Trebbin: sublich von Schulzenborf Gr.!! wohl sicher wild, ba er nirgenbs angepflanzt wirb. Einzelne bort in Gärten befindliche Pflanzen sind nachweislich von dem wilden Standort geholt.

† A. leucanth emus Dest. Bierpflange aus Rorbamerita; vermilbert. B. Thiergarten gwifden bem Boffager und ber Kafane-

riebriide!! \*\*) Charlottenburger Schlofigarten!!

† A. parvislorus Nees. Stammt aus Rorbamerita; nits gends angepflanzt, aber verwisbert. B. Thiergarten zwischen bem Hosigger und ber Fasaneriebriiche viel!! \*\*\*) Charlottenburger Schloßgarten!!

† A. Lamarckianus Nees. Zierpflanze aus Rorbamerita. Berwilbert Ra. Jenseit bes Weinberges in Gebufch am Wiesenrande Schr. B. Bellevue am Spreeufer!! †) bei ber Moabiter Brilde!!

† A. laevis L. Zierpflanze aus Nordamerita; halb wild B.

Tempelhof auf bem Rirchhofe !!

## † Callistephus Cass.

'† C. chinensis (L.) Nees. Saufige Zierpflanze aus China. Zuweilen auf Schutt einzeln verwilbert.

#### † Stenactis Cass.

† S. annua (L.) Nees. Aus Nordamerika stammenb; jett an Bännen, auf Grasplätzen zuweisen eingebürgert. Or. Schlofigarten Gae.! Rn. B. Friedrichsfelder Park unweit des Begräbnisses K. Mülter!! Thiergarten unweit des Hossägers!! Fw. Schlofigarten Rn.! Maunwerk Kn. Rst. Hohen-Finow H.

<sup>\*)</sup> A. Lamarckianus, Beitschrift für bie gesammten Maturmiffenschaften-

<sup>1854.</sup> S. 448.

\*\*) A. salignus a. a. D. S. 447 3um Theil.

<sup>\*\*\*)</sup> A. leucanthemus a. a. D. S. 448. †) A. luxurians a. a. D. S. 448.

## 189. Erígeron L.

+ E. canadensis L. Aus Rorbamerifa eingemanbert; jest

auf Sanbfelbern, an Begen, in trodnen Balbern, gemein.

393. E. acer L. Sonnige Higel, trodne Balber, besonbers D, nicht selten, 3. B. B. Sanssouci; Ruinenberg Bs. Zehlendors!! Sp. Inseln bei Saatwinkel Bl. Na. Gr. Jahnberge H. S. Lw. And ber Eisenbahn silblich ber Stadt Rt. B. Beim Hippotrom!! Sienberglischicht bei Schöneberg W. M. und süblich vom Dorse Bl. Kreuzberg!! Lankvitz Ihiele! Hasenberiebe W. M.!! K. Rübersborser Kalkberge!! Jossen: Sperenberger Gipsbrüche!! Nst. Tornow!!

b) droebachensis Mill. (als Art). Trodne Wälber, seleten. B. Destlich vom Wannsee Schp.! Sp. Walb süblich von

Tegel Schp.

#### 190. Bellis L.

394. B. perennis L. Biefen, Triften, gemein; auch in Garten mit fogenannten gefüllten Bluthen.

## 191. Solidágo L.

395. S. Virga aurea L. Sonnige Higel, trodne Balber, zerftreut. Br. Gr. Kreut auf bem Eistutenberg Schr. P. Sanssiouci unter ben Sichen Schp. Wald zwischen Tornow und Templin!! Abhänge nach ber Pfauen-Insel hin!! Abhänge bei ber Nebliger Fähre Bl. Sp. Bichelsberg Kth. Ra. Bredower Forst!! Stadtforft Gr. Lindholz H. S. Jahnberge H. S.! Lw. Gottow Rt.! Trebbin: Scharfenbrilder Forst Gr.! B. Friedrichsselber Schlosgarten W. M. Fuchsberge Schp. Inngfernheibe!! Charlottenburg diesseit des Schützushauses Bl. Thiergarten W. M.! Passenheibe!! Rollberge!! Köpnicer Weg!! R. Ribersborfer Kallberge!!

† S serotina Ait. Bierpflanze aus Norbamerika. Berwilsbert Ra. Am Runbtheil bei Geelenhorft H. S. ! B. An ber Moabister Brilde!! Charlottenburger Schlößgarten!! an einem Zaun in ber Liehower-Begftraße westlich von ber Potsbamer Straße!! R. Bei

Bellevue Gr.!

# 192. Ínula L.

† I. Holenium L. Im Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur angepflanzt und in und an Garten verwilbert B. Bornim Bs.!

396. I. germanica L. Sonnige hilgel, fehr felten. P. Am nörblichen Ufer bes Glindower Sees unter Schwarzborn Schr.!! Erreicht hier ihre Grenze nach Norbosten.

397. I. saligina L. Trodne Wiesen, Laubwälber, zerstreut. Br. Pewesin nach Weseram zu Schr. Ra. Bredower Forst nörblich ber Eisenbahn!! Stabtsorst Gr. Lindholz!! Lw. Frankensörbe nach Gottsborf hin Rt.1 Trebbin: siblich von Schulzendorf Gr.!! B. Reinicendors; Jungsernheibe D. Rubower Wiesen!! Alt - Landsberg Gae.

398. I. Britannica L. Wiesen, an Graben, sehr häufig.
b) Oetteliana Rohb. (als Art). B. Birichbeibe Scho.!

o) discoidea Tausch. Mit ber hauptart, sehr zerstreut und unbeständig. Ra. Bei ber Bredower Meierei!! bei Lobcofsund H. S.! B. Zwischen bem zoologischen Garten und Wilmersborf W. M.! am Köpnider Wege, Treptow gegenüber!!

#### 193. Pulicária Gaertn.

399. P. prostrata (Gil.) Aschs. Dorfstraßen, Ufer, Triften, zerstreut. P. Bornstebt beim Kirchhose Bs. Sp. Schl. Dr. Gae. Birkenwerber Schl. Na. Dechtow H. Beelig: Elsholz Krumbholz. Trebbin: Löwendorf Gr.! B. Französisch-Buchbolz!! Malchow!! Heisnersdorf Schl. Reinidendors!! Spreeuser westlich der Tichyschen Badesanstalt Bl. Schnargendors!! Bilmersdorf Schp.! Mariendorf Kr. Bernan: Birkholz H. Blumberg Kth. Alt-Landsberg Gae. Buctow: Prithagen Walter! Fw. Amalienhos!! Nft. Sommerselbe!! Tornow Bch.

400. P. dysentérica (L.) Gaertn. Gräben, sehr zerstreut. B. Bornim an der Chausse Weiland! Geltow beim Amt Schp. Sp. D. Dr. Schmachtenhagen Kr. Na. Selbesang; am Unterholz bei Dechtow H. S.! Kremmen: Linum H. Lw. Destlich der Stadt am Wege nach den Mollenhütten!! Trebbin: Schulzendorf westlich am Worfe Gr.!! B. Schönhausen Schl. Jungsernheide D. östlich von Wisseben W. M.! diessein weltlich der Chausse Schp.! Br. Bahsower Wiese Rn. Nft. Alter Gesundbrunnen Bch. an der Chausse nach Chorin, wo die Oderberger Straße abgeht!!

## † Galinsógea Ruiz u. Pavon.

† G. parvislora Cav. Stammt aus Peru; vom Berliner botanischen Garten aus (nach Fr. Otto seit 1812) auf Aedern, an Zäunen verwildert. P. Sanssouci Bs.! Berliner Vorstabt!! Schlachtensee Vocke. Sp. Schloß Grunewald Caspary. Na. Königsborst H. S.! Mangelshorst; Ruhhorst H. S. B. Rummelsburg J. vor dem Königsthor!! Kranz. Buchbolz!! Pantow!! Müllerstraße Schp. bei der Tichylichen Babeanstalt Bl. an der Mitolatstrebe J. auf der süblichen und westlichen Seite der Stadt gemein!! bis Charlottenburg!! Steg-

lit!! Tempelhof Winkler. Bernau: Bornide Rn. Fm. Beim Brunnen!! Rft. Gartengaffen Beh.1

### + Mádia Molina.

† M. sativa Molina. In Chile einheimisch; im Gebiet wohl nirgends gebaut, nur einmal B. Bei Geltow von Filly verwilbert gefunden.

## 194. Bidens L.

401. B. tripartitus L. Sumpfranber, Graben, gemein.

402. B. cernuus L. Wie vorige, nicht felten.

b) radiatus. B. Al. Machenow Bs. Sp. Bichelswerber!! Trebbin: Nach Schulzenborf bin Gr.! B. Beim Begemeister!! Beißenfee!! Aft. Dieffeit ber Monchsbrilde!! zwischen ber Rogafer Ditible und bem Sandtrug!!

c) minimus L. (als Art). Ep. Am Grunewalber Gee!!

B. Dieffeit ber Jungfernheibe W. M.

## † Heliopsis Pers.

† H. laevis (L. fil.) Pers. \*) Seltnere Zierpflanze aus Nordsamerita. Berwilbert B. Um öftlichen Ufer ber Pfauen-Infel!!

## † Rudbéckia L.

† R. ladiniata L. Zierpflanze aus Nordamerita; in Ufergebuischen zuweilen verwilbert. B. Deftliches Ufer ber Pfauen-Insel!! B. Beim hofiager im Thiergarten!!

## + Calliopsis Rchb.

† C. tinctoria (Nutt.) D. C. Säufige Zierpflanze aus Nordamerita. Un Zäunen, auf Schutt zuweilen verwilbert.

#### \* Helianthus L.

\* H. annuus L. Befannte Bierpflanze aus Beru.

\* H. tuberosus L. Stammt aus Brafilien; im Gebiet nicht häufig gebaut.

## 195. Filágo Tourn.

403. F. germanica L. Aeder, besonbers auf Lehmboben, gerftreut. Br. Beferam am Bege nach Bewefin!! B. Bornfiebter

<sup>\*)</sup> Bon Dr. Schultz bip. bestimmt. Afcherfon, Flora. 2. Abthl.

Felb!! Zehlenborf Kth. B. Beigenfee!! Bilmersborf D. Schoneberg Thiele! Steglit D. Tempelhof!! bei ber hasenheibe D.

404. F. arvensis L. Sandige und lehmige Aeder, häufig. 405. F. minima Fr. Aeder, trodne Gräben, Walbboben, häufig.

## 196. Gnaphálium Tourn.

406. G. silvaticum L. Trodne Balber, zerstreut. P. Sansssonic Schp.! Wildpart Vocke; Schlachtenjee Schp. Sp. Stadtheide; Tegel D. Or. Gae. Ra. Bei ber Königseiche bei Pausin!! Bredower Forst!! Trebbin: Kummersborfer Forst Gr.! B. Jungsernsbeibe!! am A-Gestell jenseit Witzleben W. M.! Thiergarten Bl. Hafenbeibe!! am Köpnider Wege biesseit bes Neuen Kruges!! Zossen. Wall, von Sperenberg!! Pr. Afazienberg!! Rft. Derheibe Bech.

407. G. uliginosum L. Sumpfränder, feuchte Aecter, febr

408. G. luteo-album L. Sumpfränder, feuchte Aecker, ausgetrocknete Gräben, zerstreut. Br. Lehnin Beh. P. Charlottenhof auf Grasplägen Bl. Pirschheibe Sehp.! Werber Bl. Sp.; Tegel D. Dalborf Sehl.! Ra. Falkenhagen D. zwischen bem Selbelanger Zügerhause und Paulinenau!! Kremmen: Linum H.! T. Riedelhorft P. Försterhaus bei Salzbrunn Rt.! Lw. Am Fußsteig nach Felgentreu; Brand bei Frankenförbe Rt.! B. Süblich von Friedrichsfelde!! Beißensee!! süblich von Charlottenburg W. M.! bei Charlottenburg am Kanal Bl. Schöneberg D. Tempelhos!! Rudower Wiesen!! K. Bogesborf Kth. Zossen D. Seperenberg!! Nit. Beim Cichwerder Bek. Setelberg Bl.

409. G. dioecum L. Sonnige Higel, trocine Wälber und Wiesen, nicht selten, z. B. P. Bs. Sp. Grunewalb!! Tegler heibe Kth. Na. Perwenig H. S.! B. Jungsernheibe!! westlich von Wilmersborf Bl. Hasenbeberg Gae.

## 197. Helichrysum Gaertn.

410. H. arenarium (L.) D. C. Sonnige Bügel, trodne Balber, Grasplate, gemein.

## 198. Artemísia L.

† A. Absinthium L. Stammt aus Sübbeutschlanb; hier und ba gepflanzt und an Zäunen, Dorfstraßen, verwilbert. P. Berliner Borstadt Bs. Schlachtensee beim Fischerhause!! Sp.; Tegel D. Dr. Hohenbruch Bl. Ra. Bredower Forsthaus!! Königshorst H.S. Kremmen: Rhinluch H. Lw.!! Trebbin: Lübersdorf; Gabsdorf Gr. B. An ber Landsberger Chaussee!! Beißensee D. Gesundbrunnen!!

Schmargenborf Schp.! Steglitz Bl. Wilmersborf D. Schöneberg in ber Nähe bes Matthäi-Kirchhofes!! und nach Tempelhof hin Bl. K. Friedrichshagen H. Rübersborf; Tasborf D. Zoffen: Diesseit bes Forsthauses Bl. Kummersborf!! Sperenberg!! Rst. Zainhammer Bch. Chorin A. Br.

\* A. Abrotanum L. In Gild-Europa einheimifch. Buwei-

len in Garten gepflangt.

411. A. campestris L. Balbränder, sonnige Sügel, häufig. 412. A. vulgaris L. Gebüsche, an Wegrändern, nicht selten. \* A. Dracunculus L. Stammt aus Sibirien. In Gärten

\* A. Dracunculus L. Stammt aus Sibirien. In Garten nicht felten gebaut.

## 199. Achilléa L.

413. A. Ptarmica L. Gräben, feuchte Gebüsche, nicht felten, 3. B. P. Tornow; Ablage; Nuthewiesen Bs. Sp. Kichelsberg; Tegel Kth. Ra. Lindholz an der Sübseite; Holzhorft H.S. Lw. Schöneweide!! Trebbin: Neuendors!! B. Wiesen diesseit Borhagen; Rummelsburg; Huchsberge J. Kolonie Hohen-Schönhausen!! Jungssernheide Kth. diesseit Moadit!! Wiesengräben nörblich vom zoologischen Garten!! nörblich vom Schöneberg an der Eisenbahn!! Kanal vor dem Anhaltischen Thore W. M. Rudower Wiesen!! Treptow!!

414. A. Millefolium L. Baldboden, Silgel, Begrander,

trodne Wiefen, gemein.

b) lanata Koch. Connige Bugel. Bisber nur B. Comargenborf im Boblwege Hl.!! A. Rubersborfer Kalfberge Schl.!

c) setacea W. K. (als Art). Wie vorige. B. Baumgar-

tenbrud Sanio!

# 200. Anthemis L.

415. A. tinctoria L. Wegränder, sonnige Higel, sehr zerstreut, im östlichen Gebiet häusiger. Br. Auf dem Butenberge bei Gr. Kreutz Schr. Na. Zwischen Selbelang und Möthlow Gr. K. Rübersdorfer Kalkberge!! Br. Batlower Mühle Rn. beim Landhof Sch.! Fw. Weinberg Rn. diesseit Falkenberg!! Rst. häusig Bch. z. B. an der Chausse nach Sommerfelbe!!

416. A. arvensis L. Meder, mit Cand- und Lehmboben,

häufig.
417. A. Cótula L. Zünne, Dorsstraßen, zerstreut. P. Borsim Schp.! Stansdorf bei Teltow W. M.! Sp. D. Nieder-Renensborf; Heiligense Kth. Or. Gae. Na. Halkenhagen D. Brieselang!! Bredower Forsthaus!! Zeestow!! Königsbors H.S. B. Biesborf Garcke; Friedrichsselbe; Weißensee D. Schöneberg!! K. Rüsbersdorfer Kaltberge Bl. Alt-Landsberg!! Seeberg!! Rst. Bch.

 $415 \times 417$ . A. tinctoria  $\times$  Cótula. R. Milbersborfer Ralfberge 1840~Bl.!

# + Órmenis Cass.

† O. mixta (L.) D. C. In Süb-Europa einheimisch. B. Zeh- lenborf unter Serradella 1858!!

#### 201. Matricaria L.

418. M. Chamomilla L. Aeder, Begränder, nicht selten. † M. discoidea D. C. Stammt aus Oft-Asien. B. In ber Dorsstraße von Alt - Schöneberg sehr zahlreich!! 1852 von A. Br. entbedt. Ohne Zweisel aus bem Königlichen botanischen Garten Bermilbert.

## 202. Chrysanthemum L.

419. D. Leucanthemum L. Biefen, fonnige Bebuiche,

häufig.

420. C. Tanacetum Karsch. Wegränder, sonnige Laubwälsber, Higel, Triften, zerstreut. P. Bornstedt Bs. Sp. Bamberge; Tegel D. Or. Kr. Na. Walb beim Bredower Forsthause!! Königsbort im Brunnengarten H. S.! Lw. Beim siblichen Kirchhof Rt. Trebbin: Neuendors!! B. Friedrichsselber Park!! Friedrichshain A. Trebbin: Neuendors!! B. Friedrichsselber Park!! Friedrichshain K. Trebbin: Oppandauer Berg Bl. Schmargendors W. M. nordwestlich vom botanischen Garten in Gebüschen W. M.!! an der Chausseichneit Treptow!! Neuer Krug Rei. Alt-Landsberg Gae. Fw.!! Rt. An den Chaussein nach Chorin und Sommerselde Bch.

b) crispum D. C. Buweilen auf Rirchbofen gepflanzt.

\* C. majus (Desf.) Aschs. Stammt aus Sub-Europa; hier und ba in Garten.

† C. Parthenium (L.) Pers. Stammt aus Sib-Europa; früher häufig in Gärten gebaut und in Folge bessen an Zäunen, in Dorsstraßen zuweilen verwilbert, boch meist unbeständig. P. Bei ber Bilbergallerie Schp. Pirschheibe Schp.! Sp.; Tegel D. Dr. Kr. Kremmen: Rhinluch H. B. Zuweilen in Gärten ber Stadt als Untraut!! Malchow!! Rst. Unter bem Drachentopf Beh.!

421. C. inodorum L. Begränder, Aeder, gerftreut. B. Bornfiebt Schp. Sp. !! Tegel D. B. Stralau Kth. Beißenfee D. Wilmersborf Kth. vor bem Anhaltischen Thor am Kanal W. M. K.

Mübersborf Kth. Alt-Lanbsberg Gae.

† C. segetum L. Im Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur öfter mit frember Saat eingeschleppt und auf Aedern, an Baunen zuweilen gahlreich, boch ftets unbeständig gefunden; in neuerer Zeit

B. Berliner Borftabt 1853 Bs. Behlenborf unter Gerrabella 1858!! B. 3mijden Schoneberg und Steglit unter Gerrabella 1857 Garcke.

## + Dorónicum L.

† D. Pardalianches L. Stammt aus Gib- und Beft-beutschland; im Gebiet früher als Zierpflanze; jett hier und ba ver--wilbert. B. Sansfouci Bs.! B. Charlottenburger Schlofigarten Bl.!! Thiergarten bei Schloß Bellevue!! (icon 1846 von mir bemerft). Buctow: Am Eingang ber Gilberteble!!

\* D. cordatum (Wulfen) Schultz bip. Baufige Bierpflange

aus Gibbeutichlanb.

## 203. Árnica L.

422. A. montana L. Baldwiesen, febr gerftreut. Dr. 3mischen Zehlendorf und Stolzenhagen Iin. ! Fallenthal bei Liebenwalbe Kr. Grieben bei Lindow J. Müller. Kremmen Gr.

## 204. Senécio L.

423. S. paluster (L.) D. C. Torfmoore, an Geen, Bfühlen, zerstreut. B. Ruthewiesen; Baumgartenbriid Bs. Satrow Becken; am Bannsee; Rl. Machenow Bl. Sp. Rhinmeister - See!! an ber Savel bei Bichelsberg!! am Tegeler Gee Bl. Dr. Gae. Ra. Torfftich nördlich vom Lindholz H. S.!! Kremmen bei Tiegow einzeln!! Rhinluch baufig H.! Em Tiefes Bebege Rt. Trebbin: Rlieftower See; Glau Gr.! B. Beigenfee an ber Drante!! Jungfernheibe am Ranal bieffeit bes Blopenfees!! Schoneberger Fenn Bl. Tempelhof D. amifden Bufdfrug und Forfthaus Ober-Rigborf W. M. Johannisthal Thiele! A. Zwijden ben Sinteren Bergen und Tasborf!! Alt-Lanbsberg Gae. Stortow: Scaby-Luch H. Buctow: Gichenborfer Mible Sch.! Frw. Papiermuble Rn. Mft. Großer Gee Beh. Begermuble; Bechteich Kirchner.

424. S vulgaris L. Aecter, Gartenland, gemein. 425. S. viscosus L. Walbichläge, Sandfelber, Schutt, an Bäumen, zerstreut. Br. Lehnin Schr. P. Baumgartenbrild; Potsbamer heibe Bs. östlich vom Wannsee Schp.! Sp. Auf Torf am Rhinmeifter- Gee!! Bichelswerber!! Bichelsberg!! Tegel D. Stadtförfter Gr.! B. An ber Chauffee jenfeit Rummelsburg !! Bitleben beim Forfterhaufe W. M.! Tempelhof D. R. Rübersborfer Ralfberge Thiele! Alt-Landsberg Gae. Boffen: Sperenberg filbl. vom Dorfe!! Fm.!! Rft. Monchsberg; nach Brit bin Beh. Betelberg Bl.

426. S. silvations L. Trodne Balber, Torferbe, gerftreut. B. Jägerichiefftanbe Bs. Gp. Grunewalb beim Rhinmeifter-See auf Torferbe!! Pichelsberg!! Pichelswerber!! Papenberge; Tegel D. Na. Bredower Forst!! Kremmen: Linum H.1 - Lw. Zwischen bem Theerofen und Gottow!! B. Jungfernheibe biesseit bes Plötzenses!! Hafenheibe W. M.11 K. Woltersborf beim Forsthause!! Storkow: Friebersborf H. Aft. In der Forst zwischen der Oberberger und Choriner Chaussee!

† S. vernalis W. K. Im Gebiet noch nicht eingebürgert; an ber östlichen Grenze bisher nur einzeln erschienen; bürste sich aber allmählig einheimisch machen. Br. Berge 1854 Sch.! Möglin an ber Büchnic 1858 Rn.!

427. S. erucaefolius L. Lichte Laubwälber, trodne Wiesen, zwischen Gesträuch, sehr zerstreut; bisher nur im westlichen Gebiet. Br. Pewesiner Nachthütung Sp.! Na. Bredower Forst Rn. Lindholz in der Ede nach Paulinenau!!

428. S. Jacobaea L. Sonnige Bugel, trodne Balber, fel-

tener auf trodnen Biefen, baufig.

b) flosculosus Jordan. (als Art). P. Templin Winkler! 429. S. aquáticus Huds. Auf nicht zu sumpfigen Wiesen, besonders im westlichen Gebiet, nicht selten. Br. Wiesen südwestlich von Weseram!! P. Beim Neuen Palais Weiland! Na. Wiesen nördlich vom Bredower Forsthause!! B. Beim Lichtenberger Kiety!! Wiesen zwischen der Jungfernheide und Charlottethurg Schp.! Lietzow W. M.! bei der Moaditer Brilde!! am Schisstanal bei der unteren Schleuse W. M.! Wiesen an der Potsdamer Eisenbahn diesseit Schöneberg viel!! jenseit Rirdors!! Treptow v. Chamisso jun.!

† S. sarracenicus L. Im Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur an Zäunen, Ufern, verwilbert. B. Destliches Ufer ber Pfauen-Insell! B. an einem Zaune in ber Lietower-Wegstraße westlich ber Botsbamerstraße W. M.!! an ber Brüdenallee!! feit 1855 burch ben

Umbau bes Dammes verschüttet.

430. S. paludosus L. Sumpfige Wiesen, nur A, zerstreut. P. An ber Nuthe Bs. Wiesen nördlich von Geltow Schp.! Sp.; Vichelswerder D. Pichelsberg Bl. bei den Papenbergen Baeyer! Tegel D. Or.; Germendorf Kr. Na. Nördlich vom Bredower Forsbause!! Lindholz an der Eisendahn!! Königshorst H. S.!! Kremmen: Linum H. B. Jungsernheide an der faulen Spree W. M. Charlottenburg nach dem Schligenhause hin Caspary; Wiesen slides vom Kottbusser Thor!! am nördlichen Kande der Rudower Wiesen!! K. Nach Glienicke hin Gr.! Mittenwalde: Rektorwiese H. S. II.!! Fw. Badestelle!! Nft. Am Finowkanal Bch.

#### + Caléndula L.

† C. officinalis L. Befannte Zierpflanze aus Gub-Europa; an Baunen, Begen, zuweilen verwilbert.

## † Echinops L.

† E. sphaerocéphalus L. Zierpstanze aus Sübbeutschstand; hier und da verwildert. P. Pfauen "Instell Schp.! Bs.! B. Beim Kirchhof zu Tempelhof!! (nach D. seit 1820). Wr. Möglin Beh. ob noch jett?

#### 205. Círsium Tourn.

431. C. lancoolatum (L.) Scop. Begränder, Triften, an Zäunen, gemein.

432. C. palustre (L.) Scop. Feuchte Biefen, häufig.

433. C. acaule (L.) All. Trocine Wiesen, hügel, zerstreut. B. hinter bem Neuen Palais Weiland! und von dort bis Kuhsort Bs. an der Chaussee westlich vom Bannsee Schp. Sp. Tegel D. Dr. Wiesen bei Germendorf Gae. Ra. Wiesen bei der Bredower Meierei!! beim Beinderg!! bei Paulinenau!! Kremmen: Rhinluch H.! B. Friedrichsselbe; Weißensee; Reinickendorf; Jungfernheide D. stiblich vom zoologischen Garten Bl. Schöneberg D. zwischen Rigdorf und Forsthaus Ober-Nixdorf!! Andower Wiesen!! K. Rübersdorfer Kaltberge!! Alt-Landsberg Gae. Zossen: Sperenberger Gipsberge!! Fw. Alaunwert Rn. Nft. Karlswert Bch.

434. C. oleraceum (L.) Scop. Wiesen, zerstreut; stellenweise hänsig. P. Tornow Bs. Teltow Bl. Sp. Tegel D. Dr. Germenborf; Schmachtenhagen Gae. Na. Haltenhagen D, Wiesen bei bei ber der Kronprinzenbamm zwischen Dreibrücken und Seelenhorst und Grenzbamm bei Mangelshorst H. S. Kremmen: An ben Kanälen bei Linum H.! Lw. Lindhorst!! tieses Gehege Rt. B. Friesbrichsfelber Park!! Französisch-Buchholz an ber Panke!! zwischen bem zoologischen Garten und Wilmersborf W. M.! Wiesen an ber Potsbamer Eisenbahn biesseit Schöneberg Hl.! Audower Wiesen!! Rabbenstein-Mühle; Dahlewith H. Tasborf Thiele! Att-Landsberg!! Werneuchen Bl. Wr. An der Blichnitz bei Möglin Rn. Frw. Brunsnenthal!! Hammerthal Rn. Ms. bäusig, 3. B. Tornow!! Roadier

435. C. arvense (L.) Scop. Aeder, besonders auf Lehmbo-ben, häufig.

Düble !!

## † Sílybum Vaillant.

† S. Marianum (L.) Gaertn. Bierpflanze aus Gub-Europa;

hier und da in Gärten; an Zäunen, auf Schutt zuweilen verwisbert; oft unbeständig. Br. Weseram; Bewesin Schr. P. Neuendorf Bs. Werber!! Dr. Germendorf Gae. Zerpenschleuse Jahn. Na. Mangels-horst H. S.! Beelig: Wittbriegen Rn. B. Wilmersdorf R. fil.! Schöneberg beim Institutsgarten!! Tempelhof D. Nixdors!! Fw. Amalienhof Rn. Nft. Bch.

#### 206. Cárduus L.

436. C. crispus L. Heden, Zänne, Gebliche, zerstreut. P. Bornstebt Schp.! Sp. An ber Chausse nach Aubleben!! Ra. An ber Straße nach Gr. Bähnig!! Lw. Frankenselbe Rt. Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. An ber Spree bei Bellevue!! am süblichen Ausgange von Wilmersbors!! am Schöneberger Busch Bl. Alt-Landsberg Gae. Wr. Wöglin Rn. Fw. Kiet; Hammerthal; Alaumwerk Rn. Falkenberg Bch.

437. C. nutans L. Wegrander, Triften, Sügel, häufig.

## 207. Onopordon Vaillant.

438. O. Acanthium L. Baune, Dorfftragen, Triften, nicht felten.

## 208. Lappa Tourn.

439. L. officinalis All. Dorfftragen, Begränder, febr gerstreut. Br. Saringen; Beseram Schr.! B. Bornstebt Schp.! Or.
Beim Armenhause; Schmachtenhagen Gae. B. Tempelhof bei ber
Schäserei Bauer! zwischen bem Buschfruge und Ober-Rirbors W. M.!!

440. L. macrosperma Wallr. Schattige Laubwälber, fehr zerstreut. Ra. Bredower Forft Körnicke!! besonders im abgetrennten westlichen Theil!! Lindholz im öfllichen Theil!! Fajanerie bei Königshorst H. S. !!

441. L. glabra Lmk. (ex p.) Begrönder, Baune, gemein.

442. L. tomentosa Lmk. Wie vorige, weniger häufig. B. Bornim Bs. Sp. heiligensee; Tegel D. Na. Briefelang!! an ber Strafe nach Gr. Bähnig!! Dr. Schmachtenhagen Gae. B. Steglit D. am Schifffahrtskanal bieffeit Krug's Garten W. M. K. Tasborf D. Rft. Zainhammer; Beg nach Lichterselbe Bch. Karlswerk!!

## 209. Carlina Tourn.

443. C. vulgaris L. Sonnige Hügel, trodne Wälber, nicht selten. Br. Gr. Areut Schr. B. Pirschheibe Schp. Baumgartenbrüd; Potsbamer Heibe Bs. Sp. Grunewalb!! Lw. Rauchenberge Rt. Trebbin: Neuendorf; Siethen Gr.! B. Exercierplat vor dem Schönhauser Thor J. Eisenbahneinschnitt bei Schöneberg W. M.!!

bei Lichtenrade und Glasow; Spreeheibe Bl. A. Erfner!! fubl. vom Alten Grund!! Kaltberge!! Rift. Nach Trampe bin Beh. Hefelberg Bl.

#### 210. Serratula L.

444. S. tinctória L. Trockne Wiesen, sichte Laubwälder, zersftreut. Br. "Weseram!! Bewesin!! B. Beim Neuen Palais W. M.! Ruhsort; Tornow; Templin Bs. Sp. Wiesen nach den Papenbergen hin Bl. Deiligensee; Tegel D. Dr. Gae. Na. Haltenhagen D. in und an der Bredower Forst!! Lindholz!! Königshorst H. S. T. Zwissen Kemnitz und Zülichendorst Rt. Trebbin: Schulzendors!! Biesen zwischen der Stadtmauer und Boxbagen!! Friedrichsselbe D. nörblich von Reinidendors!! Schöneberg D. Rudower Wiesen!! Br. Methoders Berge; an der Büchnitz Walter! Mst. Britzer Torsstich Beh.

#### 211. Jurínea Cass.

445. J. monoclona (L.) Aschs. Dürre Sanbhügel, sehr selten. Na. Beim jubischen Begräbnifplat und auf einem Hügel nordwestlich besselben!! zuerst vom verstorbenen Apotheter Hubner entbedt.

## 212. Centauréa L.

446. C. Jaces L. Sonnige Gebifche, trodne Biefen, Beg-ranber, baufig.

447. C. Cyanus L. Meder, gemein.

448. C. Scabiosa L. Sonnige Sigel, trodne Balber, Beg-

ränder, nicht felten, befonders D.

449. C. panniculata Jacq. Wie vorige, zerstreut. P. Bornstebt Bs. Baumgartenbrüd!! Glindower See!! Brauhausberg Schp.! Or. Gae. Na. An den Straßen nach Bredow!! und Markee!! Jahnsberge!! Dw. Bei der Prätoriussichen Fabrik!! Trebbin: Lübersdorf Gr. B. Beißensee D. Chaussee auf dem Spandauer Berge!! Witsleben W. M. Schungee auf dem Spandauer Berge!! Witsleben W. M. Schungendorf am Hohlwege!! süblich von Schüneberg Bl. Chaussee zwischen Steglitz und Zehlendorf!! an der Anhaltischen Eisendahn nach Tempelhof hin!! Mariendorf am Wege nach Lankwitz; Marienselde D. K. Nübersdorfer Kalkberge!! Alt-Landsberg Gae. Zossen: Sperenberger Gipsberge!! Br. An der Büchnitz bei Möglin; am Upftall bei Schulzendorf Ru. Fw. Schlosberg!! Rft. sehr häusig, 3. B. an der Chaussee nach dem Bahnhof!! zwischen Hohen-Kinow und Köthen!!

† C. solstitialis L. Auf Luzerne-Aeckern zuweisen in Menge eingeschleppt, doch stets unbeständig. B. Uet 1834 ihaeder nach Schp. B. Bei Beißensee 1853 Sickenberger; Tempelhof 1844 Rn.!

bis 1846 Baetke! K. Rilbersdorfer Kalfberge 1854 einzeln!! Bernau: Börnicke 1858 Rn. Werneuchen 1841 Gae.! Br. Batzlow 1858 Rn.! Rft. Beim Eichwerber 1857 Beh.!

## 213. Lampsana Tourn.

450. L. communis L. Schattige Balber, an Zäunen, Betten, häufig.

#### 214. Arnóseris Gaertn.

451. A. minima (L.) E. Mey. Sandige, und sandigesehmige Aecker, zerstreut, meist mit Hypochoeris glabra L. B. Marquard Schp.! Zehlendors!! Sp. Ruhleben D. Pichelsberg Kth. zwischen Geiligensee und Tegel Bl. Dr. Gae. Ra. Zwischen der Hattestelle und dem Finkenkrug W. M.! Beelit: Elsholz Bs.! Ew. Bei den Ziegeleien Rt.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Friedrichsselbe D. Biegeleien Hohen-Schönhausen!! zwischen Charlottenburg und dem Spandauer Berg Winkler; Schmargendors!! Schöneberg Thiele! jenseit Lichterselde Schp.! siiblich von Tempelhof D. Alt-Landsberg Gae. Bossen: Zwischen Sperenberg und Kummersdorf!! Rst. Beim Rohrspsuhl zwischen dem Eichwerder und Sommerfelde Bch.

#### 215. Cichórium Tourn.

452. C. Intubus L. Wegranber, Bugel, befonbers auf Lehm-boben in D, nicht felten.

#### 216. Thrincia Rth.

453. T. hirta Reh. Triften, trockne Biesen, nur A, besonders auf Salzboben, im westlichen Gebiet nicht selten, im übrigen sehlend. Br. Lünow; südwestlich von Weseram Schr. Pewesin Sp. B. Sanssouci Schp.! Baumgartenbrild am Fuße des heineberges!! Psauen-Insel!! am Baumsee R. Na. Beim Bredower Forsthause!! zwischen der Bredower Forst und der Meierei sehr viel!! beim Selbelanger Jägerhause!! Paulinenau!! Mangelshorst H. S. Kremmen: Rhinluch H.! Trebbin: Schulzendors!! B. Biesen im Friedrichsselder Part!! Zuweisen auf Grasplätzen ausgesäet, so P. Lustgarten; Wishelmsplatzeh. B. Lustgarten!! Charlottenburg vor dem Schlosse!! am Schiffsahrtstanal vor dem Anhaltischen Thor!!

#### 217. Leóntodon L.

454. L. auctumnalis L. Trodne Balber, Sügel, häufig. 455. L. hastilis L. erweitert.

a) hispidus L. (als Art). Trodne Graspläte, Balber, Begrünber, nicht felten, 3. B. P. Sansjouci Schp.! Sp. Bichels-

berg Kth. Grunewald; Tegel D. Or. Kr. Ra. Zwischen Königshorst und Sandhorst am grünen Damm H. S.! Kremmen: Rhinluch H.! B. Friedrichshain!! an der Prenzlauer Chausse!! Jungsernheide; Wilmersdorf D. silblich von Schöneberg Bl. Kreuzberg
W. M. Tempelhof; Hasenheide; Iohannisthal D. K. Rilbersdorfer Kaltberge!! Stortow: Friedersdorf H. Mst. Beh.

b) hastilis L. (ale Art). Wie vorige, viel feltener. B. Friedrichsfelbe Schl.! Friedrichshain J.!! Lantwit Thiele! R. Ru-

bereborf D.

#### 218. Picris L.

456. P. hieracioides L. Lichte Gebüsche, sehr zerstreut. Na. Beim Bredower Forsthause 1854!! Lindholz im westlichen Theile!! Trebbin: Schulzendorf südwestlich vom Dorfe Gr.!! B. Hafenheibe 1857 Tietz! K. Rübersborfer Kaltberge Bl. Rft. Karlswert bei ber Sägemühle Rn.

#### + Helminthia Juss.

† H. echioides (L.) Gaertn. Stammt aus Sub-Europa. Rur felten eingeschleppt und unbeständig. Ra. An Zäunen Gr.! Berneuchen unter Luzerne 1841 Gae.!

## 219. Tragopógon L.

457. T. major Jacq. Higel, Begränder, besonders auf Lehmboben in D, zerstreut. P. Kl. Glienicke Bs. Sp. D. Tegel am See Bl. Na. Gr. B. Friedrichshain und an der Landsberger Chause ise J.!! Beißensee Kr. an der Chausse zwischen Charlottenburg und dem Spandauer Berg; beim Park Birkenwälden Bl. Schöneberg am Bege nach Tempelhos!! und im Einschnitt der Potsbamer Eisenbahn W. M. Kreuzberg in der Lehmgrube bei der Hopfschen Brauerei!! Hasenbeide Kth. Chausse zwischen Rixdorf und dem Buschrug!! Neuer Krug Bl. K. Rikdersdorfer Kalkberge Gr. Zossen: Sperenberger Gipsberge!! Bucow: Am See Walter. Br. Am Stechhof; Holdinder Beh.

458. T. pratensis L. Biefen, Begrander, häufig.

b) orientalis L. (als Art). Wie bie hauptart, nicht haus fig. P. An ber Chaussee bei Reu-Geltow!! Ra. Jahnberge!! B. Beifensee W. M.!

#### 220. Scorzonéra L.

459. S. humilis L. Riefernwälber, trodne Biefen, gerftreut. Sp. Bapenberge D. Liebenwalbe Jahn! Lw. Zinnaer Forft am Kußsteig nach Felgentren Rt.! B. Jungfernheibe süblich vom Kanal, westlich vom Plögensee!! Hohlweg viesseit bes Spanbauer Bocks Bl. Rubower Wiesen!! Peibeland westlich der Chaussee zwischen Treptow und bem Neuen Krug!! K. Forst östlich von Friedrichsbagen!! Boltersborser Schleuse!! Alt-Landsberg Gae. Rft. Im Walbe nach Sommerfelbe hin Bech.!! beim Gesundbrunnen!! Biesenthal an der Eisenbahn am Eingange des Baldes nach Rft. hin Bech.

\* S. hispanica L. Stammt aus Mittelbeutschlanb; bei B.

bier und ba gebaut.

460. S. purpuren L. Sonnige Higel, trodne Balber, meist auf Sanbboben, zerstreut. Br. Eiskutenberg bei Gr. Kreut Schr.! P. Ruinenberg Bl. Mibsenberg Bs. Baumgartenbrück auf bem Heineberg! Sp. Nach Kalkenhagen hin Bl. Bamberge; Tegel D. Ra. Grünefeld Schl.! langer Berg bei Gr. Bähnit Gr.! B. Jungfernbeibe östlich vom Plötzensee!! und an der faulen Spree auf den weishen Bergen W. M.!! Rft. Beim Kirchhof; Balb nach Sommerfelde hin Bch.

## † Podospermum D. C.

† P. laciniatum (L.) D. C. Un Aderranbern. Sp. Schur 1833! von Dr. Philippi entbedt, fpater nicht wieder gefunden; ichmersich einheimisch.

## 221. Hypochoeris L.

461. H. glabra L. Sandige und sandig-lehmige Aeder, nicht selten, z. B. P. Zehlendors!! Sp. Zwischen Heiligensee und Tegel Bl. Dallborf Schl.! Lw. Brand bei Frankensörick Kt. B. Lichtenberger Kiety!! Kolonie Hohen-Schöndusen!! Französisch-Buchhofz!! Gesundbrunnen A. Br.! süblich an der Jungsernheide!! Schwargendors!! jenseit Lichterselbe Schp. Tempelhof Kth. R. Woltersbors!! Zossen: Rummersbors!! Sperenberg!! Rft. Am Wege nach Brit Bch.

462. H. radicata L. Trodne Wälber, Hügel, Wegränder, bäusig.

## 222. Achyróphorus Scop.

463. A. maculatus (L.) Scop. Trodne Wiesen, Laubwälsber, sehr zerstreut. Br. Eiskutenberg bei Gr. Kreutz; Trebelberg bei Schnergow sparsam Schr. Or. Liebenwalde; Zerpenschleuse Kr. Na. Wald westlich vom Sandkrug!! Jahnberge Re.!! B. Rudower Wiesen Jahn!! Alt-Landsberg Gae.

## 223. Taráxacum Haller.

464. T. vulgare (Lmk.) Schrk. Biefen, Begränder, Graspläge, febr gemein. b) laevigatum Willd. (ale Art). 2w. Lindenberg Th.

c) paludosum Scop. (als Art). Kurz begrafte Stellen, jaure Wiesen, nur A, sehr zerstreut. B. Weseram im Langmathensbruch; Bewesin im löt Schr.! Na. Westich von Brieselang!! Eisstellers und Bacosentoppel bei Königshorst H. S.! B. Buschtrug C. Bouché sen.!

## 224. Chondrilla Tourn.

465. C. juncea L. Hügel, Begränder, Sanbselber, nicht sein, 3. B. P. Baumgartenbrück; hinter bem Kirchhof Bs. Schlachstense beim Fischerhause!! Sp. Pickelsberg D. Vapenberge Thiele! Ra. Beinberg H. S.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Kriedrichsselbe D. vor bem Landsberger Thor hinter ben Kirchhösen J. Bedbing D. Scharsottenburg!! Bigleben Bl. Bilmersdorf D. Schöneberg im Eisenbahneinschnitt W. M. Kreuzberg in den Lehmgruben!! Altslandsberg Gae. Fr.!! Rft. Am Bege nach bem Bahnhof Beh.

b) acanthophylla Borkhausen. Rach D. bei B. und B.

#### 225. Lactúca L.

\* L. sativa L. Baterland unbefannt; baufig gebaut und bier

und ba einzeln verwilbert.

466. L. Scariola L. An Wegen, hügeln, Mauern, zerstreut. B. Am Bannsee diesseit der Friedrich Wilhelmsbrücke Schp.! Ra. An der Straße nach Neukammer C. Schultze; Selbelanger Brücke; am Lindholz H. Trebbin: In Schulzendorf Gr.!! B. Weißensee!! Am Kanal in der Nähe der Potsdamer Eisenschn auf dem süblichen liget!! innerhalb der Stadtmauer öflich vom Köpnicker Thor!! Tempeshof am Kirchhof Bl. K. Kildersdorfer Kalkberge Schl. Alt kandsberg Gae. Fw. Utazienberg!! Rst. Brunnen; bei der Schleuse; Bleichberg Bch. Karlswerk H.

b) augustana All. (als Art). Gelten. B. Beißenfee

Jahn!

467. L. muralis (L.) Less. Schattige Balber, Gebiliche, nicht selten, z. B. Sp. Tegel Keh. Na. Gr. Bahnig!! Ew. Elsthal Re.! B. Jungfernheibe Keh. Thiergarten!! Bilmersborf Keh.

## † Mulgédium Cass.

† M. macrophyllum (Willd.) D. C. Zierpflauze aus Nordsamerika. Berwilbert B. Charlottenburger Schlöfigarten!! Roch nicht blühenb gefunden.

#### 226. Sonchus L.

468. S. oleraceus L. Meder, Garten, Baune, gemein.

469. S. asper Vill. - Wie vorige, weniger häufig. Ra. Königshorst H. S. B. Wiesenränber vor bem Franksurter Thor J.! Seegerscher Holzplat Bl. am Kursurstenbamm W. M.! am Köpnider Weg, Treptow gegenüber!!

470. S. arvensis L. Biefen, feuchte Meder, häufig.

b) laevipes Koch. Weniger häufig als die Art. Br. Bewesin am lögkanal Schr. Na. Zwischen bem Bredower Forsthause und ber Meierei!! B. Wiesen biesseit Borhagen J.! am Köpnicker Beg, Treptow gegenüber!!

## 227. Crepis L.

471. C. praemorsa (L.) Tausch. Higel, trocine Laubwälsber, selten. Ra. Bredower Forst westlich vom Forsthause R.! in neuerer Zeit nicht wieder gesunden. K. Rübersborfer Kaltberge Gae.

Mft. Rarlewert Beh.!

472. C. biennis L. Wegränder, Higel, besonders auf Lehm in D, sehr zerstreut. Br. Trift bei Pewesin!! Dr. Kr. Ra. Am Wege nach Gr. Bähnit!! Lw. An der Authe Rt.! B. Süblich von Pantow Garcke; ob noch jett? Charlottenburg gegenilber dem Schloßgarten an der Spree!! Alt-Landsberg Gae. Br. Möglin an der Bichnity Sch.! Rft. An der Chausse zwischen Sommerfelde und Tornow Bch.!

† C. nicaeensis Balb. Grasplate, fehr felten und nicht beftanbig. B. Charlottenburg in ber Schlofftrage zwischen Arrhenaterum elatius M. u. K., jebenfalls mit frangösischem Samen einge-

ichleppt 1857 A. Br.!!

473. C. virens Vill. Graspläte, Gebüsche, nicht selten. 474. C. tectorum L. Aeder, Wegränder, Higel, gemein.

475. C. paludosa (L.) Moch. Keuchte Biesen, Gebüsche,

475. C. paludosa (L.) Mnoh. Feuchte Wiesen, Gebüsche, zerstreut. Br. Göt; Vewest Schr. A. Authewiesen Bs. Sp. Tegel auf Wiesen siblich vom Fließ! Na. Faltenhagen Schl. Al. Böhnitz! Kremmen: Rhinluch H. Lw. Elsthal!! Frankensorde Rt.! B. Wiesen zwischen ber Stadtmauer und Borhagen J.! Wiesen nörblich vom Lichtenberger Kietz J. Jungfernheide D. Schöneberger Busch auf der Westsielte Bl. Wiesen beim Buschrug!! A. Glienick Gr.! Allt-Landsberg Gae. Br. Möglin an der Büchnitz; Batlower Wiese Kn. Fw. Papiermühle Rn.! Köthen!! Rft. z. B. beim Zainhammer W. M.

## 228. Hierácium Tourn.

476. H. Pilosella L. Sonnige hügel, trodne Balber gemein. 477. H. Aurscula L. Wiesen, Sumpfränder, zerstreut. Br. Gr. Kreut Schr B. Sanssouci biesseit bes Reuen Palais Schp.! Sp. Grunewald bei ber Hundekehle!! Tegel Kth. Ra. Gr. faule Lake beim Finkenkrug W.M.! Lindholz!! Al. Bähnit Schr. Kremmen: Rhintuch H.! Lw. Bei ben Frankenförber Bildengärten und im Brand Rt.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Beim Lichtenberger Kietz Bl. Gesundbrunnen Sanio! Wittelben!! nordöstlich von Wilsmersborf W.M.! diesseiselt Lichterselbe W.M.! an der Spreeheibe W.M.! K. Rüdersdorf Kth. Stortow: Scaby-Luch H.

478. H. praealtum Vill. Biefen, Begrander, sonnige Bilgel, fehr zerstreut. Ra. Rhinluch H. Trebbin: Gublich von Schul-

Bendorf Gr.!! R. Ribersborfer Kaltberge am Gipsbruch Rn.

b) hirsutum Koch. A. Rübersdorfer Kaltberge Bauer!
479. H. echioides Lumnitzer. Sonnige Higel, jehr zersstreut. Br. Springberg bei Deeth Schr.! Na. Jahnberge Hertzsch!!
A. Rübersdorfer Kaltberge Draeger! Bucow: Prithagen Walter.
Fw. Weinberg!! Rst. Nieder-Finow Beh.

480. H. cymosum L. Connige Bugel, felten. Fm. Wein-

berg Sch.! Maunwert; Rothen Rn.

481. H. collinum Gochnat. Trodne Wiesen, Walbränder, zerstreut. Br. Gr. Kreut unter bem Eiskutenberge Schr. Or. Nach Wensstendorf hin; Kreuzbruch Kn.! Na. Brieselang Bl. Bredower Forst westlich vom Forsthause!! grüner Damm zwischen Königshorst und Sandhorst H.S.! Kremmen: Rhinluch H. Trebbin: Schulzerbors Gr.! B. Steglit Thiele! A. Beim Kietz Gr. Alt-Landsberg Gae. Fw. R. Nst. Britzer Torssich; Finowthal; beim alten Wasserstall Bch.

482. H. murorum L. Balber, nicht felten.

483. H. vulgatum Fr. Bälber, weniger häufig. \$\psi\$. Canssouri Schp.! Sp. Grunewald; Bichelswerber; Papenberge D. Schulzgendorf Rei.! Or. Gae. B. Buhlheibe J.! Jungfernheibe D. Thiergarten Bl. K. Kallberge D. Rft. Jenfeit b. Leuenberger Wiesen Bch.

b) ramosum W. K. (als Art). B. Spreeheide!!

484. H. boreale Fr. Wälber, Gebüsche, zerstreut. P. Ruisnenberg an der Mauer von Sanssouci Bs. Sp. Grunewald; Papenberge; Tegel D. Dr. Germendors Gae. Kremmen: Rüthnich Rt.! Na. Wald bei der Haltestelle Finkentrug!! Lindholz H.S.! Lw. Am Wege nach Gottow!! Trebbin: Lenzburg Gr.! B. Friedrichsselne!! Beisensee D. Jungsernheibe Rei. Wilmersdorf D. Thiergarten!! Ober-Rigbors W. M.! K. Rübersdorfer Kalkberge D. Alt-Landsberg Gae. Fw. Sch.! Mft. Schanzenberg; Schützenhaus; Brunnen Bch.

485. H. rigidum Hartm. Bie voriges. Br. Lehnin am vorstern Kaltofen Schr.! B. Brauhausberg Bs.! Havelufer nach ber Pfauen-Insel hin!! am nörblichen Ufer bes Schlachtensees!! Sp. Papenberge Thiele! Na. Lindhold!! Trebbin: Scharfenbrüder Forft

Gr.! B. Buhlheibe an ber Eijenbahn J.! Bitgleben W. M.! Thiergarten Thiele! Fw. Grengrain bei Sonnenburg Sch.!

b) tri den tatum Fr. (als Art). Sonnige Bugel, gerftreut. Sp. Gublich vor Bichelsberg!! B. Friedrichsbain!!

486. H. um bellatum L. Wälber, Gebüsche, nicht felten, 3. B. B. Station Werber!! Haveluser nach ber Pfauen-Insel hin!! Sp.; Grunewald D. Tegel Bl. Na. Lindholz!! Jahnberge H. S.! Lw. Elsthal!! B. Friedricksselbe W. M. beim Gasthof zur weißen Taube J.! Weißensee!! Schönhauser Part!! Jwischen Pantow und Gesundbrunnen!! Jungfernheibe D. Wiesen beim Kursürstendamm!! an der Potsdamer Eisenbahn diesseit Schöneberg; an der Anhaltischen Eisenbahn im Einschnitt W. M. Rudower Wiesen!! Alt-Landsberg Gae.

b) coronopifolium Bernh. (ale Art). Selten. Br. Gr.

Rreut Schr.

476 x 481. H. Pilosella x collinum \*). Biefen, febr felten. Rur Alt-Landsberg zwijchen bem Bernauer und Strausberger Thor Gae.!

## 50. Familie. Ambrosiaceae Lk.

#### 229. Xánthium Tourn.

487. X. strumarium L. Dorfftragen, an Zäunen, zerstrent. B. Bornim Bs. Geltow Schp.! Or. Germenborf Rn.! Ra. Am süblichen Ausgang ber Stadt!! Bredow!! Lw. Rt.! Trebbin: Schulzgenborf!! Reuenborf!! B. Schöneberg!! R. Rübersborf Gae. Werns-borf Garckg. Zoffen: Kummersborf!! Sperenberg!! Fw. Alt-Kiety!!

Mit. Sansberg bei ben Scheunen Beh. Biefenthal A. Br.

488. X. italicum Moretti. Feuchte Triften, Flufinfer, felten; verschleppt an Wegrändern, Zäunen, zerstreut. B. Am Wege
nach Hoben-Schönhausen, furz hinter seiner Trennung von der Chaussee!! Acker neben dem Einschnitt der Anhaltischen Sijenbahn dem
Kreuzberg gegenüber W. M.! außerhalb des Köpnicker Thores!! am
Spreeuser oberhalb des Reuen Kruges!! Fw. Babestelle!!
Alt-Rietz Rn.! Mft. Nieder-Finow Rn. Nur an den gesperrt
gebruckten Standorten als einheimisch zu betrachten.

† X. spinosum L. In Gilb- und Oft- Europa einheimisch; im Gebiet nur zuweilen, meist mit frember Bolle eingeschleppt, an Zäunen, Begränbern, stets unbestänbig. Lw. 1855 Re.! B. An ber

Schöneberger Strafe 1857 Rei.!

<sup>\*)</sup> Rach bem Urtheil von G. Ritsehl.

### Familie Lobeliaceae Juss.

#### + Lobélia L.

† L. Erinus L. Zierpflanze vom Kap. Zuweilen auf Schutt verwilbert.

## 51. Familie. Campanulaceae Juss.

#### 230. Jasióne L.

489. J. montana L. Trodne Balber, sonnige häufig. b) litoralis Fr. Sanbhugel, selten. Bisher nur Budow: Kahler Berg O. Jaenicke!

#### 231. Phyteuma L.

490. P. orbiculare L. Trodne Biefen mit Mergelgrund, febr felten. T. Niebelhorft; Seggebuich; Kemniger Felbmart P.!

491. P. spicatum L. Schattige Laubwälber, zerstreut. Na. Brieselang!! Bredower Forst!! Lindholz!! Alt-Landsberg Gae. Fw. Brunnen Bl. Zieglerberg; Paschenberg Rn. Aft. Gesundbrunnen Bch.!! an der Schwärze vom Zainhammer bis Spechthausen Bch.

#### 232. Campánula L.

492. C. rotundifolia L. Trodne Balber, fonnige Gugel, gemein.

493. C. bononiensis L. Sonnige Hügel, Gebüsche, sehr zerstreut; auf Kirchhösen wohl nur verwilbert. B. Bornstebt in der Nähe des Amts Bs.! und Ruinenberg nach dem Bornstedter See zu Bs. an der Chausse jenseit Geltow Schp.! Dr. Kirchhof zu Marwitz Rn.! B. Kirchhof zu Rudow Schp. Buckow: Prithagen Sch.! Be. Methorfer Berge; am Upstall Rn. (Dornbuschmühle Sch.! zwischen Bevan und Schulzendorf rothbilihend Thiele!) Fw. Grenzgraben bei Sonnenburg Sch.! an der Chausse bieffeit Fallenberg Bch. Broigsdorf Rn. Nft. Karlswerf Rn.

494. C. rapunculoides L. Sonnige Higel, Laubwälber, an Zäunen, zerstreut. Br. Ketzür Gr.! Pewesin im Pfarrgarten Schr. B. Sanssouci Schl. Geltow; Baumgartenbrild Bs.! Werber Schr. B. Branbenburger Kommunitation Bl. Charlottenburger Schlofgarten!! Tempelhof!! jenseit Rixborf Kr. K. Rübersborfer Kaltberge!! Alt-Lanbsberg Gae. Bucow: Prithagen Sch.! Br. Upstall bei

Schulzenborf Rn. Fw. Zieglerberg!! Rft. Schützenhaus: Eichwerber Bch. Karlswert; Soben-Kinow H.

495. B. Trachélium L. Laubwälber, Gebiliche, zerstreut. P. Sanssouci Schp. Sp. Papenberge; Tegel D. Na. Brieselang W. M. Bredower Forst!! Lindholz Schr. Fajanerie bei Königshorst H. S. Unterholz bei Dechtow H. Lw. Oberbalb Elsthal!! zwiichen Felgentreu und Mehlsbors Rt. B. Part von Friedhesselbe!! Reiniden bors D. Thiergarten einzeln!! K. Tasbors Thiele! Alt-Landsberg Gae. Bucow: Prithagen Thiele! Br. Methorser Berge Rn. Fw. Bieglerberg R.!!

496. C. patula L. Trodne Biefen, lichte Laubwalber, nicht

selten.
497. C. Rapunculus L. Wegränder, Gebüsche, sehr zerstreut.
B. Sanssouci Schp.! Sp. Rubleben Schl. B. Beigensee im Dorie

Schp.! Fm. Grengrain bei Alt-Ranft Sch.!

498. C. persicifolia L. Trodne Bälber, zerstreut. P. Sanssouci; Brauhausberg Bs. Ravensberge W. M. Sp. Grunewald; Pichelsberg!! Pichelswerber!! Papenberge Thiele! Tegeler Heibe Schp. Na. Bredower Forst!! Lindholz H. S.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Jungsernheibe am Kanal!! Alt-Landsberg Gae. Bossen: Süblich von Sperenberg!! Fw. Schloßberg; Köthen Rn. Rft. Zwischen bem Schügenhause und dem Brunnen Bch.

† C. carpática Jacq. Zierpflanze aus Ungarn. Berwilbert B. An ber Mauer von Sanssouci nach bem Ruinenberg zu Bs.!

499. C. Cervicaria L. Trodne Biefen, febr felten. Rrem-

men: Flatowiche und Bechliniche Wiefen am Rhin H.!

500. C. glomerata L. Trockne Laubwälder, Gebilsche, sonnige Hügel, zerstreut. Br. Eistutenberg bei Gr. Areut Hechel! Tres
belberg bei Schmergow Schr.! Pewesin an Rainen nach Weseram
hin Schr.! Sp. Papenberge; Tegel D. Dr. Schmachtenhagen Gae.
Na. Beim Bredower Forsthause!! und im westlichen abgetrennten
Theile der Forst!! Stadtsorst zwischen dem Weinberg und der Apfels
horst Gr. Lindholz im westlichen Theil!! Arenmen: Rhinluch H.
Trebbin: Schulzendorf Gr. westlich von Neuendorf Gr.!! B. Tempelhos an der blanken Hölle Bl.! Rudwer Wiesen Schp.!! A. Gr.
Rilbersdorfer Kaltberge Bl. Alt-Laubsberg Gae. Zossen: Sperenberger Gipsberge!! Br. Upstall bei Schulzendorf Rn. Fw. Broigsborf Rn. Rst. Bei der Mönchsbrücke Bch. Karlswert Bch.!

501. C. sibirica L. Sonnige Hügel, zwischen Gebusch, nur am Oberthal, sehr zerstreut. B. Pfauen Injel 1854 Schp.! jebensfalls zufällig verwilbert. Wr. Batlower Mühle; Methorfer Berge; Schulzenborf am Upstall Rn. beim Lanbhof Sch.! Fw. Amalienbof Rn.! Rarlswert Bch.! Erreicht hier ihre Grenze nach Weften.

#### + Speculária Heister.

† S. Speculum (L.) D. C. fil. In Mittelbeutschland einheis misch; bei uns nur zufällig mit frember Saat eingescheppt und unsbeständig. B. Landes Baumschuse Schp. B. Charlottenburg Rn.! Brit R. Rft. Beim Kirchhof Bch.! Auch als Zierpstanze in Gärsten; zuweilen an Zäunen einzeln verwilbert.

### 52. Familie. Siphonandrae Klotzsch.

#### 233. Vaccinium L.

502. V. Myrtillus L. Auf mäßig feuchtem, ichattigem Balb-

boben, baufia.

503. V. Vitis Idaea L. Kiefernwälber, zerstreut. Sp. Grunewalb Schp. Kremmen: Gr. Ziethener Heibe H. S. Trebbin: Scharfenbrüder Forst Gr.! B. Jungfernheibe!! K. Nach Friedrichs-

hagen bin W. M. Ertner!! Rft. Oberbeibe Bch.

504. V. Oxycoccus L. Torffümpfe, zerfreut. B. Zehlenborf im frummen Henn!! Sp. Im Grunewald häufig!! Stadtheibe;
Papenberge D. Kw. Nach Kolzenburg hin H. S. II.! B. Jungfernheibe!! Bitzleben!! Tempelhof am Sumpf östlich ber Chausse nach Mariendorf!! Köpnicker Heibe D. K. Tasborf D. Mt-Landsberg Gae. Storkow: Scaby-Luch H. Nst. Am großen See Bch.!! Biejenthal: Nach Lanke hin A. Br.

#### 234. Arctostáphylus Adans.

505. A. uva ursi (L.) Spr. Moofige Kiefernwälber, sehr felten. A. Rahnsborfer Beibe v. Chamisso. Biesenthal beim Forsthause Eisenbude Kr.

#### 235. Andrómeda L.

596. A. poliifolia L. Torffilmpfe, sehr zerstreut. B. Zehelendorf im frummen Fenn!! Sp. Grunewald von der Hundekehle bis jenseit Paulsborn!! Stadtheide D. B. Tempelhof D. A. Tasborf D. Storkow: Scaby-Luch H.! Biesenthal: In einem Sumpf nörblich vom Wege nach Lanke A. Br.

# 53. Familie. Ericaceae Klotzsch. 236. Callúna Salisbury.

507. C. vulgaris (L.) Salisbury. Trodne Balber, sonnige Bilgel, gemein.

#### 237. Eríca L.

508. E. Tetralix L. An Torffünnpfen, feuchten Balbftellen, felten. Grieben bei Lindow, nahe ber nordwestlichen Grenze bes Gebiets, J. Müller. Ra. Gr. Bahnit 1815 Walter! ob noch jett? Stortow: Alte Ctansborf beim Ccaby-Luch H.

## 54. Familie. Rhodoraceae Klotzsch. 238. Ledum L.

509. L. palustre L. Torffümpfe, sehr zerstreut. Sp. Grunewald von ber Hundekehle bis gegen ben Rhinmeister-See hin!! in
einem kleinen Sumpf beim Saugarten!! Dr. Zerpenschleuse Jahn.
K. Am Teufelssee Bl. Tasborf D. Strausberg im Porstbruch Gae.!
Boffen: Rächse-Reuendorf; Kummersborf Gr. Bucow Radig. Fw.
Baa-Fenn Rn. Mft. Trehnit Beh. Biesenthal: Am Wege nach
Lanke A. Br.1

# 55. Familie. Hypopityaceae Klotzsch. 239. Pírola Tourn.

510. P. rotundifolia L. Feuchte, schattige Stellen in Laubund Kiefernwälbern, sehr zerstreut. P. Geltow Gr.! Sp. Grunewald D. Papenberge Thiele! Tegel nach Schulzenborf hin A. Br. B. An ber Chausse biesseit bes Artillerie Schießplates Schp. K. Tasborf D. Aft. Jenseit Bornemannspfuhl am Wege nach Klobbide Beh.! Biesentbas: Lante Schl.

511. P. ahlorantha Sw. Riefernwälber, fehr zerftreut. Sp. Grunewald Kih. Balb füblich von Tegel!! zwischen Tegel und bem Sanbfrug W. M.! Ra. Gr. Bähnit am Seeufer beim Sanbfrug Schr. B. Köpnider heibe D. Fw. Bei ber Teufelsbrude Rn.!! zwischen Brunow und Leuenberg Bl. Rft. Brunnen; bei ben Leuenberger Wiesen Beh. Pechteich Kr. Biesenthal: zwischen ber hellmühle

und Cante A. Br.

512. P. minor L. Schattige Laub- und Kiefernwälber, häufiger als die vorigen. P. Chaussehaus an der Beeliter Straße; Nistolstoe Bs. Sp. Zwischen der Hundekehle und dem Schloß Grune-wald Bl. zwischen Kaulsborn und dem Rhinmeister-See!! Stadtheide D. bei Tegel!! Lw. Rauchenberge an der Chausse Rt.! B. Friedrichsselde D. Jungsernheide!! Thiergarten in der Nähe des Forsthauses!! Köpnicker heide D. Alt-Landsberg Gae. Br. Methorfer Berge Thiele! Fw. Bei der Teufelsbrücke Rn. Mft. Bei den Lehmgruben; Orehnit Bch. beim Forstgarten A. v. Chamisso jun.! Spechtbausen Bl.

513. P. uniflora L. Schattige Balber, an und in Sümpsen, zerstreut. P. Drewit Bs.! Zehlendorf D. Sp. Zwischen Paulsborn und dem Rhinmeister-See im und am Sumpf A. Br.!! an einem kleinen Sumpf beim Saugarten!! Papenberge D. Tegel nordwestlich vom Gasthose!! Dr. Nach Germendorf hin; Strohberge Rn.! Zühlsborfer heibe Schl. Na. Beim Finkenkrug!! Gr. Bähnit Kr. B. Jungsernheibe Schl. R. Gr. Alt-Laudsberg Gae. zwischen dem Beibekrug und Milncheberg Thiele! Prötzel hinter dem Park Kr. Hw. Zwischen Brunow und Leuenberg Bl. Nst. Beim Brunnen; Leuenberger Wiesen; Bornemannspfuhl Bch. Biesenthal: Lanke Schl.

#### 240. Chimophila Pursh.

514. C. umbellata (L.) Nutt. Kiesernwälber, zerstreut. Br. Bewesiner Hichten Sp. B. Safrow in ber heibe Bs. Rikolskoe Rt.! Ep. Grunewald Rn.! Tegel!! zwischen hermsborf und Glienick Kr. Dr. Strohberge Rn.! Kremmen: Tiehow in ber Pfarrheibe N.! R. Gr. Erkner!! Hw. Bei ber Teusselsbriick Rn.! Rst. Bornemannspfuhl Beh.! Spechthausen Schl. Trampe Kr. Biesenthal: Zwischen ber hellmühle und Lanke A. Br.

#### 241. Ramíschia Opiz.

515. R. secunda (L.) Gke. Kiefern- und gemischte Wälber, nicht selten. P. Pirschheibe Schp. Brauhausberg; Havelabhänge nach ber Psauen-Insel hin Bs. Sp. Grunewald Bl. Papenberge D. Tegel!! Schulzendorf Rei. Na. Stadtsors Gr. Sanbkrug bei Gr. Bähnit H. S.! B. Jungsernheibe!! Thiergarten bei der Kasanerie-Allee!! Köpnider Heibe D. K. Erkner!! Alt-Landsberg Gae. Fw. Bei der Teuselsbrücke Rn. Aft. häufig Bch. 3. B. beim Brunnen A. v. Chamisso jun.! Biesenthal: Zwischen der Hellmühle und Lanke A. Br.

#### 242. Monótropa L.

516. M. Hypopitys L. Schattige Balber, meift unter Riefern, gerftreut. P. Gladow Gr. Pirichheibe!! Brauhausberg Schp.

beim Jägerhause; an ber Griebnit; Nitolstoe Bs. Sp. Bei Paulsborn im Kiefernwalbe Rt.! Papenberge; Tegel D. B. Junfernheibe!! am Cichgestell jenseit Rummelsburg Schl.! K. Nach bem Neuen Krug hin W. M. bei ben Mäggelbergen Bl. Schöneiche Gr.! Erkner!! Br. Methorfer Berge Rn. beim Alaunwert Rn. Nft. Bei ber Darre Bch.

b) glabra Bernh. (ale Art). Gehr felten. B. Rl. Glie-

nide unter Riefern Drees! Brauhausberg Schp.

### Familie Aquifoliaceae D. C.

#### \* Ilex L.

\* I. Aquifolium L. 3m Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur in Parks angepflanzt.

#### 56. Familie. Oleaceae Lindl.

#### † Ligustrum Tourn.

† L. vulgare L. Im Gebiet wohl nicht einheimisch, sonbern nur zu heden gepflanzt und zuweilen verwilbert. B. Glindower Ziegeleiberge Schr. Na. Möthlower Beinberg!! Nft. Zainhammer; an ber Schwärze Bch.

#### + Syringa L.

† S. vulgaris L. Baufige Bierpflanze aus Giboft Europa. Bermilbert Gp.!! B. Schöneberg in Elsbrüchern Thiele!

\* S. chinensis L. Häufige Zierpflanze aus Afien.

\* S. persica L. Bierpflanze aus bem Drient.

#### 243. Fráxinus Tourn.

517. F. excélsior L. Feuchte Laubwälber, selten. Mit Sicherheit nur Ra. Fasanerie bei Königshorst H. S. Säufig an Strasfen, in Parks gepflanzt.

## 57. Familie. Asclepiadaceae R. Br.

#### + Asclépias L.

† A. syriaca L. Stammt aus Nordamerifa; früher angepflanzt, jett verwilbert P. Drachenberg Bs.!

#### 244. Vincetóxicum Mnch.

518. V. album (Mill.) Aschs. Trodne Bälber, sonnige Hisgel, zwischen Gebüschen, zerstreut. P. Am nörblichen Ufer bes Glinsbower Sees!! Wald zwischen bem Pulverhause und bem Forsthause hinter bem Branhausberg Bs.! Sp. Grunewald D. Papenberge!! Tegel im Park!! An. Piepenberge in der Bredower Forst!! Lindsholz!! Jahnberge!! B. Jungsernheibe besonders östlich vom Pichenberge!! K. Nübersdorfer Kaltberge Bl. Tasborf Thiele! Alt-Landsberg Gae. Mittenwalde: Weinberg H.S. II.! Zossen: Sperenberger Gipsberge!! Fw. Weinberg!! Schlößberg Rn. Paschenberg Beh.!!

## 58. Familie. Apocyuaceae R. Br. 245. Vinca L.

519. V. minor L. Schattige Balber, fehr selten. Sp. Tegel D. A. Rübersborf R. Buctom R. Fw. Zwischen bem Brunnen und bem Baa-See; wohl nur an ber letten Stelle als wilb zu betrachten. Häufig in Gärten.

## 59. Familie. Gentianaceae Juss.

#### 246. Menyanthes L.

520. M. trifoliata L. Sumpfwiesen, Gräben, nicht selten, z. B. P. jenseit des Reuen Palais; an der Nuthe Bs. Teltow Bl. Sp. Westl. Sumpfrand dei Paulsborn!! Tegel D. Dr. Birkenwerder Rei. Na. Beim Torssich nördlich vom Lindholz H. S. Kremmen: Um Rhin H. Lw. Frankenselde Rt. B. Borhagen; Lichtenberger Kietz J. zwischen Französsisch-Buchdolz und Buch Kr. Plöhenselsell wer faulen Spree W. M. Schöneberger Fenn Bl. Tempelhof Schp. jenseit Treptow an der Chaussell Köpnicher Weg diesseit des Neuen Kruges W. M. K. Woltersdorf H. Br. Katzense bei Möglin Rn. Rs. z. beim Eichwerder!! Biesenthal am Wege nach Lante A. Br.

#### 247. Limnánthemum Gmel.

521. L. nymphaeoides (L.) Lk. Stehende und langfam fließende Gemäffer, felten. Bisher nur Sp. An ber Sibfeite von Bichelswerber!! feit 1852 bemerkt; vielleicht nur burch Zufall eingesichleppt, jest aber fehr zahlreich.

#### Swertia L.

S. perennis L. Torffümpfe, fehr selten und zweifelhaft. Kremmen: Bei ber hadenberger Rhin-Stauarche von H. nur einmal in wenigen Eremplaren gefunden, später vergebens gesucht.

#### 248. Gentiána L.

522. G. Pneumonanthe L. Mäßig feuchte Wiesen, im westslichen Gebiet häusig, im östlichen saft fehlend. Br. Bewesin Sp. B. Kuhfort Bs.! zwischen Bornim und Marquard Schp. Sp.; Papenberge; Heiligenser; Tegel D. Dallborf Schl.! Na. Liegow Gr. beim Selbelanger Jägerhause!! Königshorst in der Kirchenkoppel H. S.! Rüthnick kt.! Lw. Frankensoberk kt.! Kremmen: Rhinluck H. Trebbin: Ahrensborf Gr.! B. Biese vor dem Franksurter Thor D. Friesdrickselbe Jochmann! Französisch-Buchdolz D. nördlich von Reinickendorf!! zwischen der Jungsernheide und Charlottenburg Schp.! Rusdower Wiesen!! Alt-Landsberg Gae.

523. G. verna L. Trodne Biefen, fehr felten. Bisber nur: B. Frangöfifd-Buchholz nach Buch bin!! zuerft von C. Hoffmann 1838

entbedt.

524. G. campestris L. Trodne Biesen, selten. Ra. Am süblichen Rande ber Bredower Forst 1832 Dr. Klotzsch! zwischen Berge und bem Sandkrug und zwischen bem Sandkrug und Gr. Bab-

nit Gr.!

525. G. Amarella L. Mäßig feuchte Wiesen, besonders an Maulwurfshausen, zerstreut. Br. Pewesin süblich vom Kanal Schr. Wachow C. Schultze. P. Jenseit des Neuen Palais Bs.! zwischen Bornim und Marquard Weiland! Na. Beim Bredower Korsthause!! Berge Philippi; beim Selbelanger Jägerhause!! Bessin östlich vom Wege nach Paulinenau Rt.! Buschower Mittelwiese Schr. Königsborst: Eiskeller- und Schmiedesoppel H. S.! Kremmen: Rhinluch H. Trebbin: Wiesen bei Schulzendorf, auch weißblübend Gr.! B. Zwischen Rummelsburg und dem Hammelstall Kr. Französisch-Buchbolz D. Wiesen am Wege zwischen Rigdorf und Ober-Nigdors!! Rudower Wiesen!! Stortow: Scady-Luch am westlichen Kande H.! Wr. Berge beim Spring Sch.!

#### 249. Erythraea Renealm.

526. E. Centaurium (L.) Pers. Feuchte Balbftellen, Wiesen, Begränder, häufig, 3. B. B. Jenseit bes Neuen Palais Bs. Sp.; Heiligensee; Tegel D. Lev. Ziegeleien Rt.! Lindhorft!! B. Degemeister!! Fuchsberge!! biesseit Französisch-Buchbolz Schp. Gesundbrunnen!! Reinidendorf; zwischen Moabit und Charlottenburg W. M. Steglit Bl. Tempelhof!! Marienborf Jochmann! Rubower Biefen!! Alt-Landsberg Gae. Br. Am Katzensee bei Möglin; Upstall bei

Schulzendorf Rn. Mft. 3. B. großer Schlangenpfubl Beh.!

527. E. linariaefolia (Lmk.) Pers. Mäßig feuchte, besons bers salzhaltige Wiesen und Tristen, Gräben, sehr zerstreut im westslichen Gebiet. Br. Pewesin: Lötzwiesen süblich vom Kanal Schr.!. P. Zwischen bem Reuen Palais und Kuhsort Bs.! Na. Bei Pauslinenau, besonders in Gräben viel!! Gr. Bähnit Thiele! Mangels-horst H.S.! Linumer hütung H.! B. Rudower Wiesen einzeln!!

528. E. pulchella (Sw.) Fr. Triften, Gräben, seuchte Stelelen, gerne auf Salzboben, zerstreut. B. Hinter bem Neuen Palais Bs.! Geltow Schp.! Nuthewiesen Bs. Sp. Pickelsberg D. Na. Am Wege zwischen bem Bredower Forsthause und ber Meierei, und zwischen bem Forsthause und Zestow!! beim Selvelanger Jägerhause!! Mangelshorst; Ribbedshorst H. S.! T. Niebelhorst P. Lw. Brand bei Frankensörbe Rt.! Trebbin: Schulzendors Gr.! B. Kolonie Hoben - Schönhausen Rach! Reinidendors; zwischen Charlottenburg und der Jungsernheibe; Wiesen schönhausen Gr. Besein füblich von Charlottenburg D. Schöneberg Thiele! westlich von Tempelhof Schp. K. Midersdorf Kth. Zossen Gr. Br. Baylower Wiese Rn. Nst. Am Kanal Bch.!

## Familie Polemoniaceae Lindl. + Polemónium Tourn.

+ P. coeruleum L. Im Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur häufig ale Zierpflanze in Garten. Berwilbert z. B. Beim Bofiager !!

### 60. Familie. Convolvulaceae Juss.

#### 250. Convólvulus L.

\* C. tricolor L. Zierpflanze aus Gilb-Europa.

529. C. sepium L. Feuchte Gebuiche, Beden, baufig.

\* C. davurious Sims. Zierpflanze aus Sibirien. 530. C. arvensis L. Aeder, Begränder, gemein.

b) auriculatus Desr. Auf steinigem Boben, nicht häufig. Auf bem Pflafter bes Leipziger Plates Bl.!! Schöneberg bei ber Kirche Bl.

#### + Pharbitis Choisy.

† P. purpurea (Lmk.) Aschs. Häufige Zierpflanze aus bem tropischen Umerika. Zuweilen auf Schutt u. f. m. verwilbert.

#### 251. Cuscuta Tourn.

531. C. europaea L. In Gebüschen, meist auf Beiben, Urtica dioeca L. und anderen hohen Pflanzen, selten auf niedrigen Kräutern. Häusig, z. B. B. Beim Neuen Balais Bs. Sp. D. Pichelsberg Schy. Na. Bredower Forst!! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. An der Chaussen auch Stralau!! an der Chaussen vor Friedrichsselbe J.! Reinidendorf D. Gebüsche bei der Moaditer Brücke!! beim Fart-Birkenwälden!! bei Morithof W. M. im Thiergarten!! Wilmersdorf Schl. Wr. Upstall bei Schulzendorf; Möglin auf Lupinen Rn. Ast. Cichwerder Bch.

532. C. Epithymum L. Sonnige Higel, trodne Bälber und Biesen, zerstreut. Br. Eiskutenberg bei Gr. Kreut Schr. B. Sanssouci unter ben Eichen Schp.! Baumgartenbrild Bs. zwischen Reudellenborf und bem Balbe Kr. Sp. Heiligensee D. Na. Lindsholz!! Sahnberge!! Trebbin: Lehrerwiese bei Schulzenborf Gr.! B. Kuchsberge Lessing! Jungsernheibe Schl. Steglit bei ber Schäferei

Bl. Raube Berge bei Lantwit W. M! Rudower Biefen!!

533. C. Epilinum Weihe. Auf Flachs, sehr zerftreut. Ra. Faltenhagen D. Beelit: Wittbriegen Rn.! Kanin Rt.! B. Friebrichsfelbe D. Reinickenborf 1857 A. Br.! Schöneberg D. Rubower

Biefen Schp.! Mft. Beh.

† C. lupuliformis Krocker. Beibengebüsche. Rur B. Schöneberger Busch Radecke! in Folge früherer Aussaat. Ob noch jett? (Nahe ber öftlichen Grenze Br. An ber alten Der bei Alt-Mebewit Sch.!)

## 61. Familie. Boraginaceae Desv.

### + Heliotrópium L.

† H. europaeum L. Aeder, fehr felten. B. Bornim von Schoen! einmal in Menge gefunden, später nicht wieber. Jebenfalls aus Gubbeutschland eingeschleppt.

### 252. Asperúgo Tourn.

534. A. procumbens L. An Beden, Zäunen, Begränbern, gerstreut. P. Sanssouci beim alten Drangeriehause! Brauhausberg Dr. Torges! Pfauen-Insel Vocke! Gröben Hempel. Sp. Bei ber

Citabelle R. Hartmann! Tegel Schl. Na Königshorst au ber Nordsleite H. S.! B. An ber Stadtmauer außerhalb bes Strasauer Thors J.! an ber Straße vom Frantsurter Thor nach Rummelsburg J.! an ber Chausse biesseit bes Weißenier Chaussechauses Kr.!! Kanstow; Reinidenbors D. Charlottenburg in ber Scharrstraße W. M.!! Brandenburger Kommunisation Bl. Schöneberg an der Rorbseite bes botanischen Gartens!! Rixbors Bl. K. Rahnsbors Kr. Alt-Landsberg!! Fw. Bl. Nft. Chausse bei der Scharstrickterei Bek.

#### 253. Echinospermum Sw.

535. E. Lappula (L.) Lehm. An Zäunen, Mauern, Wegsrändern, sehr zerstreut. P. Jägerschießkände Bs.! Na. An den Schenen vor dem Ruppiner Thor Gr.! B. Biesdorf D. Weißense Kth. Tempelhof; Rollberge D. A. Rübersdorfer Kaltberge A. Br.! Tasborf Schl. Hw. Am Damm nach dem Fährtrug Rn. Chausse über Faltenberg Bch. Nft. Beim Oberberger Chaussehause Bch.! Kahslenberg Bch.

#### 254. Cynoglossum L.

536. C. officinale L. Bufte Stellen, Dorfstraßen, Zäune, Balbickläge, nicht selten, z. B. Br. Pewesin am Kanal!! P. Ruisnenberg Bs. Wildparkstation W. M. Baumgartenbrudt!! Teltow W. M. Sp. Bei ber Hundetehle!! Pickelsberg!! Tegel Kth. Na. Briefelang Thiele! Königshorst H. S. Lw. Rt. B. Rummelsburg Schp. Landsberger Chausse! Beißensee; Jungfernheide Kth. beim Park Birkenwälchen W. M. Britz Bl. K. Woltersdorfer Schleuse!! Rosenwälchen W. M. Britz Bl. K. Woltersdorfer Schleuse!!

#### + Omphalódes Tourn.

† O. verna Mnch. Bierpflanze aus Gubbeutschland. Ber- wilbert B. Friedrichsfelber Bart!!

† O. linifolia (L.) Mnch. Zierpflanze aus Gilb-Europa, zuweilen auf Schutt einzeln verwilbert.

#### + Borágo Tourn.

† B. officinalis I.. In Afien einheimisch; bei uns zuweisten als Zierpflanze, seltener zum Ruchengebrauch gebaut, in und an Garten öfter verwilbert, boch meift unbeständig.

#### 255. Anchúsa L.

537. A. officinalis L. Sanbfelber, burre Higel, Wegranber, häufig. Beigblühend Kremmen: Ruthnick Muss! 538. A. arvensis (L.) M. B. Aecker, Begranber, nicht selten.

#### 256. Sýmphytum L.

• 539. S. officinale L. An Graben, auf naffen Biefen, in feuchten Gebuichen, baufig.

#### 257. Echium Tourn.

540. E. vulgare L. Sanbfelber, sonnige Bügel, trodne Balber, gemein. Mit fleischrother Bluthe, B. Fuchsberge Bl. Weiß-blühend B. Fuchsberge!! Charlottenburg, bem Schlofigarten gegen- über!!

† E. violaceum L. In Stie Europa einheimisch. Bisher nur einmal P. Zehlendorf unter Ornithopus sativus Brotero 1858!! eingeschleppt gefunden.

#### 258. Pulmonária Tourn.

541. P. officinalis L. Schattige Laubwälber, zerstreut. Na. Brieselang!! Bredower Forst!! Lindholz H. Hasanerie bei Königshorst H. S.!! Unterholz bei Dechtow H. B. Französisch-Buchbolz D. Alt-Landsberg Gae. Fürstenwalde: Steinhösel Hl.! Wr. Methore Berge Schl. Hw. Hammerthal Rn. Zieglerberg!! Alt. Cichwerber!! am Abhange zwischen bem Schügenhause und bem Brunnen!! Spechthausen Bch. Biesenthal: Part von Lante A. Br.

542. P. angustifolia L. Sonnige, lichte Stellen in Laubwälbern, fehr felten. Ra. Beim Bredower Forsthause!! R. Ribers

borfer Kaltberge Cruse (neuerbings nicht gefunden).

#### 259. Lithospermum Tourn.

543. L. officinale L. Gesträuch, besonders auf sonnigen Sügeln, sehr gerstreut. Br. Bewesin am Lötztanal westlich ber Brüde Schr.!! Ra. Zwijchen Rohrbeck und Döberitz Bs.! K. Rüdersborger Kaltberge!! Fw. Belvebereberg Sch.!

544. L. arvense L. Aeder, Begranber, Silgel, gemein. Blaublühend: Sp. Haffelhorst W. M. B. Aeder bei ben Fuchsbergen A. Br.!! beim Part Birkenwälden!! Fw. Subabhang bes

Schlogberges Rn.!

#### 260. Myosótis L.

545. M. palustris (L.) With. Sumpfwiesen, Ufer, banfig. Beigblühenb: Ra. Al. Bahnit Thiele!

b) hirsuta A. Br. Un Ufern größerer Bemaffer, nicht bau-

fig. Gp. Bichelsberg Schl.!

546. M. caespitosa Schultz. Sumpfranber, ausgetrodnete Graben, gerftreut. B. Am havelufer, Werber gegenüber; Baumgar

tenbrild D. Sp. D. B. Weißensee an ben Pfühlen häufig!! Jungfernheibe östlich vom Pfefferluch Rei.! nörblich von Wilmersborf Thiele! Tempelhof!! Fm. Schl. Nft. Leuenberger Wiesen Bch.

547. M. stricta Lk. Aeder, fonnige Bugel, baufig.

548. M. versicolor (Pers.) Sm. Etwas fruchte Graspläte, Ackerränder, zerstreut. Br. Werder bei Ketzilir Schr. Sp. D. bei ber Hundelehle Schp. B. Seegerscher Holzplatz Bl. beim hohlen See W. M. Lankwitz Thiele! Buctow: Pritzbagen Thiele! Fw. Scht.

† M. silvática (Ehrh.) Hoffm.

b) alpostris Schmidt. (als Art). Im Gebiete nicht wilb gefunden; häufige Zierpflanze, zuweilen einzeln verwilbert, fo B. Thiergarten!!

c) lactea v. Boenninghausen (als Art). Ebenfalls ange-

pflanzt.

549. M. hispida Schlechtendal sen. Trockne Balber, Grasplätze, Wegränder, zerstreut. P. Sanssouci Weiland! westlich vom Neuen Palais! Sp. Schl. Grunewald am Teufelssenn Sanio! bei Vaulsborn W. M. Na. Bredower Forst!! Kremmen: Kirchhof zu Tietzow!! B. Friedrichsselbe D. zwischen Pankow und me Schon hauser Part!! Thiergarten unweit des Brandenburger Thors Bl. nörblich am zoologischen Garten Bl.!! Tempelhof D. K. Woltersborf D. Fw. Schl. Rst. An der Chaussee nach dem Kirchhose Bch.!

550. M. intermedia Lk. Chattige Balber, Gebiliche, Beg-

ränber, nicht felten.

551. M. sparsiflora Mikan. Schattige Laubwälber, felten. B. Reuer Garten Weiland! Bs.! Fw. Beim Baa-See Rn.! Trante beim rothen Land Rn. bei ber Dampfmuhle Rn.! Selten verwilbert, fo B. Schöneberg Bl.!

### 62. Familie. Solanaceae Juss.

#### + Lýcium L.

† L. barbarum L. Bierftrauch aus Norbafrita. Gehr haufig ju Beden angepflanzt und zuweilen halb wilb.

#### 261. Solánum L.

552. S. nigrum L. Dorfftragen, Begranber, Schutt, Bartenland, gemein.

b) chlorocarpum Spenner (als Art). Mit ber hauptart, gerftreut. B. Beißenjee!! am Zellengefängniß Körnicke! Schöneberg; Johannisthal A. Br. Biesenthal A. Br. c) humile Bernh. (als Art) \*). Wie voriges, zerstreut Sp. Auhleben Bauer! B. Friedrichsfelbe!! Beißensee!! Tempelhof Bauer. Brit Körnicke! Fw. Maunwert Rn.!

d) memphiticum Martius (als Art). Gelten. B. Trep-

tow A. Br.

553. S. villosum (L.) Lmk. Rur

b) alatum Mnch. (als Art). Aeder, febr felten. Rur B. Brit 1839 Draeger!

554. S. Dulcamara L. Feuchte Gebuiche, Sumpfrander,

9aung. \* S. tuberosum L. Stammt aus Südamerifa. Ueberall angebaut.

#### \* Lycopérsicum Tourn.

\* L. esculentum Mill. Stammt aus bem tropischen Amerita. Im Gebiet zuweilen als Zierpflanze und ber Frucht wegen tultivirt.

#### + Phýsalis L.

† P. Alkekengi L. Im Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur in Gärten gezogen und in und an benselben zuweilen verwilbert. Br. Weseram Gr. Na. sparsam Gr. Nft. Im Schultsichen Garten in Menge verwilbert Beh.!!

#### + Nicandra Adans.

† N. physaloides (L.) Gaertn. Zierpflanze aus Silbamerita, in Gartensand, an Zäunen, auf Schutt zuweisen verwilbert, boch meist unbeständig. B. Bornstedt Bs.! Beelit: Bittbrietzen Rn. Trebbin: Schulzenborf Gr.! B. Schöneberg Rn.! am zoologischen Garten 1853 Caspary. Fw. Brunnen; Alaunwert Rn.

#### 262. Hyoscýamus Tourn.

555. H. niger L. Dorfftraßen, an Zäunen, nicht felten, z. B. Br. Pewesin am Löglanal!! P. Neblig; Bornstebt; Geltow Bs. Teltow Bl. Zehlendorf Ascherson sen.! Na. Königshorst H. S. Lw. Schöneweibe!! Trebbin: Schulzendorf!! B. Friedrichsselbe; Wissensborf; Steglig Schl. Schöneberg am siblichen Ende W. M. Tempelhof Rei. Alt-Landsberg!! Rft. Beim Spittel; Sommerfelbe Bch. b) agrestis Kit. (als Art). Wie die Hauptart, sehr zer

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich 8. villosum ber früheren Berliner Floriften.

ftreut. B. Schöneberg 1857 A. Br. R. Boltersborf; Alter Grund A. Br.!

o) pallidus Kit. Wie bie Sauptart, febr gerftreut, wohl nur verwilbert. B. Grasplate bei ber Universität!! Schoneberg einzeln!!

#### \* Nicotiána L.

\* N. Tabacum L. In Nordamerika einheimisch; im Gebiet nur an wenigen Stellen im Großen gebaut: Na. Bei Mangelshorft. Lw. Bei Felgentreu. Sonst nur vereinzelt; bagegen viel außerhalb ber nordwestlichen Gebietsgrenze bei Fw., Oberberg u. f. w.

† N. rustica L. Stammt aus Brafilien; hier nicht gebaut, sonbern nur zuweilen auf Schutt und als Gartenunkraut. Go Ra.

Gr.! Mangelshorft H. S.

#### + Datúra L.

† D. Strammonium L. Aus Borber-Asien, seit ben letzten Jahren bes 16ten Jahrhunderts eingewandert; seht in Dorsstraßen, im Gartenlande, auf Schutt, nicht selten, d. B. P. Reblit; Bornssed Bs. Sp. Ruhleben W. M. Bichelsborf Kich. Na. Königshorst H. S. Lw. Lindenberg Th. Gottow!! B. Friedrichsselbe Kich. Beissenjee!! Wilmersdorf; Steglit Kich. Schöneberg am siblichen Ende W. M. Tempelhof Rei. Buichtrug!! Bucow!! A. Boltersdorf!!

b) Tatula L. (als Art). In Garten zuweilen vermilbert.

B. Charlottenburger Schlofigarten 1858 W. M.

## 63. Familie. Scrophulariaceae R. Br.

#### 263. Verbascum L.

556. V. Thapsus L. Sanbselber, sonnige hügel, sehr zersftreut. Sp. R. Alt-Landsberg Gae.! Zwischen bem Beibelrug und Budow R. Milncheberg Radig. Rft. An ber Schwärze beim Zain-bammer Beh.

557. V. thapsiforme Schrad. Wie voriges, häufig, & B. Br. Gr. Krent Schr. B. Aninenberg Bs. Sp. Auhleben Kth. Trebbin: Schulzenborf Gr.! B. Kolonie Hohen-Schönhausen!! Weisseusse!! Bedding Schl. vor der Jungsernheibe!! Charlottenburg Schl. slüblich von Schweberg Bl. Alt-Landsberg Gae. Fürstenwalde: Buchholf F. Ascherson! Rū. Beim Bahnhos!!

558. V. Lychnitis L. Wie voriges, nicht selten. Br. Gr. Kreut Schr. B. Pfauen-Insell! Teltow W. M. Sp. D. Bichels-berg; Pichelswerber Bl. Na. Brebower Forst!! B. Bei ber Scharf-

richterei!! Weiße Berge bei d. faulen Spree W. M. Schöneberg bei d. Kirche Schp. am sübl. Ende bes Dorfes!! Tempelhof Rei. K. Tasborf Schl.! Alt-Landsberg Gae. Aft. Mönchsbrüde; Bleichberg Bch. 559. V. nigrum L. Gebüsche, Wegränder, häufig, d. B. Br. Gr. Kreutz Westeram Schr. P. Ruinenberg; Bornsteb Bs. Teltom W. M. Sp. Grunewald; Pichelsberg Kth. Na. Briefelang Rei. B. Friedrichsselbe J.! Friedrichshain J. Weißensee; Charlottenburg; Steglig Kth. Wilmersborf Bl. Tempelhof Schp. Budow W. M.! Reuer Krug!! Alt-Landsberg!! Br. Büchnig bei Wöglin; Upstall bei Schulzenborf Rn. Aft. Drachenborf; Oberberger Chaussee Bch.

† V. phoenicoum L. Im Gebiet nicht einheimisch, fonbern nur selten als Zierpflanze und zuweilen verwilbert. B. Ruinenberg Krumbholz; Pfauen-Insel Vocke. B. Bei ber Scharfrichterei v. Muff-

ling 1855!

† V. Blattaria L. Bie voriges. Rur B. Reuer Garten Bs.! 557 × 558. V. thapsiforme × Lychnitis. Mit ben Eletern, febr zerstreut. Br. Deet unterhalb bes Mühlenberges Schr.! B. Bei ber Scharfrichterei 1853 A. Br.!

#### + Célsia L.

† C. Barnadesii (Vahl.) G. Don. Seltenere Bierpflanze aus Spanien; verwilbert B. Seegericher holpplat 1857 Bl. !

#### 264. Scrophulária Tourn.

560. S. nodosa L. Gebüsche, Balber, hügel, häufig.

561. S. alata Gil. An Gräben, Bachen, zerstreut. B. Sanssouci Bs. Kömerschanze Bl. Kl. Machenow W. M. Sp. D. Grune-walb Bl. Heiligensee; Tegel D. B. Bei ben Fuchsbergen Rei.! Französisch-Buchholz an ber Pante!! zwischen kantow und bem Gessundborunnen!! Reinickendorf; Jungsernheibe D Bellevue Bl. zw. b. Buschtrug und Ober-Rixborf!! K. Tasborf D. Br. Methorfer Berge Rn. Rs. Leuenberger Wiesen; Brunnen; an ber Schwärze Bch.

† S. vernalis L Stammt aus Subbeutschland; in und an Barten zuweilen verwilbert, boch meist unbeständig. B. Pfauen-Infel Vocke. B. Part von Frangösisch Buchholz Tittelbach 1852!! Schöneberg am Inftituts- Schp.!! und botanischen Garten W. M.

#### 265. Gratíola L.

562. G. officinalis L. Feuchte Biesen, an Simpfen, bessonbers A, zerstreut. Br. Pewesin am Kanal!! P. Am heiligen See Gr. Sanssouci; Tornow Bs. Ruthewiesen Bs.! am Schlachtenssee Gr. Sp. Havelufer bei Pichelsberg!! Papenberge D. B. Biessen vor bem Franksurter Thor J.! Stralau; Beißensee D. Charlots

tenburg Bl. Wilmersborf D. am Hauptgraben öftlich ber Potsbamer Sienbahn W. M.!! Lankwit an ber krummen Lanke Bl. Tempelhof an mehreren Pfühlen!! Rubower Wiesen; Treptow D. K. Friedrichs-bagen am Aussluß ver Spree aus dem Müggelsee Jahn. Br. Upstall bei Schulzendorf Rn. Fw. Chanssegraben beim Alaunwerk Rn. Rt. Weidenbamm Beh.!

#### 266. Digitalis Tourn.

† D. purpurea L. Säufige Zierpflanze aus Mittelbentichland. Berwilbert: Ew. Bei ber Pratoriusschen Fabrit!! B. Beim Bofiager!!

563. D. ambigua Murr. Sonnige Gebuiche in Laubwalbern, jelten. Dr. Zerpenichleuse Kr. Ra. Beim Bredower Forsthause!!

Mft. Commerfelbe Kirchner. Chorin H.

#### 267. Antirrhínum L.

\* A. majus L. ex p. Baufige Zierpflanze aus Gubbeutich- lanb.

564. A. Oróntium L. Lehmäder, sehr zerstreut. Sp. R. Ra. Kl. Bähnitz Gr.! B. Weißensee Schl. östlich von Schmargensbors W. M.! Tempelhof 1814 R.! (seitbem, wie es scheint, nicht wiesber). Zossen: Kummersbors Rt.! Bucow: Prithagen Walter. Fw. Mannwerk bei ber hütte Rn.

#### 268. Linária Tourn.

† L. Cymbalaria (L.) Mill. Zierpflanze aus Sibbentichland, hier und ba an Mauern verwilbert. B. Ufermauer an ber Officite bes Luftgartens Bs.! und am Kanal vor bem Königlichen Militair-Waisenhause Bs. Na. Königshorst am Annthause H. S.! B. Ufermauer bei ben Belperschen Bäbern an ber Friedrichsbrücke Helmrich!! Rft. Karlswerk Rn.

565. L. Elatine (L.) Mill. Aeder mit Lehms und Mergelsboben, sehr zerstreut. Br. Pewesin: Stammenden neben der Trift Schr.! Na. Königshorst: Beders Rachtkoppel H. S.! T. Niebelsborft P. Lw. Brand bei Frankenförde Rt.! Trebbin: Aeder sublich

von Schulgenborf Gr.!! Mittenwalde Schoen.

566. L. minor (L.) Desk. Aecker mit Lehm- und sandigem Lehmboben, Gartenland, Mauern, zerstreut. Br. Stammenden bei der Trift Schr.! P. Treppe des Kenen Palais Bs. Feigenmauer Schp.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Lange Brilde; Schloß D. Bisthaus Helmrich!! Treppe der katholischen Kirche Helmrich; an der Königl. Bibliothek 1851!! Pankow D. Charlottenburger Schloßgarten einzeln 1858 W. M.! K. Am Schloß; Rübersdorf D. Zose

fen: Kummersborf nach Sperenberg bin!! füblich von Sperenberg!! Britsbagen Thiele! Rft. In Gärten Beh.!

† L. bipartita (Vent.) Willd. Zierpstanze aus Rorbafrita. Zuweisen in Gärten und an Zäunen verwisbert. Or. Zehlenborf Rn.! Ra. Amtsgarten bei Königshorst H. S.! B. Bigleben Teetz!

567. L. arvensis (L.) Desf. ex p. Aeder mit sandigem Lehmboben, wohl nur D, zerstreut. P. Zehlenbors!! Beelitz: Wittbrieten Rn.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Schmargendorf D. zwischen Wilmersdorf und Schöneberg!! Aeder östlich von Schöneberg Radecke! Steglit D. zwischen dem Kreuzberg und Tempelhof einzeln!! siblich von Tempelhof D. Zossen: Zwischen Kummersdorf und Sperenberg!! Müncheberg: Hoppegarten Jahn.

568. L. vulgaris Mill. Trodne Balber, Grasplate, Beg-

ranber, Brachfelber, gemein.

#### † Mimulus L.

† M. luteus L. Zierpflanze aus Nordamerita, zuweisen an Ufern völlig verwisbert. B. Am rechten Havelufer oberhalb Baumgartenbrück Sanio! Lw. Am rechten Nuthenser am Steige nach Kolzenburg Rt.!!

#### 269. Verónica L.

569. V. soutellata L. Sumpfränder, Gräben, nicht selten, z. B. P. Tornow; Ablage Bs. am Bannsee W.M. Sp. Grunewald am Rhinmeister-See Schp. Bichelsberg; Tegel Kth. Ra. Briteselang bei der Königseiche W.M. Kremmen: Rhinluch H.! Lw. Renneberge Rt.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Beißense mehreren Pfühlen!! Gesundbrunnen Kth. Chaussegraben diesseit Reinickendorf!! Jungsernheibe Kth. Schönsberg Thiele! Tempelhofs!! Storkow: Scaby-Luch H. Nst. Babeanstalt; Leuenberger Wiesen Bch.

570. V. Anagallis L. Wie vorige, häufig, 3. B. Sp. Tegel Kth. Or. Lehnih Schl. Na. Königshorst H. S. Lw. Bei ben Rennebergen Rt. Trebbin: Schulzenborf Gr. l B. Gräben vor dem Frankfurter Thor bis Boxhagen!! zwischen Schönhausen und bem Gesundbrunnen an der Panke!! Jungsernheide W. M. Witzleben Bt. Wilmersdorf Thiele! Wiesengräben westlich der Potsbamer Straße!! Rudower Wiesen Bt. Treptow Kth. Rft. Weibendamm Bch.

571. V. Beccabunga L. Gräben, Bäche, Quellen, selten. B. Tornow; Ablage; Ravensberge an ber Quelle; Bergholz Bs. Sp. Am Grunewalbsee!! Tegel Kth. Ra. Finkentrug Rei. Lw. Schöneweibe!! Trebbin: Schulzenborf Gr.! B. Rummelsburg am Markgrasenbamm W. M. Gesundbrunen; Jungsernheibe Kth. Wismersborf Thiele! am Schöneberger Busch Bl. südöstlich von Rixborf!!

nördlich vom Buschtrug!! A. Woltersborfer Schleuse W. M.! Tasborf Kih. Alt-Landsberg Gae: Fw. Schl. Nst. Nach bem Eichwerder bin!! Spechthausen Bl.

572. V. Chamaedrys L. Balber, Gebifche, gemein.

573. V. officinalis L. Trodne Balber, häufig, 3. B. B. Gebuiche an ben Ruthewiesen Bs. Sp. Grunewald!! (auch weiß-blübenb!!) Papenberge Kth. Tegler heibe Schp. Na. Bei ber halteftelle Finkenkrug!! B. Rummelsburg Thiele! Jungfernheibe Schl.! Thiergarten W. M. Köpnider heibe Kth. Rft. Oberheibe Bch.

574. V. prostrata L. Sonnige hilgel, trodne Wiesen, Grasplüte, besonders D, stellenweise fast gemein, an anderen Stellen selten oder sehsend. B. Kninenberg Bs. Wiesen, Werder gegenüber!! am Wege nach dem Templin; Braudausberg Bs. Sp. Schildborn Sei.! am Wege nach Nieder-Reuendors!! Tegel D. Na. Lindhola!! Gr. Bähnig; Buschow Schr. B. sehr häusig: Huckberge!! Exercirplat vor dem Schönhauser Thor!! zwischen dem Schönhauser Park und Pankow!! Moadit Rei. Weiße Sand-Berge an der saulen Spree!! Spandauer Berg!! Wigleben Schp.! Kurssürstendamm W. M. Hippodrom J.!! Schmargendors am Hohlweg!! zwischen Wilmersdorf und Schöneberg Bl. am Kanal zwischen der Kottbusser und Schlessische!! A. Tasborf Kth. Alt-Landsberg Gae. Fw. Nörblich von Köthen Bch.!! MR. Hausberg Bch.

575. V. latifolia L. Wie vorige, zerstreut. Br. Pewesin bem Gasthof gegenüber!! und an ber Wachower Grenze Schr.! P. Beim Reuen Palais einzeln Schp.! Glindower Ziegelei-Berge Schr. Zehlendorf D. Dr. Birtenwerder Schl. Na. Britzelang D. Jahnberge!! B. Pantow D. Charlottenburg im Schlösgarten Bl. Kirchsbower Wilmersdorf D. zu Schöneberg W. M.! Tempelhof D. Richower Wiesen Dr. Korschel! Alte-Landsberg Gae. Bucow: Pritzhagen Thiele! Fw. Ruinenberg; Afazienberg Rn. Amalienhof Rn.! Rn. Mönchsbride; Warbecks Mühle; Sichwerder; Tornow Bch.! zwischen Hohen-Kinow und Köthen Bch.!! Zuweisen als Zierpflanze

in Garten.

576. V. longifolia L. Feuchte Wiesen, Geblische, fast nur A, zerstreut. P. Geltow Bs. Kaput Drees! Psauen-Insel Schp.! Ep. D. Grunewald an der Rhimmeisterbrilde!! Tegel auf dem Haselscher A. Br.! Or. Hohenbruch Bl. B. Stralau D. Spreewiesen beim Hegemeister!! Wiesen westlich am Lichtenberger Rietz I. Midlich an der Jungsernheibe Jahn! Charlottenburg D. Treptow am Wege nach dem Eierhäuschen!! Reuer Krug Rei.! K. Bei den Kalkbergen D. Bernau: Labedurg Schl. Nst. Am Kanal; beim Eichswerder Bch. Zuweisen in Gärten gepflanzt.

577. V. spicata L. Sonnige Bugel, trodne Balber, meift

D, nicht selten. Br. Eiskutenberg bei Gr. Kreut Hechel! P. Charlottenhof Schp. Brauhausberg; an den Nuthewiesen Bs. Havelabhang nach der Pfauen-Insel hin!! Wald südöstlich vom Schlachtensee!! Sp. Bichelsberg!! Papenberge; Bamberge D. Dr. Zerpenschleuse Kr. Na. Weinberg!! Jahnberge!! Krenmen: Linum auf der krummen vorst H.! Beelit: Zwischen Nettchensdorf und Dobbrikow Rt. Lw. Elsthal!! B. Wald beim Hegemeister!! Huchsbergel! zwischen Schönhausen und dem Gesundbrunnen!! Jungfernheide diessell zwischen Socke. Tempelhof D. K. Nahnsdorf D. zwischen Woltersdorf und der Schleuse!! Rübersdorfer Kallberge!! Tasdorf Schl.! Alt-Landsberg am Wege nach den den der Gründen Gae.! Zossen: Sperenberger Gipsberge!! W. Büchnit dei Möglin; am Upstall dei Schulzendorf Rn. Fw. Kninens und Afazienberg; Broigsborf Rn. Kst. Waldens wald Sommerfelde hin Beh.! Chorin Baetke!

578. V. serpyllifolia L. Feichte Walbstellen, Graspläte, Aderränder, nicht selten, z. B. B. Sanssouci Bs. Sp. Stadtsorst!! Grunewald Schl. Tegel Kth. Na. Briefelang W. M. Lw. Frankenstellen Rt. B. Beißense; Reinidendorf Kth. vor Moabit!! beim Ronnendamm W. M. Thiergarten Bl. westlich vom botanischen Garten!! Tempelhof Kth. Budow: Im Elpsium!! Rft. Oberheide Bck.

b) tenella All. (als Art). Gelten Br. Bewefin Schr.

579. V. arvensis L. Aeder, Grasplätze, Begründer, häufig. † V. peregrina L. Stammt aus Sub-Europa; nur zufällig eingeschleppt. B. Königliche Landesbaumschule Radecke! Pfauen-In-fel Vocke!

580. V. verna L. Sanbselber, trodne Walbstellen, nicht seleten. B. Hinter bem Kirchhose Bs. Sp. D. Grunewald am Rhin-meister-See!! und nach Schmargenborf hin!! Tegel D. Ra. Falken-hagen D. Piepenberge in der Bredower Forst!! Börnick N.! Barnewit Schr. Möthlower Weinberg!! B. Bei den Fuchsbergen J.! Neder nördlich der Stadt D. an der Jungsernheide!! biesseit!! Eharlottenburg D. Schöneberg Bl. Tempelhos!! Hasenheide; Reuer Arug W. M. K. Erkner!! Alt. Beim Kirchbos Beh.

581. V. triphyllos L. Meder, besonbers auf fanbigem Lehm-

boben, gemein.

582. V. praecox All. Aeder mit Lehm- und sandigem Lehmboben, sehr zerstreut. B. Am Braushausberg Bs.! hinter bem Kirchhof Bs. Lw. Beim Biltgerbusch Rt.! B. Zwischen bem Franksurter und Landsberger Thor Schl.! Gesundbrunnen Kth. Budow: Bollersborf; Prithagen Schl. Br. Bahlower Berge Thiele! Schulzenborf beim Upstall Rn. beim Landhof Sch.!

583. V. persica Poir. Lehmader, febr gerftrent, mobl mehr-

fach überfeben. Gb. Rach Kalfenbagen gu E. Rose! B. Beifenfee

auf Medern füboftlich vom Dorfe A. Br.!!

584. V. agrestis L. Meder, Wegranber, gerftreut. Br. Dees Schr. B. Gubofflich von Beifenfee!! Schmargendorf!! Bilmereborf Thiele! an ber Ofiseite von Schöneberg W. M.! an ber Chanssee bieffeit Rudow W. M.! Fr. Beim Alaunwert!! Rft. Beh.

585. V. opaca Fr. Neder, felten, aber mobl mebrfach über-

ieben. Dur B. Beim Lichtenberger Riet J.!

586. V. polita Fr. Aeder, Begranber, Grasplate, gerstrent, wohl vielfach übersehen. Br. Bewefin an ber Trift Schr. Na. Reufammer Schr.! B. Sobe Meder vor bem Frantfurter Thor J.! Schöneberg !! beim Duftern Reller !!

587. V. hederaefolia Fr. Meder, Wegranber, trodner Balb-

boben, gemein.

#### 270. Limosella L.

588. L. aquatica L. Keuchter Schlamm an Fluß- und Seeufern, ausgetrodnete Graben, febr gerftreut. Gp. Benningeborf Phi-B. Beifenfee am Pfuhl nördlich vom Chauffeehaufe!! bei ben Rebbergen Kth. Tempelhof D. Br. Schulgendorf Walter!

#### 271. Melampyrum Tourn.

589. M. eristatum L. Trodne Biefen, Laubwälber, Bugel, felten. Br. Friiber in bem jett urbar gemachten Bachowichen Berber Sp. Sp. Nachthutung C. Bouche sen! Fm. Schlofigarten Bl.

590. M. arvense L Lehmader, fonnige Bugel, febr gerftreut. Br. Schmergow Schr. Bewefin Schr. B. Bei Beltow einzeln Schp.! Sp. Rach Ra. bin D. Dr. Behlefang; Germenborf Kr. Ra. Am Bege nach Martee Gr.! Müncheberg Jahn. Br. Bablow Walter! Fm. Beinberg!! Afazienberg Rn. Rft. Gliblich ber Oberberger

Chauffee Bch.

591. M. nemorosum L. Laubwalber, Gebiliche, gerftreut, befonbers baufig in ber bavellanbifden Rieberung. Gp. Papenberge Thiele! Ma. Robrbed Bs. Briefelang!! Brebower Forft!! Stadtforft!! Lindhola!! Jahnberge H. S.! 2m. Elethal!! Trebbin: Scharfenbruder Forft Gr.! B. Frangofifd-Buchholg Kr. Schonhaufer Bart!! Johannisthal D. Alt-Landsberg Gae. Fw. Ruinenberg!! am Schlofigarten!! Mazienberg Rn. Rft. Eichwerber; hinter Dictus' Garten Beh.! Biesenthal: Lanke A. Br.

592. M. pratense L. Trodne Balber, Gebuiche, nicht felten, 3. B. B. Sanssouci Schp. Sp. Grunewald; Tegel Kith. Ra. Briefelang W. M.! Stadtsorst!! Lw. Rauchenberge Rt. B. Jungsfernheibe!! Thiergarten!! Lankwit Thiele!

#### 272. Pedicularis Tourn.

593. P. silvatica L. Feuchte, moorige Stellen, Sumpfränder, zerstreut. Sp. Beim Grunewald; Stadtsorst D. Na. Beim Briefelang D. Beelit: Elsholz Krumbholz. Lw. Frankenförde Rt.! Schöneweide Gr.! B. Rummelsburg Kth. zwischen Friedrichsselde und dem Gasthof zur weißen Taube Hanstein; Buch Kosa; Reinickendorf Jahn! Jungfernheide D. Johannishal Thiele! Friedrichsbagen Gr. Tasborf Kth.

594. P. palustris L. Sumpswiesen, nicht selten. P. Nörblich vom Wildpart!! Ruthewiesen Bx. Teltow Bl. Sp. Grunewald Schp. Stadtforst D. Tegel Kth. Kremmen: Rhinluch H.1 Lw. Tiesses Gehege Rt. B. Am Markgrasendamm!! bei den Kuchsbergen W. M. süblich an der Jungsernheide!! Wilmersdorf Thiele! Steglit Bl. Tempelhof D. Rudower Wiesen!! K. Tasborf D. Rst. Bech.

#### 273. Alectorólophus Haller.

595. A. minor (Ehrh.) W. u. Grab. Trockne Wiesen, nicht so häusig als solgender, d. B. P. Ruthewiesen Bs. Lw. Züllichendorf Rt. B. Wiesen vor dem Franksuter Thor J. Rummelsburg Thiele! Wilmersdorf Bl. Rudower Wiesen!! am Köpnicker Wege Res. 596. A. major (Ehrh.) Rohd. Trockne Wiesen, gemein.

#### 274. Euphrásia Tourn.

597. E. officinalis L. Trodne Biesen, Balber, häufig. 598. E. Odontites L. ex p. Biesen, feuchte Neder, nicht felten.

599. E. lutea L. Sonnige Stigel, selten. Nur im Obergebiete. Br. Berge beim Rondel Sch.! Fw. Amalienhof!! Broigsborf Rn.

#### 275. Orobanche L.

600. O. Epithymum D. C. Sonnige Hügel, auf ben Burgeln von Thymus Serpyllum L. schmarogend, sehr selten. Rur P. Baumgartenbrud öftlich vom Beinberg!! Von D. zuerst gefunden.

601. O. caryophyllacea Sm. Sonnige Higel, trockne Wiesen, auf Galium verum L. und Mollugo L., meist D, sehr zerstreut. Br. Kehur auf dem Werder Schr.! Bagow Sp. P. Kuinenberg Bl. Baumgartendruck östlich vom Weinberg in mehreren Abanderungen!! Glindower Berge Schr. Na. Am Chaussegraben senset Werge in vielen Formen D. Wiesen nördlich von Kl. Bähnit Schr.!! Möthlower Beinberg!!

602. O. arenaria Borkhausen. Sonnige Sügel, auf Arte-

misia campestris L., selten. P. Baumgartenbrild beim Weinberge Schp. Schr. Budow Radig! Fw. Hinter bem Weinberg Rn.! Sch.! b) robusta A. Dietrich (als Art). P. Baumgartenbrild sehr einzeln D.

#### 276. Lathraea L.

603. L. Sqamaria L. Schattige Laubwälber, auf ben Wurzeln verschiedener Holzgewächse schmaropend, zerstreut. B. Sanssouci Weiland! Bs. Or. Schlofigarten Rn.! Na. Brieselang!! Bredower Forst!! Stadtforst Gr. Fasanerie bei Königshorst!! Lw. Elsthal Rt.! B. Französisch-Buchdlz Kr. K. Tasborf R. Alt-Landsberg Gae. Müncheberg beim Heibetrug!! Bucow: Prithagen Walter! Mft. Am Graben diesseit des Schützenhauses Prof. Ratzeburg!! vom Brunsnen bis Spechthausen; bei den Leuenberger Wiesen Beh.

## 64. Familie. Labiatae Juss.

#### † Elsholtzia Willd.

† E. Patrinii (Lopochin) Aschs. Stammt aus Asien. Im Gebiet nur hier und ba als Gartenunkraut. B. In verschiebenen Gärten, z. B. am Schiffbauerdamm!! am Hausvoigteiplat J. Br. Möglin kn. Fw. (Außerhalb ber Grenze in Alt-Ranft Sch.) Altskiet kn.

#### 277. Mentha L.

- 604. M. silvestris L. An Gräben, Zännen, sehr zerstreut; theilweise wohl nur verwilbert. P. Charlottenhof Schp.! Sp. In Staaten Körnicke. Or. Am Stadtgraben Rn.! K. Alter Grund am Fließ Bt. Alt-Landsberg: An der Stienitz unterhalb der Bersliner Mühle Gae.! Fw. Hannnerthal.; Alaunwert Rn. Amalienhos!! Rst. Graben beim Kniebusch Bech.!! Biesenthal am Ausgang nach Lanke A. Br.
- † M. piperita Sm. Stammt aus England; bier und ba ge-

605. M. aquatica L. Graben, feuchte Gebiliche, haufig.

606. M. arvensis L. Graben, Glimpfe, feuchte Aeder, gemein.
b) gentilis L. (als Art). Un ähnlichen Stellen als bie hauptart, felten, aber wohl mehrsach übersehen. B. Beißensee Philippi; zwischen bem zoologischen Garten und Bilmersborf Rei.!

\* M. Pulegium L. Trodne, sanbige Biesen, nur A. (Nahe ber norböstlichen Grenze bei Fw. Biesen beim Fahrtrug nach Brahlit bin!! Rft. Liepe!!

#### 278. Lýcopus L.

607. L. europaeus L. Sümpfe, Graben, feuchte Gebufche, baufig.

#### 279. Sálvia L.

608. S. pratonsis L. Sonnige Hügel, trochne Bälber, Kirchhöse, meist D, nicht selten. Br. Eiskutenberg bei Gr. Kreutz; Bagow Schr. B. Katharinenholz Schp. Baumgartenbrück!! jenseit Kl.
Glienick Drees. Zehlendorf Bl. Sp. Pichelsberg!! Stadtsorst Schl.
Tegel Kih. Dr. Birkenwerder; Banbelit Schl. Na. Destlich von Kalkenhagen D. Wöthlower Weinberg!! Dechtower Kiesernheide H. S.
Kremmen: Kirchhof zu Tietgow N.!! Lw. Beinberg bei Dobbritow
P. B. Beim Plögensee!! Beiße Sand-Berge an der seulen Spree
W. M. zwischen Dahlem und Steglit W. M. Kirchhof zu Wilmersborf D. zu Tempelhof W. M.! Kreuzberg!! Rollberge!! Britz D.
K. Nörblich der Boltersdorfer Schlense!! Ribersdorfer Kalkberge!!
Tasdorf Kih. Alt-Landsberg Gae. Zwischen Müncheberg und Buckow
O. Jaenicke. Wr. Methorfer Berge (rothblühend) Thiele! Fw. Sibtich vom Maunwert!! Rst. Pfingstberg; Chorin Beh. Hefelberg;
Leuenberg Bl. Biesenthal: Lante Schl.

† S. silvestris L. Stammt aus Mittelbeutichlanb. Sier nur zuweilen mit frember Saat eingeschleppt, boch unbeftanbig. B.

Tempelhof Grunow. Alt-Landsberg: Debrow Gue.!

† S. verticillata L. Stammt aus Oftbeutschland. Im Gebiet nur hier und ba mit Luzernesaamen eingeschleppt, boch unbeständig. B. Friedrichsselbe Körnicke; Friedrichshain Winkler; Tempelbof Rn.

#### 280. Origanum L.

609. O. vulgare L. Trodne Laubwälber; Gebüsche, sehr zerstreut. Sp. Papenberge D. Na. Rohrbed Bs. Bredower Forst!! Lindholz!! Unterholz bei Dechtow H. S. Trebbin Gr. K. Rüberssborfer Kaltberge Bl. Zossen: Sperenberger Gipsberge!! Fw. Ruisnenberg!! Schlößberg; Broigsborf Rn. Aft. Kahlenberg Beh.!

#### 281. Thymus L.

610. T. Serpyllum L.

a) Chamaedrys Fr. Trodne Balber, Biefen, hügel, gerftreut. B. Ruinenberg W. M.! Na. Briefelang Körnicke! K. Rübersborfer Kallberge Schl.! Br. Methorfer Berge Thiele!

b) angustifolius Pers. Wie vorige, gemein.

#### \* Saturéja L.

\* S. hortensis L. Befanntes Rüchenfraut aus Gub-Europa.

#### 282. Calamintha Mnch.

611. C. Acinos (L.) Clairv. Sonnige Higel, trodne Biefen, Begranber, meift D, haufig. Beifbliftenb Ra. Jahnberge!!

612. C. Clinopodium Benth. Trockne Laubwälber, Gebüsche zerstreut. B. Ruinenberg W. M.! Brauhausberg und sonst in ber Forst Bs. Sp. Grunewald Bl. Bichelsberg im Teufelsgraben!! Papenberge Thiele! Tegel D. Na. Bei ber Haltestelle Finkenkrug!! Habnberge!! Lindholz!! Unterholz bei Dechtow H. S. Lw. Jenseit Elsthal!! Trebbin: Schulzenbors Gr.! B. Jungfernheibe am Kanal!! Thiergarten!! zwijchen Rixbors und Forsthaus Ober-Mixbors!! S. Riibersborser Kalkberge D. Alt-Landsberg am Wall!! Blumenthal D. Jossen: Sperenberger Gipsberge!! Fw. Brunnen Kn. Weinberg!! Zieglerberg Kn. Rft. Brunnen; an ber Chausse nach Trampe Bch.

#### \* Melissa L.

\* M. officinalis L. Stammt aus Gub-Europa. Zuweilen in Barten.

#### † Hyssópus L.

† H. officinalis'L. Zierpflanze aus Sübbeutschland; bier und ba verwilbert. Br. Kirchhof zu Rostow Hechel! B. Kreuzberg W. M.!

#### 283. Népeta L.

613. N. Catária L. Dorfftraßen, an Zäunen, zerstreut. Bielsleicht ursprünglich nicht einheimisch. B. Bei ber Bildparkstation W.M. Sp. Ruhleben; Tegel D. Na. Königshorst am Mangelsborfter Damm H.S.! Lw. Ret. Gottow!! B. Lichtenberger Kiet W.M.! Beißenses D. Seegericher Holzplat Bl. am Zellengefängniß!! Schöneberg!! Steglit D. Buschtrug W.M.! Fw. Alaunwert; Broigsborf Rn. Nft.; Sommerselbe Beh.

#### 284. Glechóma L.

614. G. hederacea L. Trodne Balber, Gebuiche, Begranber, gemein. Rothblübend B. 3m Thiergarten jenseit bes Golbfischteiches Bl. nuweit bes alten Charlottenburger Chaussehauses!!

#### 285. Melittis L.

615. M. Melissophyllum L. Laubwälber, fehr felten. Ru Strausberg: Im Blumenthal an ber Chanffee von Berneuchen nad Propel R.

#### 286. Lámium L.

616. L. amplexicaule L. Meder und Gartenland, hanfig.

617. L. purpureum L. Wie voriges, gemein.

618. L. album L. Dorfftragen, an Baunen, gemein.

619. L. maculatum L. erweitert. An Gräben, in feuchten Gebilschen, im westlichen Gebiet sehr zerstreut, in der Obergegend nicht selten. (Na. Nahe der Grenze des Gebiets dei Möthlow am Wege nach Liepel!) Lw. Elsthal Rt.! Trebbin: Burgwall Gr. K. under Löffelbrücke diesseit Französisch-Bucholz!! Buch Jahn. K. Tasdorf Thiele! Wr. Dichnit dei Möglin Kn. Hw. Bruttuten Kn. Belvedereberg!! Papiermühle; Köthen Kn. Nst. Messingwerk; Weidendamm; Kniebusch Beh. nach dem Eichwerder hin!! Karlswerk H.

#### 287. Galeóbdolon Huds.

620. G. luteum Huds. Schattige Lanbwälber, zerstreut. P. Sanssouci Bs.! Or. Schlofigarten Rn. Na. Briefelang!! Stadtforst Gr. Hajanerie bei Königshorst H. S.!! Kremmen: Linum H. L. Eibruch norböstlich der Kenneberge Rt.! B. Friedrichsselber Part!! Französisch - Buchholz im Schlofigärten Schp. Schönhauser Part D. Alt-Landsberg Gae. Bucow: Elpsium!! Fw. Brunnen Rn. Zieglerberg!! Schlofiberg Rn.! Schlofigrund!! Köthen Bl. M. Welsingwert; Sigenspalterei H. Brunnen!! Zainhammer!! Sichwerber!! Biesenbal: Lanke Schl.

#### 288. Galeopsis L.

621. G. Ladanum L. Mur

a) latifolia Hoffm. Aeder mit sandigem Lehmboben, zerstreut. P. Hahrland Bs. Zehlendors!! Teltow Schl. Trebbin: Schulzendors!! B. Destlich von Schungendorf W. M. am füblichen Bege zwischen Wilmersdorf und Schöneberg!! Tempelhei D. Bernan Schl. Zossen: Kummersdors!! Sperenberg!! M. Beim Holländer Beh. Sommerfelbe Beh.!

622. G. Tetrahit L. ex p. Meder, Gebiiche, Balbichläge,

häufig.

b) bifida v. Boenninghausen. Wie bie hauptart, zerstrent. Sp. Pichelsberg am Teufelsgraben!! B. Thiergarten Thiele! nordlich vom Buichtrug A. Br. !: an ber Chausse nach Treptow!! K.

Bei ber Boltersborfer Schleuse A. Br.!! Mft. Beibenbamm; Bain-

hammer Beh. Chorin A. Br. Biefenthal: Lante A. Br.!

623. G. versicolor Curt. Etwas feuchte Meder, Balbranber, an Baunen, gerftreut. B. 3wijden bem Friedrichefelber Bart und ben Ruchsbergen W. M.! Seegericher Bolgplat; Cooneberger Buid Bl. Meder öftlich vom botanischen Garten!! zwischen Rirborf und bem Buidfrug!!

624. G. pubescens Bess. Dorfftragen, Begranber, Balbidlage im westlichen Bebiet fehlenb, im mittleren gerftreut, im oftlichen bäufig. B. Thiergarten!! Alt-Landsberg Gae. Budow: Bollersborf Walter. Br. Möglin; Buchnit In. Sarnetopf Thiele! fim. Alt-Riet!! am Afazienberg!! Sammerthal; Kischerthal Rn. Mft.!! Commerfelbe!! Tornow!! Soben-Finow Walter; Rogafer Muble!!

Chorin auf bem Amtsbofe !!

#### 289. Stachys L.

625. S. germanica L. Connige Bugel, Begranber, febr P. An ber Chauffee jenfeit Reu-Geltow einzeln Schp.! Fm. Babengrund Rn. beim Maunwert!! Colofibera!! Mft. Rarlemerf !!

626. S. silvatica L. Schattige Laubwalber, an Baunen, nicht jelten. B. Cansfouci; Charlottenhof; Reuer Garten Bs. Ra. Briefelang!! Stadtforft!! Lindholg!! Fajanerie bei Ronigsborft H. S. . 2m. Elethal!! B. Frangofiich-Buchbolg Kr. Thiergarten bieffeit bes alten Chauffeebaufes!! Branbenburger Rommunifation Bl. an ber Chauffee bieffeit Rubow W. M.! R. Tasborf Thiele! Blumenthal D. Fm. Brunnen; Sammerthal Rn. Schlofiberg!! Rft. Brunnen Beh.

627. S. palustris L. Gräben, Sümpfe, Ufer, häufig. 628. S. arvensis L. Lehmäder, jesten. Or. Marwit hinter bem Kruge Kr. Ra. Königshorft: Beders Rachtfoppel H. S.! Meder am westlichen Enbe bes Rurfürstenbammes R. Stortow: Reichenwalde Buek!

629. S. annua L. Garten und Meder, nur in ber Dbergegenb. Br. Bablower Dlüble Thiele! Detborfer Berge; an ber Buchnit bei Möglin Rn. Fw. Alt-Tornow; Alt-Riet Rn.! Biefentbal:

Sphow: Grünthal Bch.

630. S. recta L. Connige Sugel, meift nur D, gerftreut. Br. Eistutenberg bei Gr. Rreut Schr. Regur Gr. B. Rninenberg W. M! Baumgartenbriid beim Beinberg!! an ber Rorbfeite bes Glindower Cees!! Gb. Schilbborn A. Br.!! Ra. Möthlower Bein-I. Buchholg, wo ber Weg nach Galgbrunn fich von ber Chauffee trennt P. B. Jungfernheibe bieffeit bes Blotenfee Schp. westlich von Wilmersborf Bl. Schmargentorf; Sasenheite D.

Kranichsberge bei Woltersborf Bl. Rübersborfer Kaltberge!! Alte Landsberg Gae. Zoffen: Sperenberger Gipsberge!! Budow: Prishagen Rn. ! Wr. Mehdorfer Berge Rn. beim Landhof Sch. ! Alte Gaul Rn. Kw. Weinberg Rn. Solosberg Rn. Haltenberg Bl. Vroigsborf Rn. Nft. Warbecks Mühle; Eichwerder Bch. Karlswerl H. Biesenthal: Zwijchen der Hellmühle und Lanke A. Br.

#### 290. Betónica L.

631. B. officinalis L. Trodne Balber, Biefen, Higel, zerstreut. Sp. Papenberge; Tegel D. Or.; Zerpenschleuse Kr. Na. Briefelang!! beim Bredower Forsthause!! Lindholz an der Eisenbahn!! Jahnberge!! Beelit: Eisholz Krumbholz. T. Niebelhorst im Seggebusch P. Trebbin: Schulzendorf; Neuendorf Gr.! B. Im silbistlichen Theile der Jungsernheide!! nörblich am zoologischen Garten W. M.!! K. Wilhelminenhof H. Rübersdorfer Kaltberge D. Altbandsberg Gae. Wr. An der Büchnit bei Möglin Walter! R. Eichwerder Beh.! Mönchsbrücke Beh.

#### 291. Marrúbium L.

632. M. vulgare L. Dorfftragen, mufte Plage, nicht felten, 3. B. Ew. Bei Lindhorft!! Trebbin: Schulgenborf!! B. Schöneberg!! R. Zwijchen Erfner und Boltersborf!! Rft.; Sommerfelbe Bch.

#### 292. Ballóta L.

633. B. nigra L. Wie voriges, gemein.

#### 293. Leonúrus L.

634. L. Cardiaca L. Wie bie vorigen, häufig.

#### 294. Chaetúrus Willd.

635. C. Marrubiastrum (L) Rohb. An Zäunen, Triften, sehr seiten. B. Bornstebt nach 1847 Bs. Ob noch jett? Marquart Schl. (Rft. Nahe ber norböstlichen Grenze bes Gebiets bei Liepe Rn !)

#### 295. Scutellária L.

636. S. galericulata L. An Sumpfen, Graben, nicht felten, z. B. P. Zehlenborf bei ber haltestelle!! Kremmen: Rhinluch H.! Lw. Frankenfelbe Rt.! B. Wiesen zwischen ber Stadtmauer und Borhagen; Lichtenberg J. Weißensee bei ber Dranke!! Wilmersborf Rei. Schöneberg Thiele! Thiergarten!! Rft. Weibenbamm; Leuenberger Wiesen Bch.

637. S. hastifolia L. Biefen, an Graben, nur M, febr ger-

streut. Br. Weseram süblich vom Dorfe Schr.!! Pewesin an ber Ras nalbriide Schr. B. Audower Wiesen einzeln Jahn!! Fw. Am Maungraben Rn. (nabe ber Grenze am Kanal bei Reu-Gaul Sch.!)

#### 296. Prunella L.

638. P. vulgaris L. ex p. Balber, trodne Wiesen, häusig. 639. P. grandiflora (L.) Jacq. Sonnige Higel, trodne Biesen, Begränder, zerstreut. Br. Eiskutenberg bei Gr. Kreut Hechel! Bewesin Sp. Ra. Am Chaussegraben nach Bustermark hin Gr. Kremmen: Rhinluch H. Trebbin: Zwischen Schulzenborf und Ehristinenborf Gr.! B. Rubower Biesen!! K. Rübersborfer Kalkberge!! Stortow: Stansborf H. Br. Metydorfer Berge Thiele! Brietener Berge Sch.! Rft. Karlswerk Bch.

## 297. Ájuga L.

640. A. roptans L. Laubwälber, trodne Wiesen, zerstrent. B. Sanssouci-Park beim Neuen Palais!! Sp. Tegel D. Na. An ber Straße von Brieselang nach Perwenity!! Dechtow H. S.! Kremmen: Tietzow N.! Lw. Westlich von Gottow Rt.! B. Bei ben Huchsbergen Rei. Friedrichzselber!! und Schönhauser Park!! Jungsfernheibe D. Thiergarten!! Horsthaus Ober-Nigborf am Wege nach Rigborf!! R. Boltersborfer Schleuse!! bei ben Rübersborfer Kalkbergen Schl. Alt-Landsberg Gae. Müncheberg: heibekrug!! Bucow: Einstum!! Rf. Zainhammer!!

641. A. pyramidalis L. Trodne, besonbers Laubholzwälsber, im westlichen Gebiet zerstreut, im übrigen Theise besselben fehslend. P. Zwischen Neuendorf und Drewitz R.! Dr. Zwischen Kreuzsbruch und Zerpenschleuse im Kiefernwalde Rn.! Na. Lindholz, besonders an der Eisenbahn!! Wald westlich vom Sandkruge!! (hier zus

erft in ber Mart von Walter entbedt).

642. A. genevensis L. Trocine Wälber, Wegränder, Hügel, häufig, 3. B. Pirscheibe Schp. (hier an einer Stelle weißblühenb Bs.) Tornow; Brauhausberg Bs. Sp. Grunewald!! auch mit rotter!! und weißer Blüthe Thiele! Na. Westrand bes Lindholges H. S.! B. Diesseit Französisch Buchholg!! Jungsernheibe!! Spanduer Berg; Schöneberg Bl. süblich von Tempelhos!! Sprecheibe!! K. Friedrichsbagen, auch rothblühend!! Fw. Paschenberg!! Pst. Beim Brunnen (auch rothblühend) Bch.

#### 298. Teúcrium L.

643. T. Scorodonia L. Trodne Laubwälber, felten. B.

Sanssouci unter ben Gichen Schp.! B. Thiergarten unweit bes gro-

fen Sterns!!

644. T. Scordium L. Graben, feuchte Biefen, Ufer, befonbers M. gerftreut. B. Ruthewiesen, fparfam Be. Gp. Bichelsberg; Bapenberge; Tegel D. Dr. Um Ranal Rn.! Sobenbruch Bl. Biefen norblich bes Brebower Forfthaufes!! zwischen bemfelben und Beeftow!! Dammgraben bes großen havellanbischen Luche an mehreren Stellen, g. B. am Gubmeftranbe bes Lindholges amifchen Baulinenau und bem Gelbelanger Jagerhaufe!! amifchen Ronigsborft und Lobeoffund H. S.! zwischen Ronigsborft und Seelenborft H. Rremmen: Linum am ichwarzen Damm H.! Beelig: Elsholz Krumbholz. Trebbin: Schulgendorf Gr.! B. Wiesen amijden ber Stadtmauer und Borhagen J.! zwischen Rummelsburg und bem Begemeifter!! Chauffeegraben füblich von Reinidendorf!! Jungfernheibe; Charlottenburg D. beim Spandauer Bod O. Jaenicke; an ber Brudenallee nördlich von Liebo's Garten!! filblich vom zoologischen Garten Bl. Sanptgraben öftlich ber Berlin - Botsbamer Gifenbahn W. M. !! bei Dber = Rirborf W. M.!! Treptow D. Alt = Landsberg Gae. Boffen: Sperenberg am See!! Frw. Wiesen bei Alt-Riet Rn.

## 65. Familie. Verbenaceae Juss.

#### 299. Verbéna L.

645. V. officinalis L. Dorfftraßen, Zänne, Schutt, häufig, z. B. B. Bornstebt; Bornim Bs. Na. Bei ber Errsebenschen Meierei H. S.! B. Chaussee vor bem Prenzsauer Thor!! Schöneberg!! Rft. Sommerfelbe Bch.

# 66. Familie. Lentibulariaceae Rich. 300. Pinguícula Tourn.

646. P. vulgaris L. Auf moorigen, nicht zu feuchten Wiesen, zerstreut. P. Gr. Glienicke Vocke; Wiesen jenseit des Neuen Palais Bs.! Nuthewiesen; Bergholz Bs. Dr. Wiesen süblich von Germendorf Rn.! Na. Wiesen westlich von Brieselang H.S. Kremmen: Linum H.! Lw. Frankenselbe Rt.! B. Wiesen nördlich! und süblich von den Fuchsbergen Rei.! östlich und nordöstlich von Französisch-Buchholz!! Jungsernheide D. Wilmerdorf Thiese! zwischen Steglig und Lichterfelde Bl. Audower Wiesen!! Alt-Landsberg Gae. Nft. Bei der Rogäser Schleuse Bch. Britzer Torstiich Bch.!

#### 301. Utriculária L.

647. U. vulgaris L. Gräben in Moorwiesen, Torsstiche, Sümpse, nicht selten. B. Beim Neuen Palais Bs. am Habeluser jenseit ber Langen Brücke Bl. Kl. Machenow Schl. Sp. Grunewald; Tegel D. Na. Königshorst H. S. Trebbin: Schulzenborf Gr.! B. Stralau; Friedrichsselbe D. Jungsernheide!! beim Spandauer Bod am Bege nach Pickelsberg!! Bilmersborf D. Rubower Wiesen!! K. Tasborf D. Alte-Landsberg Gae. Stortow: Scaby-Luch H.! Mst. Bei der Rogäser Schleuse; beim großen See Bch.

648. U. noglecta Lehm. Wie vorige, fehr felten, aber wohl mehrfach überfehen. B. Bor ber Jungfernheibe beim Plogenfee 1834

Dr. Weber! in neuerer Beit noch nicht wieder gefunden.

649. U. intermedia Hayne. Torffümpfe, selten. Sp. Te-

gel D. B. Sublich ber Jungfernheibe beim Plögensee!!
650. U. minor L. Wie vorige, sehr gerftreut. B. Beim Templin Rs. Al Machenom Schl. Sp. 3mifden bem Grunemalb

Templin Bs. Al. Machenow Schl. Sp. Zwischen bem Grunewalb und hundetehlensee!! Teuselssenn im Grünewald A. Br. Kapenberge Kih. B. Jungsernheibe Baetke! K. Tasborf D. Storkow: Scaby-Luch beim östlichen Kanal H.! Rft. Bei ber Babeanstalt Bch.!

## 67. Familie. Primulaceae Vent.

#### 302. Trientális L.

651. T. europaea L. Schattige Bälber, sehr zerstreut. Sp. Schulzendorf bei Tegel Jablonsky. Or. Zwischen Kreuzbruch, Liebenwalbe und Zerpenschleuse Ra.! bei Zerpenschleuse westlich der Chaussee Kr.! Ra. Brieselang Gr.! Rft. Sommerselber Beide Beh.!

#### 303. Lysimáchia L.

652. L. thyrsiflora L. Torffümpfe, Ufer, Gräben, zerstreut. B. Beim Neuen Palais; Ruthewiesen Bs. Sp. Havelufer bei Pischelsberg!! Teufelssenn!! bei ber Hundekehle!! Papenberge Thiele! Tegel D. Na. Gr. Bähnig am See Gr. Lw. Tiefes Gehege Rt. Trebbin: Neuendorf; Biesen in der Scharsenbrilder Forst Gr.! B. Am Spreeuser diesseit Stralau!! Rummelsburg; Friedrichsselbe D. Jungfernheide zwischen Plötzensee und Pfefferluch!! am Plötzensee!! Bitzleben; Schöneberger Fenn Bl. Tempelhof bei der Kirche Rei. Ritzleband am Dorfpsuhl W. M. K. Tasborf D. Alt-Landsberg Gae. Rft. Zainhammer; am Kanal; zwischen dem kleinen und großen See Beh.

† L. ciliata L. Zierpflanze aus Nordamerita, verwilben B. Charlottenburger Schlofigarten am Teich Bl.

653. L. vulgaris L. Feuchte Gebuiche, Graben, Biefen, baufia.

654. L. Nummularia L. Feuchte Biefen, an Gruben, Sumpfranber, gemein.

#### 304. Anagallis L.

655. A. arvensis L.

a) phoenicea Lmk. (als Art). Aeder, Gartenland, Begränber, häufig. Mit fleischrother Blüthe Lw. An ber Ruthe am Steige nach Kolzenburg Rt.!! mit violetter Blüthe Trebbin: Schulzenborf Gr.!

b) coerulea Schreb. Lehmäcker, selten und wohl nur eingeschleppt. Sp. D. Liebenwalbe R. Na. Königshorft: Beders

Rachttoppel H. S.!

#### 305. Centúnculus L.

656. C. minimus L. Feuchte, sandige Stellen, an Pfühlen, seuchte Aecker, zerstreut. B. Wildpark vor dem baierischen Häuschen Schp.! Sp. Grunewald D. Dr. Wiesen süblich von Germendors Rn.! Na. Bestlich von Falkenhagen D. Kremmen: Nach Dorostheenhof hin Jahn! T. Berghorst P. Lw. Gänseplan bei Schweibe!! B. Weißensee auf Aeckern beim Chausseehause und feucht Sandstellen nörblich vom Wege nach Heinersborf!! Lantwiß!! Zosen: Zwischen Kummersborf und Sperenberg!!

#### 306. Primula L.

657. P. officinalis (L.) Jacq. Sonnige Hügel, Graspläte, Lanbwälder, zerstreut. Br. Pewesin am Lötztanal Schr. P. Lindstebt beim Gut Bs.! Pfauen-Insel beim Büsselaug! Bredower rei Bl. Sp. Papenberge; Tegel D. Na. Brieselaug!! Bredower Forst!! Stadtsorst Gr. Markee H. Lindholz!! Dechtow H. S.! Kremmen: Rhinsuch H.! Trebbin: Scharsenbrücker Forst Gr.! B. An den Kuchsbergen einzeln!! Französisch Buchholz; Schönhausen D. Junsernheide Kth. Dahlem D. Schöneberg hinter dem Pfarrgartals Schp.! Tempelhof an der blanken Hölle!! A. Rüdersdorser Kallberge!! Alt-Landsberg Gae. Blumberg Kr. Buckow: Elpsium!! bei der Pritzhagener Mihle!! Br. Methorser Berge; Büchnit bei Möglin; lupsall bei Schulzendorf Kn. Fw. Kn. Rst. Eichwerder!! Higel am Korstrande beim Kirchhos!!

#### 307. Hottónia Boerh.

658. H. palustris L. Gräben, Silmpfe, nicht selten, 3. B. Beim Reuen Palais!! Tornow; Nuthewiesen Bs. Teltow W. M. Sp. Am Wege nach Rieber-Reuendors!! Tegel D. Ra. Halfenhagen D. Hinkentrug!! Königshorst H. S. Ew. Tiefes Gehege; Frankenfelbe; Felgentreu Rt. B. Stralau D. bei den Huchsbergen Lichtenberg J.! Französisch-Buchbolz D. Jungfernheibe Rei. bei der Lichtenfein-Brüde!! am Schöneberger Busch Bl. beim Forsthause Ober-Ripbors!! Alt-Landsberg Gae. Nft. Zainhammer; Drehnitz Beh.

#### 308. Sámolus Tourn.

659. S. Valerandi L. An und in Gräben, Bertiefungen auf Biesen, an Ufern, besonders auf Salzboden, nur im westlichen Gebiet zerstreut, sonst sehlend. Br. Ketzür; Pewesin im Lögbruch; Bagow am Seeuser Schr. P. Uetz westlich vom Dorfe Schp.! Nuthewiesen bei Nowawes Weiland! Bs.! Na. Bredow Gr. am Sidbwestrande bes Lindholzes bei Paulinenau!! nörblich von Nangelsborft H. S.!! zwischen Königshorst und Mangelshorst H. Trebbin: Um Steige nach Schulzendorf Gr.!

#### 309. Glaux Tourn.

660. G. maritima L. Salzhaltige Triften, Wegränber auf Salzboben, nur im westlichen Gebiet, sehr zerstreut. Br. Pewesin am Lötzland! Schr. P. Wiesen hinter bem Neuen Palais Bs.! Uch Weiland! Körnicke! Na. Am Wege zwischen bem Bredower Forst bause und Zeestow Schr.!! am Damm nach Dreibridken in ber Nähe bes Nauener Weinberges H.! beim Selbesanger Jägerhause!! nördslich und süblich von Mangelshorst H. S.!! zwischen Lobeossund und ben Jahnbergen H. S.!

## 68. Familie. Plumbaginaceae Juss.

661. A. elongata (Hoffm.) Boissier. Trodne Balber, Gras-

\* A. maritima (Mill.) Willd. Un ber Rorbfufte Deutschlanbs wilb, nicht felten in Garten ju Ginfaffungen gepflangt.

Afcherfen, Fiera. 2. Abthl.

## 69. Familie. Plantaginaceae Juss.

#### 311. Litorella L.

662. L. lacustris L. Schlammige und sandige Ufer von Seen und Pfühlen, sehr zerstreut. B. An der Südseite des Glindower Sees Schr. Br. Weißensee; Lantwitz D. südwestlich von Tempelhof!! A. Wernsborfer See Jahn!

#### 312. Plantágo L.

663. P. major L. Begranber, Triften, häufig.

b) minima D. C. (als Art). Feuchte Triften, Sumpfranber, gerftreut. Br. Saringen Schr. B. Lichtenberg am nörbl. Enbe J.!
664. P. media L. Biefen, Balbranber, nicht felten.

665. P. lanceolata L. Begränder, Biesen, Triften, gemein.
b) eriophylla Decaisne. Bie bie Hauptart, selten. Bie-

fenthal: Um Bege nach Lante A. Br.!

666. P. maritima L. Salghaltige Triften, felten. Ra. Beim Selbelanger Zägerhaufe Körnicke!

667. P. ramosa (Gil.) Aschs. Sanbselber, Wegränder, nicht selten. B. hinter dem Kirchhose Ret.! Babelsberg Bs. am östlichen Ende des Schlachtenses!! Sp. D. Dr. Sandhausen Rn.! Schmacktenhagen Gae.! Beelitz: Salzbrunn P. Lw. Beim Bahnhos!! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Bei den Fuchsbergen!! Weißensee D. auf dem Exercirplat vor dem Schönhauser Thor!! Schönholz!! dem Webding!! westlich von Eharlottendurg!! Schöneberg!! süblich von Rirdorf an der Chaussee!! K. D. am Flakensee süblich von Wirdorf!! Strausberg: Beim Forsthause Schlag Gae. Zossen: Kummersdorf!! Sw. Am Alazienberg!! Mft. Unterhalb des Schanzenberges; Bernauer Straße Bch.

#### 70. Familie. Amarantaceae Juss.

#### 313. Albérsia Kth.

668. A. Blitum (L.) Kth. Strafen ber Dörfer und Stabte, an Rinnsteinen, Gartenland, gemein.

#### 314. Amarantus L.

669. A. retroflexus L. Aeder, Begranber, gerftreut. B. Bornftebt; Bornim Bs. Pfauen-Insel Beh. Beelit: Bittbrieten Rt.! Trebbin: Schulgenborf Gr.! B. Friedrichsfelde!! Beigenfee!! Reinidenborfer Straße!! Charlottenburg an der Bestieite!! Schöneberg sehr häusig!! Steglith!! jenseit Rixdorf!! beim Buschtrug! A. Rüsdersborfer Kaltberge Jahn! Alt-Landsberg Gae. Br. Schulzenborf Rn. Rs. Sommerfelbe; Lichterfelber Straße Beh.!

† A. cruentus L. Zierpstanze aus China, zuweilen auf Schutt, an Zäunen u. s. w. verwilbert, boch meist nicht beständig. Lw. Beim Kirchhof Re.! B. Unweit bes humbolbt-hafens 1855!! Di-

voli W. M.!

\* A. caudatus L. Zierpflanze aus Amerita.

### 315. Polycnémum L.

670. P. arvense L. Aeder mit sandigem Lehmboben, meist D, zerstrent. B. Diesseit Redlit Schp.! Zehlendors!! Sp. Bichelswerder D. Lw. Zinnaer Vorstadt; Dobbrisow Rt.! Trebbin: Zwischen Christinendorf und Gadsborf Gr. B. Pantow D. an der Jungsternheide A. Br.! westlich von Charlottenburg Schl.! Schmargendorf. Zochp.! zwischen Wilmersdorf und Schöneberg Thiele! Steglity D. beim Eingange des Einschnitts der Anbaltischen Eisenbahn W. M. Tempelhos!! bei der Haselbeite; Rollberge D. Budow: Prithagen Jahn! Br. Mögliner Acker nach Aunersdorf hin Rn. Alt. Beim Bahnhof; Aupserhammer Bch.! Biesenthal: Lanke A. Br!

# 71. Familie. Chenopodiaceae Vent.

### 316. Sálsola L.

671. S. Kali L. Sanbfelber, Wegränder, Feldraine, nm B. häusig, sonst selten. B. Um Wildparkzaun Bs. Na. An der Eisenbahn bei der Bredower Meierei!! (jedensalls nur verschleppt). B. An der Chausser nach Borhagen!! Aderraine zwischen der Landsberger und Weißenser Chausse die dur Dranke!! Rommunikation zwischen dem Landsberger u. Königsthor J.! Wedding!! am Hamburger Bahnhof!! westlich von Charsottenburg!! am westlichen Ende der Liegower Wegstraße W. M.! zw. dem botanischen Garten u. dem Kreuzberg Schp. beim Anhaltischen Bahnhof!! Hasenbied!! an der Chaussee diesseit und jenseit Riedors!! Zw. K. u. Friedrichshagen Gr.! Budow Sch.

### 317. Salicórnia Tourn.

672. S. herbacea L. Auf kahlem Salzboben, sehr selten. Ra. Beim Selbelanger Jägerhause sparsam!!

### 318. Chenopódium Tourn.

673. C. hybridum L. Dorfftragen, häufig.

674. C. urbicum L. Dorfftragen, zerftreut. Sp. heiligensfee Kth. Da. Bessin Hertzsch. Lw. Schöneweibe!! Trebbin: Schulzenborf!! B. Bantow Kth. Schöneberg!! R. Tasborf Kth.

675. C. murale L. Dorfftragen, an Baunen, Wegranbern,

nicht felten.

† C. opulifolium Schrad. Schuttftellen. B. Beim botanifchen Garten, wohl nur verwilbert Kornicke.

676. C. album L. Dorfftragen, Begränber, Meder, gemein.

677. C. ficifolium Sm. Feuchte Aeder, besonders unter Kartoffeln, sehr selten, aber wohl mehrsach übersehen. B. Aeder nördlich vom botanischen Garten A. Br.!! bis zum zoologischen Garten
Winkler.

678. C. glaucum L. Dorfftraßen, Begränber, Salzboben, nicht selten, z. B. Br. Saringen Schr. B. Uet Radecke! Sp. W. M. Na. Zwijchen bem Brebower Forschause und Zeestow!! beim Nauener Beinberge!! beim Selbelanger Jägerhause!! Königshorst H. S. B. Reinidenbors!! westlich von ber Potsbamerstraße!! Schöneberg!! Tempelhof Rei. Mt-Landsberg Gae.

679. C. rubrum L. Dorfftragen, Aeder, an Graben, baufig.

680. C. Bonus Henricus L. Dorfftragen, nicht felten, 3. B. Br. Lünow Schr. B. Bornftebt Schp. Ra. Fintentrug!! Möthlow!! Lw. Felgentreu!! Trebbin: Schulzenborf!! B. Schmargenborf!! Bilmersborf Thiele! Schöneberg Schp. Budow: Bollersborf Walter!

Mft. Commerfelbe Bch. Betelberg Bl.

681. C. polyspermum L. Lehmäder, Gartenland, Wegränber, zerstreut. P. Landes-Baumschule Schp.! Sp.; Tegel D. Kremmen: Tietow N. Beelitz: Wittbrietzen Rn.! B. An der Wiese vor dem Franksuter Thor J.! Charlottenburg Rn.! bei der v. d. Hopdt-Brilde 1858 W. M.! Schöneberg R.! Tempelhof Tietz! K. Tasborf Kr. Alt-Landsberg Gae. Fw. Weinberg Rn.! Alaunwerk Rn. Mt. Gartengassen; Wegränder in der Forst westlich der Choriner Chansse Bch.!!

682. C. Vulvaria L. Straßen ber Börfer und Stäbte, stele lenweise häufig, z. B. B. Werber!! Ra. Bessin Rt.! Ew. Rt. Gottow!! B. Viel in ber Burgstraße!! Stallstraße!! Lustgarten!! Leipziger Plat Bt. Weißensee!! Französisch-Buchholz!! Pankow!! Charlot-

tenburg Schp. Schoneberg !! Tempelhof W. M.!

### + Blitum Tourn.

† B. virgatum L. In Gub. Europa einheimisch; hier nur selten fultivirt und hier und ba auf Schutt u. f. w. verwilbert, boch unbeständig.

### \* Beta Tourn.

\* B vulgaris L. 3m Gebiet bier und ba gnm Biebfutter gebaut; nabe ber öftlichen Grenze im Oberbruch febr viel für bie bortigen Buderfabriten fultivirt.

### \* Spinácia Tourn.

\* S. oleracea L. In Gemijegarten überall gebaut.

# 319. Atriplex Tourn.

† A. hortonse L. hier nur selten gebaut; zuweisen auf Aet-tern, an Wegrändern zahlreich verwildert. B. Bornim Schp. Em. Am Bege nach Gottow!! Trebbin: Schulgenborf am Bege nach bem Bahnhof!! B. Schöneberg W. M.!

683. A. nitens Schk. Begründer, nur in ber Obergegenb, febr gerftreut. Fm. Alt-Riet Rn. Mlaunmert Rn.!! Rieber-Finom Rn.

684. A. patulum L. Wegrander, Aderraine, gemein.
685. A. hastatum L. Wie vorige, nicht selten.
b) salinum Wallr. Triften, Begrander, auf Salzboben, sehr zerftrent. Na. Nordwestlich vom Beinberg!!

686. A. roseum L. Dorfftraßen, zerstreut. Sp. D. Beelig: Eisholz Krumbholz. B. Malchow Körnicke!! Schöneberg!! . Alt-Landsberg Gae. Zoffen: Kummersborf!! Rst. Sommerselbe!! Tornom!! Rieber - Kinow Kornicke!

# 72. Familie. Polygonaceae Juss.

### 320. Rumex L.

687. R. maritimus L. Sumpfranber, Ufer, nicht felten. Gp. D. Na. Beim Forsthause Brieselang!! beim Linbolz H. S. Jahn-berge H. S.! Kremmen: Linum H. Lw. Tiefes Gehege Rt. B. Weißensee!! Jungfernheibe Kth. Steglit Schl. am Schöneberger Fenn Bl. Tempelhos!! K. Tasborf D. Alt-Landsberg Gae. Mft. Am Ranal; Bornemannspfuhl Beh.

b) paluster Sm. (als Art). Wie bie hauptart, im Gangen häufiger. B. An ber havel, Berber gegenüber Körnicke! Ruthewiesen Bs.! Sp. Pichelsberg!! Na. Am Damm nach bem Beinberg Schr.! B. An ber Spree vor bem Stralauer Thor!! Lichtenberg J. Beißensee!! an ber Panke unterhalb Pankow!! am Kanal beim Plötensee W. M.! Wilmersdorf Thiele! nordwestlich bon Schöneberg W. M.! Mft. Am Ranal; Bornemannspfuhl Beh.

688. R. conglomeratus Murr. Feuchte Gebüsche, kaubwälber, nicht selten, z. B. Sp. Pichelsberg Schl.! B. Friedrichsfelbe!! Jungsernheibe D. Thiergarten!! am Hauptgraben nordwestlich von Schöneberg W. M.! Treptow D. Mft. Brunnenthal; an ber Schwärze Bch.

689. R. obtusifolius L. Wie voriger, baufig.

690. R. crispus L. Feuchte Wiesen, an Graben, häufig.

691. R. Hydrolapathum Huds. An Ufern, Graben, nicht selten, 3. B. P. An ber havel beim Tornow!! Sp. Bichelsberg Bl. Papenberge Kth. Tegel D. Trebbin: Schulzenborf Gr.! B. An ber Spree biesseit Stralau!! am Markgrasenbamm W. M.! Friedricks selbe; Charlottenburg D. Wilmersborf Thiele! am hauptgraben nördlich von Schöneberg W. M.! am Kanal vor bem Anhaltischen Ther W. M.! jenseit bes Buschtruges!! Treptow D. R. Tasborf D. M. Gräben ber Finowwiesen Beh.

692. R. heterophyllus Schultz. In Bachen, Graben, fel-

n. Mft. Weibenbamm Beh. Rogafer Mühle Beh.!!

693. R. sanguineus L. Feuchte Gebüsche, zerstreut, wohl vielfach übersehen. B. Thiergarten beim Forsthause W. M.! Treptower Park Bauer!

694. R. pratensis M. u. K. Biefen, Graben, felten, aber wohl mehrfach übersehen. B. Süblich am zoologischen Garten Schl.!

695. R. aquatious L. An Bachen, Quellen, Graben, felten. Mft. Bei ben Leuenberger Wiesen Beh.! am Kanal Beh. bei ber Roggier Mühle Beh.!! an ber Schwärze; am Beibenbamm Beh.!

696. R. Acetosa L. Biefen, gemein.

697. R. Acetosella L. Bruchader, trodner Balbboben, bis gel, gemein.

### 321. Polýgonum L.

698, P. Bistorta L. Fruchtbare Wiesen, seuchte Walbstellen, zerstreut. P. Tornow; Ruthewiesen Bs. Na. Beim Bredower Forst-hause!! auf Wiesen nach herteselb hin Gr.! Ew. Zw. Frankenselbe u. Frankensiebe Rt. B. Friedrichsselbe; Biesborf D. beim Buschtrug!! R. Tasborf Thiele! Alt-Landsberg Gae. Bucow: Bei der Eichendorfer Mible Sch.! Wr. Bahlow Sch. Nft. z. B. beim Eichwerder!!

+ P. orientale L. Bierpflanze aus Inbien. Buweilen auf

Soutt verwilbert.

699. P. amphibium L.

a) natan's Mnch. In Geen, Graben, haufig.

b) terrestre Leers. An Ufern, Graben, nicht felten. 700. P. lapathifolium L. Feuchte Stellen, Wegrander, Dorfftragen, nicht felten.

701. P. nodosum Pers. Bie voriges, gemein, 702. P. Persicaria L. Bie voriges, baufig.

703. P. Hydropiper L. Graben, an Sumpfen, Dorfftragen, baufia.

704. P. minus Huds. An Sümpfen, Ufern, Gräben, zerstreut. B. Landes - Baumschule Schp.! Sp. An der Westseite des Grunewald - Sees!! Sümpfe bei der Hundeschle!! Ra. Bredower Forst!! Stadtsorst am Wege zwischen dem Vorwert Glien und dem Beinderg!! Kremmen: Beet N.! B. Lichtenberg J. Beißensee A. Bei Bellevue!! am sogenannten Poetensteig beim alten Charlottenburger Chausseehaus!! Schöneberger Busch Bl. Tempelhof am Dortpsuh!! Rft. An der Schwärze; Leuenberger Wiesen Bch. Chorin A. Br.

705. P. aviculare L. Strafen ber Dorfer und Stabte, Erif-

ten, Begränber, febr gemein.

706. P. Covolvulus L. Aeder, Begründer, Gebüsche, gemein. 707. P. dumetorum L. Gebüsche, heden, nicht setten. P. Sanssouci Schp. Sp. Pichelsberg; Tegel D. Na. Station Kinstentrug!! Bredower Forst!! Stadtsorst!! Königshorst an der Kasanerie H. S. B. Strasau; Friedrichsselbe D. Malchow!! Pankow D. Charstottenburger Schlößgarten!! Boetensteig!! an der Spree dei Bellewue!! Schneberg Bl. Treptow D. (Br. Malzmühle Sch.!) Fw. Afgienberg!! Nft. Beim alten Wassersall Bch.

702 x 704. P. Persicaria x minus. Unter ben Eltern

fparfam. B. Beigenfee A. Br.! Mft. Chorin A. Br.!

### + Fagopýrum Tourn.

† F. esculentum Mnch. Stammt aus Asien; im Gebiet nicht selten gebaut, auch hier und ba, selbst mitten in Balbern, auf hügeln, verwilbert, aber wohl nicht beständig, so B. Wilmersborf Bl. T. Forst bei Erkner!! am Kalkse!!

† F. tartáricum (L.) Gaertn. Als Unfraut unter vorigem, nicht häufig. Lw. Dobbritow Rt.! B. Charlottenburg Rn. Busch-

trug Schp.!

# Familie Thymelaeaceae Juss.

### \* Daphne L.

\* D. Mezereum L. 3m Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur als Bierftrauch.

# 73. Familie. Santalaceae R. Br.

### 322. Thesium L.

708. T. intermedium Schrad. Sonnige hügel, trodne Wälsber, zerstreut. Br. Am Fuß bes Eistutenberges bei Gr. Kreut Schr.! Ketür auf bem Werber Schr. P. Bei ber Dampsmihle Bs.! Baumgartenbriid nach Kaput hin Rach! Schp. Sp. Rach Falkenhagen hin Bl. Papenberge!! Na. Am Wege vom Finkenkrug nach Briese lang Sanio!! am Weinberg!! Jahnberge!! B. Huchsberge!! und am Ranbe ber Friedrichsselder heibe J.! K. Rübersborfer Kalkberge D.

T. alpinum L. Bie voriges, felten. (Ra. In ber Grenge

bes Gebiets am Möthlower Beinberg Zowe.)

709. T. obracteatum Hayne. Wie voriges, sehr zerstreut. Dr. Im Krämer bei Bötsow H. B. Fuchsberge!! Jungsernheide Kth.! Rollberge D. A. Rahnsborser heibe D. Rft. Beim Brunnen Bch.!!

# Familie Elaeagnaceae R. Br.

### \* Hippophaë L.

\* H. rhamnoides L. Bierftrauch, junachft an ber Offfee einbeimisch.

### \* Elaeagnus L.

\* E. argeintea Pursh. Bierstrauch aus Norbamerita.

\* E. hortensis M. B. Mur

a) angustifolia L. (als Art). Bierstrauch aus Gub-Europa.

# 74. Familie. Aristolochiaceae Juss.

### 323. Aristolóchia Tourn.

710. A. Clematitis L. An Zäunen, Aderrändern, zerstreut; im Gebiet wohl nicht ursprünglich einheimisch. P. Reuer Garten; Bertinistraße Bs. Pfingstberg W. M.! Teltow an der Westjeite Bl. Spr dem Charlottenburger Thor Rn.! Ra. Tremmen Schr. Kremmen: Linum H. Beelig Richter! Lw. Rt. B. Wilmersborf an der Rordseite Schp. K. Friedrichshagen Gr. Münchehofe R. Woltersborfer Schleufe W. M. Alte-Landsberg: Buchholz Gae.! Zossen Gr.! Sperenberg! Wr. M. Wiglin Rn. Rst. Drachentopf Bch.

### 324. Asarum Tourn.

711. A. europaeum L. Schattige Wälber, sehr zerstreut. P. Sanssouci bei ber kleinen Fontaine!! Charlottenhof Bs. Sp. Am öftlichen Ranbe bes Grunewalds Erickson. Na. Hahnberge Gr. Zosen: Kummersborfer Forst Gr.!

# 75. Familie. Euphorbiaceae Kl. u. Gke. 325. Tithymálus Scop.

712. T. helioscópius (L.) Scop. Dorfstraßen, Gartensand,

häufig.

† T. platyphyllus (L.) Scop. Im Gebiet nicht einheimisch, sondern nur als Gartenunkraut felten. Or. Rn.!

713. T. dulois Scop. Schattige Laubwälber, fehr felten. Rur B. Canssouci Weiland! Bs.!! zuerft von Willdenow entbedt. Die

Bflange erreicht hier ihre Nordgrenze.

714. T. paluster (L.) Kl. u. Gke. Wiesen, besonders an Ufern und Gräben, nur A, zerstreut, im nordwestlichen Gebiet häufig. Br. Siblich von Weseram!! B. Nörblich vom Wildpart!! Kuhsort: Golm Bs. Geltow Schp. Sp. Papenberge R. Schönwalde D. Ra. Finkentrug!! Forsthaus Brieselang!! westlich vom Brieselang!! Bredower Forsthaus!! im großen Havelländischen Luch sehr häusig, B. im Lindholz an der Eisenbahn!! am Danm zwischen dem Lindholz und Ribbedshors!!! Rubhorst N. Fw. An den Oberarmen Rn.! Rft. Kupserhammer; Marienbruch Beh.

715. T. Cyparissias (L.) Scop. Saubfelber, trodne Bal-

ber, Sügel, gemein.

716. T. Esüla (L.) Scop. Wegränder, Aderraine, besonders auf Lehmboden in D, zerstreut. B. Zehlendorf Bs. Lw. Nördlich in der Stadt Rt.! Trebbin: Zwijchen dem Bahuhof und Schulzensorf!! B. Friedrichshain J.!! Weißensee D. zwijchen Königsdamm und Charlottenburg!! zwischen Schmargendorf und Wilmersdorf! Steglit Schp. zwischen Schweberg und Tempelhof!! am Kanal zwischen der Kottbusser and Schesifichen Straße!! Wr. Lübersdorf Rn. Frv. Ruinenberg; Weinberg Rn. Afazienberg!! Nst. Au der Eisensach beim Kanal Beh. westlich von Hohen-Finow Beh!!

717. T. lucidus (W. K.) Kl. u. Gke. Un Graben, Ufern, ehr felten. Rur im Oberthale. Fw. Bei ber Babestelle R.!!

718. T. Peplus (L.) Gaertn. Gartenland, Dorfftragen, baufig.

T. falcatus (L.) Kl. u. Gko. Aderrander, sehr selten. Trefbin: Am Wege nach Thyrow 1813 von Fr. Otto gefunden; ob noch

jett?

719. T. exiguus (L.) Mnch. Lehmäder, sehr zerstreut. Br. Pewesin bei der Windmühle Schr. B. Baumgartenbrild nach Petsom hin Jahn! Schr. Ka. Königshorst: Beders Nachtsoppel H. S.! B. Auster nordöstlich der Orante 1858!! Bucow Radig. Br. Möglin Sch.! Schulzenbors Walter. Fw. Weinberg Rn.! Rst. Warbecks Milse; Eichwerder Bch. zwischen Tornow und Karlswerk!! Rieder-Finow Körnicke!

† T. Lathyris (L.) Scop. In Sübbeutschland einheimisch; früher als Arzneis und Zierpflanze angehflanzt; in Gärten und an Zäunen zuweilen verwilbert. P. Reuer Garten Bs.! Sanssouci: Kirschmauer Schp.! Dr. Gärten Rn.! Na. Kubhorst im Park H. S.!

Mft. Garten Beh.!!

# 76. Familie. Acalyphaceae Kl. u. Gke.

326. Mercuriális L.

720. M. perennis L. Schattige, feuchte Laubwälber, sehr zerstrent. P. Sanssouci!! (schon von Willdenow gefunden). Dr. Zwischen Sachsenhausen und dem Theerosen Rn.! Liebenberg beim Forstbause R. Na. Fasanerie bei Königshorst H. S.!! Kremmen: Tiebom N. Alt-Landsberg Gae. Fw. Falkenberg bei der Dampsmilble Rn.! Rft. Brunnen Bch.!! Spechtbausen Bch.

721. M. annua L. Gartenland, fehr felten und vielleicht ur

sprunglich nicht einheimisch. Alt-Landsberg Gae.

# Familie Phyllanthaceae Kl. u. Gke. \* Buxus Tourn.

\* B. sempervirens L. Belannter Zierstrauch aus Gub= unt Bestbeutschland.

# 77. Familie. Urticaceae Endl.

### 327. Urtica Tourn.

722. U. urens L. Dorfftraßen, Gartenland, gemein. 723. U. dioeca L. Schattige Laubwälber, Gebüsche, Zäume häufig.

### 328. Parietária Tourn.

724. P. erecta M. u. K. An Zännen, Mauern, sehr zerstreut; ursprünglich wohl nicht einheimisch. Lw. Nach bem Bürgerbusch bin Rt.! B. Charlottenburger Schlofigarten an mehreren Stellen!! und am Zaune besselben in ber Spanbauer Straße Rt.!! Potsbamer Straße diesseit bes Elisabeth-Krankenhauses Bl.!! an ber nörblichen Mauer bes botanischen Gartens!! (seit Willdenow). Bucon Radig. Fw. Falkenberg Schl. Nft. Bei ber Schleuse nörblich am Kanal Bch.!!

# 78. Familie. Cannabaceae Endl.

### † Cannabis Tourn.

† C. sativa L. Stammt aus bem Orient; im Gebiet selten und in geringer Menge gebaut, bagegen viel außerhalb ber norböstlichen Grenze. An Zäunen, Wegen nicht selten verwildert, in Menge: Br. Beseram!! P. Baumgartenbriid beim Weinberg!! Na. Amtsposi in Königshorst H. S. B. An ber Chausse nach Borhagen!! bei ber v. b. heydt-Briide!! am siblichen Ende von Schöneberg W. M.!! Bergmannstraße!! Rft. Beim Spittel Beh.

### 329. Húmulus L.

725. H. Lúpulus L. Feuchte Gebüsche, nicht seiten. P. Sanssouci Schp. Pfauen-Insel!! Sp.; Pichelsberg; Tegel D. Ra. Brebower Forst!! Königshorst am Damm nach Sanbhorst!! an ber Fasanerie H. S. Ew. Lindenberg Rt. B. An ber Spree dieser Strasau!! jenseit Rummelsburg!! an ber Banke bei ber Kessesstell! Shiergarten!! Schowerber Busch!! Buschtrug!! Bucow Schl. Rft. 3. B. Sichwerber!! am Kanal, besonders häusig im Stadtbruch Bch.

# Familie Moraceae Endl.

### \* Morus Tourn.

\* M. alba L. Aus Afien; nicht felten an Wegen, in eigenen Anpflanzungen gebaut.

\* M. nigra L. Gbenfalls aus Afien ftammenb; felten an-

### 79. Familie. Ulmaceae Mirbel.

### 330. Ulmus L.

726. U. campestris L. Laubwälber, nicht felten; baufig in Borfern, an Stragen, gepflanzt.

b) excelsa Borkhausen. (als Art). Gelten. Biefenthal:

Bei ber Bellmuble A. Br.!

o) suberosa Ehrh. (als Art). Wie bie Hauptart, zerstrent. B. An ber Norbseite bes Wilbparks!! Na. Brieselang Thiele! Lindholz!! B. Schöneberg Thiele! Fw. Hammerthal; Zieglerberg Rn. Hier und ba gepflanzt.

727. U. pedunculata Fougeroux. Balber, Gebiliche, felten. Ra. Königshorst in ber Fajanerie H.S. B. Schöneberg in Elsbrüchern Thiele! Ueberall in Dörfern, Stäbten, an Wegen ge-

pflangt.

# Familie Juglandaceae D. C.

### \* Juglans L.

\* J. regia L. 3m Drient einheimifch; häufig in Garten.

## 80. Familie. Cupuliferae Rich.

### 331. Fagus Tourn.

728. F. silvatica L. Bilbet jum größten Theil bie in D gelegenen Laubmalber bes Gebiets.

### \* Castánea Tourn.

\* C. sativa Mill. In Subbeutschland einheimisch; hier nm zuweilen in Parkanlagen gepflanzt.

### 332. Quercus L.

729. Q. Robur L. spec. Meist mit Fagus silvatica L. gemischt bie Laubholzbestände in D bilbend, in den Laubwäldern in A vorherrichend ober nur eingesprengt, auch einzeln in Kiesernwäldern 730. Q. sessilistora Sm. Mit voriger, aber viel weniger häusig.

### 333. Córylus Tourn.

731. C. Avellana L. Gebüsche, Balbranber, sehr häufig.
\* C. tubulosa Willd. Stammt aus Gub-Europa; nicht felen in Gärten.

### 334. Carpinus L.

732. C. Betulus L. In ben Laubmalbern bes Gebiets ftets ur eingesprengt. Baufig in Garten, besonders gu Beden angepflangt.

# 81. Familie. Betulaceae Rich.

#### 335. Bétula Tourn.

733. B. alba L. Auf feuchtem Boben nicht felten in gangen Bestänben; auserbem in Laub- und Nabelmalbern baufig eingesprengt.

734. B. davurica Pallas. Feuchte Wälber, Torfsümpfe, nicht elten. P. Nördlich am Wildpart!! Ep.!! Grunewald!! Papenberge Thiele! Na. An ber großen faulen Lake beim Finkenkrug!! Lindslots!! B. Steglity D. K. Tasborf D. Alt-Landsberg Gae. Rft. Zwischen bem großen und kleinen See!! Biesenthaler Forst Schl.

735. B. humilis Schrk. Torfwiesen, febr felten. Rur Or. Brilneberg an ber Robutrappe beim schwarzen Berg Gae.! von R.

.820 entbedt.

### 336. Alnus Tourn.

736. A. glutinosa (L.) Gaertn. Sümpfe, feuchte Balber, emein.

b) quercifolia Gleditsch. Rur selten angepflangt. B. Un ber Bante zwischen Schönhausen und bem Gesunbbrunnen ein

Strauch!!

\* A. incana (L.) D. C. Im Gebiet wohl nirgenbs wilb, inbern an Wegen, in Sumpfen kultivirt, so B. Nörblich am Bilbart!! Or. Schlofigarten In. B. An ber Chausse nach Stralau!! n ber Panke zwischen Schönhausen und bem Gesundbrunnen!! Torfraße!! Mödernig!! Rft. Zainhammer; Großer Schlangenpfuhl; euenberger Wiesen Beh.

\* A. auctumnalis Hartig. Bahricheinlich in Norbamerita nheimisch. An einigen Stellen in Menge kultivirt. B. An ber ante zwischen Schönhausen und bem Gesundbrunnen!! in ber Jungrnheibe süblich am Artillerie Schieftplat!! bier von A. Br. zuerft

854 aufgefunden und erfannt.

\* A. incana x auctumnalis? Zwischen ben muthmaglichen Eltern. B. In ber Pante zwischen Schönhausen und bem Gesundbrunnen ein Strauch!!

# Familie Platanaceae Lestiboudois.

### \* Platanus L.

\* P. occidentalis L. In Norbamerita einheimisch; hier und ba an Straßen, in Gärten gepflanzt.

# 82. Familie. Salicaceae Rich.

#### 337. Salix Tourn.

737. S. pentandra L. Wiesen, Sumpfränder, senchte Wälber, zerstreut. Sp. Grunewald am nörblichen Ende des Sees und bei Paulsborn!! Ra. Bredower Forst Rei. Holzborst bei Königshorst H. S.! Dechtow H. Kremmen: Tietow N.! B. Paulow Kth. Reinidendors Bauer! Jungsernheide D. Witzleben!! Wilmersdorf D. Schöneberg Thiele! Lankwitz Thiele! Alt-Landsberg Gae. Strausberg: Zinnborf am Mihlggraben Sch.! Bucow: Am Dolgensee Sch. Rft. Warbecks Mühle; Zainhammer Beh. Auch gepflanzt.

738. S. fragilis L. Ufer, feuchte Balber, nicht felten, über-

all an Wegen u. f. w. gepflangt.

739. S. alba L. Bie vorige, nicht felten.

b) vitellina L. (als Art). Rur angepflanzt.

\* S. babylonica L. Zierbaum aus bem Drient; nur ber Q Baum gepflanzt.

740. S. amygdalina L.

a) discolor Koch. Ufer, zerftreut; nicht felten gepflanzt.

b) triandra L. (als Art). Cbenfo.

\* S. undulata Ehrh. An Graben, Ufern, wohl nur angepflanzt und zwar nur in D Exemplaren. Sp. D. B. Friedrichshain J.!! Moabit Sonder; Treptow bem Gasthof gegenüber!! (Nach Wimmer 739 × 740. S. alba × amygdalina.)

\* S. hippophaefolia Thuill. An Ufern, sebenfalls nur gepflanzt, und zwar nur Q. B. An ber Spree zwischen ber Moabiter Brilde und bem alten Charlottenburger Chaussechause!! Bon Sonder

querft bemerft.

\* S. acutifolia Willd. In Ofi-Europa einheimisch (?). Hier und ba an Zäunen u. f. w. gepflanzt, fast nur bie mannliche Pflanze. 3. Friedrichshain J. !! zwischen Moabit und ber Jungfernheibe viel!!

pippobrom (auch ein Q Baum)!! beim zoologischen Garten!!

\* S. daphnoides Vill. In Schlessen und an ber Offfee inheimisch, hier und ba gepflanzt. Ra. Königshorst am Mangels-orster Damm H. S.! B. Bei ber Moabiter Strafanstalt Jahn! Charsottenburg bei ber Eisenbahnbriide!! hippodrom!!

741. S. purpurea L. Ufer, Graben, zerftreut. Br. Sarinjen; Weseramer Kolonie Schr. Sp. Bichelsberg Bauer. B. Straau; an ber Pante; Jungfernheibe D. an ber Spree bei Moabit Jauer; am Kanal öftlich ber Biesenbriide!! R. D. Alt-Lanbsberg: Jachsenbamm Gae.! Mt. Am Kanal Boch.

742. S. viminalis L. Ufer. Ueberall gepflangt.

743. S. cinerea L. Graben, feuchte Balber, Biefen, haufig. \* S. holosericea Willd Ufer, felten und nur angepflangt.

3. Treptow unweit bes Gafthofes!!

744. S. nigricans Sm. Wiesen, Sumpfrönder, selten. Bisser nur B. Mödernity in der Jungsernheide Sanio! zwischen Wilsnersdorf und dem zoologischen Garten!! Nicht selten angepflanzt, od. Ruinenderg Bs.! Wiesen jenseit des Neuen Palais!! beim Tortow!! B. Thiergarten!! beim zoologischen Garten!! am Wege nach Treptow!!

745. S. Caprea L. An Gräben, in Laubwälbern, zerstreut. B. An ber Havel beim Templin Bs. 1 Ra. Finkenkrug!! Lindholz!! B. Jenseit Rummelsburg D. Beißense Kih. Jungfernheibe beim Königsbamm!! Steglit D. K. Rübersborfer Kalkberge Schl.! Mft. Un ber Chausse nach Trampe; Brunnen; Zainhammer Beh.

746. S. aurita L. Biesen, seuchte Waldstellen, nicht selten. B. Ruthewiesen Bs. ! Sp. Bichelsberg!! Grunewald!! Ra. Bei ber Salteftelle Finkenfrug!! Kremmen: Tiehow N.! B. Gesundbrunsten!! im sublichen Theil ber Jungfernheibe!! Witleben beim Forstsause W. M.! zwischen bem zoologischen Garten und Wilmersdors!! L. Friedrichsbagen!!

b) cladostemma Hayne (als Art). Mit ber Sauptart,

felten. Gp. Gublich von Bichelsberg!! B. Bantow Schl.

\* S. phylloifolia L. Im Barg und in Schlefien einheisnisch, hier nur angepflanzt, fo B. Biefen jenfeit bes Reuen Balais!! B. Thiergarten in ber Rabe bes zoologischen Gartens Dr. Lambert!

b) laurina Sm. (ale Art). B. Treptow unweit bes Gaft-

hofes!!

747. S. repens L. Sumpfränder, Biesen, Moorboben, nicht elten, 3. B. Na. Buschow am Bolchow!! Königshorst H. S. Kremenen: Rhinluch H.! B. Friedrichsselbe; Beißensee Keh. zwischen Französisch-Buchholz und Nieder-Schönhausen!! zwischen Pankow und

bem Gefundbrunnen!! Reinicenborf Schl. zwischen bem zoologischen Garten und Bilmereborf!! Rubower Biefen!!

b) fusca Sm. (als Art). Wie bie hauptart. 3. B. Sp. Schl. Na. Beim Bredower Forsthause!! B. Pantow Schl. Jung-

fernheibe Thiele! Tempelhof Schl. Auch angepflanzt.

c) argentea Sm. (als Art). Desgleichen, 3. B. B. Bestich von Bellevue Bauer; zwischen bem zoologischen Garten und Wilmersborf!!

d) rosmarinifolia L. (als Art). Torffilmpse, zerstreut. Sp. Schl. Grunewald!! B. Friedrichsselbe Schl. Jungsernheidt!! 737 × 738. S. pentandra x fragilis. An Sümpsen, light zerstreut. Sp. Pichelsberg Bauer. Na. Finkenkrug A. Br.!! B. Gesundbrunnen Sanio! Mödernitz Sanio! Auch zuweilen angepstauzt; so Na. Beim Forstbause Briefelang!! B. Friedrichsbain J.!

Jungfernheibe am Wege nach Spandau biesseit Königsbamm und am Wege vom Plötzensee nach Charlottenburg!! biesseit Treptow!!

\* 738 × 739. frágilis × alba. Mit den Estern, aber wohl

nur angepflanzt. Sp. Tegel D. B. Lichtenberg Dr. Klotzsch! Scho-

neberg D.

\* 740 × 742. S. amygdalina × viminalis. Ufer, Begt, nur gepflanzt. B. Bestlich ber Moabiter Brilde am linten Spree ufer!! bei ber unteren Kanalschleuse Caspary; bei Ober-Rixborf Sanio; am Bege nach Treptow Winkter!!

\* 741 × 742. S. purpurea × viminalis. Nur angepflanzt. Moabit Sonder; an ber Afazienpflanzung westlich vom botanis.

fchen Garten Caspary!!

\* 742 × 743. S. viminalis × cinerea. Nur angepflanzt. B. An der Afazienpflanzung westlich am zoologischen Garten Caspary!!

742 × 745. S. viminalis × Caprea. An Begen, Gröben, vielleicht nur angepflanzt. B. An ber Chaussee nach Stralau

A. Br.!! am Wege von Treptow nach bem Gierhauschen!!

\* 742 × 747. S. viminalis × repens. Nur angepflangt. B. Wiesen jenseit bes Reuen Palais A. Br.!!

\* S. nigricans × phylicifolia\*). Mit ben Eltern, aber

wohl nur gepflangt. B. Wiefen jenfeit bes Reuen Balais!!

746 × 747. S. aurita × repens. Sumpfränder, Wiesen, gerstreut. P. Zehlendorf bei ber Haltestelle A. Br.!! Sp. Bei den Schanzen nordwestlich ber Stadt A. Br.!! B. Zwischen Pankow und bem Gesundbrunnen Wichura!! an der Tegler Chausse A. Br.! Rubower Wiesen A. Br.!!

<sup>\*)</sup> Rach Bauers Urtheil.

### 338. Pópulus Tourn.

\* P. alba L. Im Gebiet nicht einheimisch; in Parts, an Wegen haufig gepflanzt.

\* P. canescens Sm. Desgleichen.

748. P. tremula L. In Balbern nicht felten. Auch an Be-

gen gepflangt.

\*P. nigra L. Im Gebiet wohl nicht einheimisch, sonbern in Balbern, an Wegen, Strafen zuweilen gepflanzt. Zahlreich z. B. F. Im Walbe nach Kaput hin Jahn! Na. An ben Dämmen im großen Havelländischen Luch!!

\* P. pyramidalis Rozier. Un Chauffeen febr häufig gepflanzt; erft feit bem Enbe bes 18ten Jahrhunderts eingeführt. hier faft nur & Bäume; Q B. Im Soltmannichen Brunnengarten und im

Boucheschen Garten.

\* P. monilifera Ait. Aus Nowamerita; an Chauffeen überall gepflanzt, fast nur in & Exemplaren.

\* P. balsamifera Ait. Bierbaum aus Norbamerifa.

### B. Monocotylédones.

# 83. Familie. Hydrocharidaceae D. C. 339. Stratiotes L.

749. S. aloides L. Pfühle, Seen, Gräben, nicht selten, z. B. Kuthewiesen Bs. Sp. Havel bei Pickelswerber!! Ruhleben Kth. Grunewald!! Tegel D. Dr. Zerpenschleuse Kr. Na. Sandhorst H. S. Kremmen: Reglüggraben bei Linum H.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Stralau D. Beißense!! saule Spree Bl. Bigleben Schp. zwischen Steglit und Lichterselbe W. M. Schöneberger Fenn Bl. Tempelhos!! Treptow D. K. Erkner beim Renen Krug!! Blumberg Kth. Mt. Am sinten Ufer bes Kanals nach ber Rogujer Schlenje zu Beh.

### 340. Hydrócharis L.

750. H. morsus ranae L. Wie voriger, häufig, 3. B. P. Ruthe; nörblich am Wildpark Bs. Sp. Havel bei Pichelswerber!! Grunewalb!! Tegel D. Na. Königshorft H. S. Kremmen: Rhinluch bei Linum H.! Lw. Frankenfelbe Rt. Trebbin: Schulzenborf Gr.!

B. Jungfernheibe D. Charlottenburg Rei. Bellevne; Schöneberger Fenn Bl. Tempelhof!! Rubower Biefen!! Rft. Kanal; Delmühleteich; beim alten Bafferfall Bch.

# 84. Familie. Alismaceae Rich.

### 341. Alisma L.

751. A. Plantágo L. Sumpfränder, Gräben, häufig.
b) graminifolium Ehrh. In Sümpfen, nicht häufig. B. Tempelhof Bouché!

### 342. Echinódorus Rich.

752. E. parnassifolius (L.) Englm. Tiefe Sümpfe, sehr selten. Sp. Grunewalb in ber Nabe ber hunbekehle R. B. An einem Sumpf siblich von Tempelhof öftlich ber Chauffee Lucae! Rn.!

753. E. natans (L.) Englm. Stehenbe Gemässer, zerstreut. Sp. Teuselssenn im Grunewalb!! B. Beißensee!! Jungfernheibe D. Hohler See!! Wilmersborf D. Tempelhos!! Lankwit .W. M.! K. Tasborf D.

### 343. Sagittária L.

754. S. sagittasfolia L. Sümpfe, Graben, Hüffe, nicht selten. B. Ruthe Bs. Sp. Pichelswerder!! Na. Briefelang W. M.! Königshorst H. S. Kremmen: Linum H.! B., In bem (ber Schiffsahrt versperrten) hauptarm ber Spree zwischen ber Burgstraße und bem Lustgarten sehr viel, aber selten blübend!! an ber Spree diesseit Stralau Rei. Beisensee!! Plöbensee Bl. Kanal bei ber Charlottenburger Brüde, meist nicht blübend!! Lankwih Bl. Rft. Am Kanal nach ber Rogaser Schlense zu Beh.

# 85. Familie. Butomaceae Rich.

### 344. Bútomus Tourn.

755. B. umbellatus L. Sumpfränder, Gräben, Ilfer, nich selten, 3. B. P. An ber Havel und Ruthe Bs. Sp. Pickelsberg!! Tegel Kth. Na. Königshorst!! Lw. Ruthe Rt.! B. Rummelsburg J.! Weißensee!! an ber faulen Spree Bl. Tempelhof Schl. Trepstow Kth. Rft. Am Kanal Bch.

# 86. Familie. Juncaginaceae Rich.

### 345. Scheuchzéria L.

756. S. palustris L. Torffümpfe, sehr zerstreut. B. Ruthewiesen Bs. ! Ravensberge Schp. Zehlendorf im trummen Fenn!! Sp. Grunewald!! Papenberge; Tegel D. B. Jungfernheibe O. Jaenicke. K. Tasborf D. Fw. Sonnenburg Sch.! Biesenthal: In einem Sumpse nördlich vom Wege nach Lanke A. Br.

### 346. Triglóchin L.

757. T. maritima L. Wiesen, besonders auf Salzboben, im westlichen Gebiet zerstreut, im östlichen saft ganz sehsend. Rur A. Br. Deet; Lümow; Pewesin Schr. P. Jenseit des Reuen Palais Weiland! Uet Schp. Authewiesen Bs. Sp. D. Papenderge Kth. Tegel D. Ra. Zwischen der Bredower Forst und Zeestow!! zwischen der Seinderz Sägerhause!! Luch bei den Jahnbergen!! Mangelshorst H. S.! Dechtow beim Unterholz H. Kremmen Jahn; Flatow H. Tietzow N.!! Ew. Frankenselbe Rt.! Frankensörde; Zülichendors Rt. B. Zwischen der Stadtmauer und Borhagen J.!! Rummelsburg!! Friedrichsselbe D. zwischen der Jungfernheibe und Charlottenburg A. Br. süblich am zooslogischen Garten W. M.! Rudöwer Wiesen!! Treptow D. K. Tas-

758. T. palustris L. Moorwiesen, Sumpfränder, nicht seten, oft mit der vorigen Art. B. Authewiesen Bs. Sp. Bichelswerber!! am Grunewald-See!! Tegel D. Na. Zwischen der Bredower Forst und Zeestow!! beim Selbelanger Jägerhause!! Königshorst sirchenkoppel H. S.! Kremmen: Beet; Linum H.! Lw. Felgenteu Rt. Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Wiesen zwischen mauer und Borhagen!! zwischen Rummelsburg und dem Segemeister!! zwischen Kummelsburg und dem Hest. zwischen Dungfernheibe beim Pfesserluck Rei. zwischen der Aungfernheibe und Charlottendurg A. Br beim Kursürstendamm!! Wiesen an der Eisenbahn diesseit Schöneberg!! an Pfühlen südlich von Tempelhos!! Wr. Batslower Wiese Rn. Rs. Großer Schlangenpsubl Beh.

# 87. Familie. Potamiae Juss.

### 347. Potamogéton L.

759. P. natans L. Stehenbe Bemaffer, häufig.

760. P. fluitans Rth. Fluffe, zerftreut. B. Gavel bei Baumgartenbrud Körnicke. Dr. havel Gae.! B. In ber Spree bei ber Langen und Marschallsbrude Bl. bei ben Zelten Kth.! bei Charlot-

tenburg Körnicke.

761. P. alpinus Balb. Gräben, Teiche, Bäche, zerstreut. Em. Beim kleinen Haag H. S. II.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Jungfernheibe süblich vom Kanal westlich vom Königsbamm Schp.! Charlottenburg D. zwischen bem zoologischen Garten und Wilmersborf A. Br.!! süböstlich von Rixborf Bauer; süblich an ber Sprecheibe W. M.! Alt-Landsberg Gae.! Fw. Alaungraben Rn.

762. P. gramineus L. Stehenbe Gemäffer, Graben, Torflöcher, zerftreut. Sp. hunbetehle Körnicke! Dr. Gae.! Kremmen: Linum H.! B. Saupfuhl!! Beigenfee!! Tempelhof Bauer. Br.

Batilow Thiele!

763. P. nitens Web. Geen, fehr zerftreut. Gp. Tegler Gee

beim icharfen Berg Körnicke! Budower Gee Thiele!

764. P. lucens L. Stehenbe und langsam sließende Gewässer, nicht selten. P. Havel beim Tornow!! Schlachtensee Jahn! Sp. Krumme Lanke!! Tegler See Kth.! Na. Königshorst H. S.! Kremmen: Rhinsuch H. B. Spree; Rummelsburger See O. Jaenicke. Beißensee Schl. K. Müggelsee D. Alt-Landsberg: Bötsee Gae.! Fw. Alaungraben Rn.

765. P. decipiens Nolte. Geen, Fluffe, felten. Bisher nur

Biefenthal: Liepnit-Gee Jahn!

766. P. praelongus Wulfen. Stehenbe und langfam flie-Benbe Gemaffer, fehr zerstreut. Sp. Krumme Lante A. Br. !! Sundeteblen-See Schl.! Tegler See Körnicke. Kremmen: Torfgraben bei

Linum H.! Biefenthal: Dber-Gee bei Lante A. Br.!

767. P. perfoliatus L. Flüsse, Seen, nicht selten. P. Has vel beim Tornow!! bei Ketzin Hechel! Schlachtensee Schp. Sp. Grus newalds See D. Tegler See Bl. Dr. Havel Gae.! Kanal bei Zers penschleuse Kr. Kremmen: Rhinluch H.! B. Plötzensee Bl. Schiffsfahrtstanal und Teiche beim zoologischen Garten!! R. Flakensee!! Kalksee Bl. Fw. Alaungraben Rn. Rft. Kanal; Schwärze Bch.

768. P. orispus L. Stehenbe und fließende Gewässer, häusig. P. Beh. Sp. Grunewald Kth. B. Weißensee Kth. Kanal bei der Torfstraße!! Plötzensee Bl. bei den Zelten Kth.! Charlottenburg Kth. Schöneberg Winkler! Tempelhof Rei. Audower Wiesen!! Alt-Landsberg: Wesendahl Gae.! Bucow Walter. Fw. Alaungraben Rn. Mt. Delmüblteich Beh.

769. P. compressus L. Fliffe, Geen, Graben, gerftreut. Sp. Pichelswerber!! Tegler Gee D. Kremmen: Linum H.! B.

Spree bei Bellevue D.

770. P. acutifolius Lk. Gräben, Seen, zerstreut. Sp. Grunewald; Tegler See D. B. Zwischen bem zoologischen Garten und Wilmersborf A. Br.!! Schöneberger Fenn Bl. Rubower Wie-

jen!! Alt-Landsberg: Bruchmuble Gae. !

771. P. obtusifolius M. u. K. Wie voriger, zerstreut. P. havel beim Tornow!! Sp. Grunewalb D. Tegel Gae. B. Sau-pfuhl Kth.! Tempelhof v. Chamisso! Alt-Landsberg: Wesendahl Gae.! Fw. Sonnenburg Sch. Nft. Gräben am Trödelsteig Bch.

772. P. mucronatus Schrad. Graben, Seen, febr zerstreut. B. havel bei Berber Schr.! Sp. Graben süblich von Paulsborn Körnicke!! Tegler See Bauer! B. Spree bei ben Zelten Kth.! Gra-

ben süböstlich von Rixborf Grunow! R. Tasborf Bauer!

773. P. pusillus L. Gräben, stehende Gewässer, zerstreut. Br. Gr. Kreut im Dorsteich Schr. Gohlitz Schr.! Sp. D. Kremmen: Rhinluch H. B. Weißensee D. Seegerscher Holzplatz Bl. Wilsmersborf; Tempelhof D. Rubower Wiesen!! Alt-Landsberg: Wesen-bahl Gae.

774. P. rutilus Wolfgang. Pfühle, fehr felten. B. Zwischen

Tempelhof und Mariendorf 1832 Bauer!

775. P. trichoides Cham. u. Schl. Gräben, fehr selten. Sp. Rach ben Papenbergen bin Schl.! ob noch jett? B. In einem Torfloch zwischen ber Birkenstraße und ber Jungfernheibe 1853 A. Br. !! jett burch Urbarmachung bieser Gegenb vertigt.

776. P. poctinatus L. Seen, Fliffe, Graben, zerstreut. P. Ruthe Bs.! Sp. Pichelsberg!! Tegler See Kth.! Kremmen: Lisnum H.! Alt-Landsberg: Bötfee Gae.! Buctow: Tornow-See Jahn!

Mft. Rleiner Gee!!

b) Vaillantii R. u. Sch. (als Art). In Fluffen. B. Spree bei ber Marschallsbriicke Bl. bei ben Zelten!! im Kanal vor bem Anhaltischen Thor W. M.!

### 348. Zannichéllia Micheli.

777. Z. palustris L. In stehenden Gewässern, sehr zerstreut, aber wohl mehrfach übersehen. B. Glindower See am süblichen Ufer Sehr. Schlachtensee Grunow! Tegler See Bl! im See bei Beiligensie Kth.! B. Tempelhof im Pfuhl bei ber Kirche!! am 28. Oktober 1855 von Rach und mir gesunden.

# 88. Familie. Najadaceae Lk. 349. Najas L.

778. N. marina L. ex p. In ftebenben und langfam flies Benben Gemäffern auf Sand- und Moorgrund, gerftreut. bei Raput Weiland! Ruthe Bs.! Schlachtenjee!! Gp. Rrumme Lante Körnicke! Tegler Gee Schl.! R. Ralffee Kth.! Stienitfee bei Ta8borf Dr. Klotzsch! Alt - Landsberg: Bobjee Gae.! Baruth Rbh. Budow: Tornow-See Jahn! Mft. Groffer See Bch. Biefenthal: Ober-Gee bei Lante Jahn!

779. N. minor All. Wie vorige, zuweilen mit berfelben, fel-B. Schlachtenfee!! Sp. Rrumme Lante Caspary! See bei ber hundefehle Bauer! Tegler Gee Kth.! Mft. Großer Gee Bch.

# 89. Familie. Lemnaceae Lk.

### 350. Lemna L.

780. L. trisulca L. Graben, Geen, Pfühle, baufig.

781. L. polyrrhiza L. Bie vorige, weniger baufig, 3. B. Sanssouci Schp. beim Tornow!! Sp. Bichelswerber!! B. Spree bieffeit Stralau Schp. Charlottenburg W. M.1 Teiche im Thiergarten!! Wilmersborf Thiele!

782. L. minor L. Wie bie vorigen, gemein. 783. L. gibba L. Wie bie vorigen, nicht häufig, 3. B. P. Bornstedt Schp.! B. Bei ben Belten Bl.

# 90. Familie. Typhaceae Juss.

## 351. Typha Tourn.

784. T. angustifolia L. Gumpfe, Graben, nicht felten. Br. Lehniner Mühlteich Schr. B. Am Bilbpart Schp. Gp. Grunewalb W. M. ! Rremmen: Linum H. Beelit: Galgbrunn Re.! Em. Linbenberg Th. Trebbin: An ber alten Ruthe bei Mertensmuble; Schulzenborf Gr.! B. Schoneberger Bufch Bl. R. Boltersborf!! Stortow: Scaby-Luch H. Mft. Ziegelei; Zainhammer Beh.

. 785. T. latifolia L. Bie vorige, baufig.

### 352. Spargánium Tourn.

786. S. ramosum Huds. An Graben, Gumpfen, Ufern, bau-

fig, z. B. P. Tornow!! Ra. Königshorft H. S. B. Beißensee!! Schöneberger Fenn Bl. Tempelhof W. M.! Alt-Landsberg Gae. Aft. Un ber Schwärze !! Graben am Beibenbamm Beh.

787. S. simplex Huds. Wie voriges, nicht felten, 3. B. Cp. Grunewald W. M.! Rremmen: Linum H.! B. Schoneberger Kenn

Bl. Tempelhof Rei. Mft. Bornemannspfuhl Bch.
b) fluitans A. Br. In Fliffen fluthend. P. Havel beim

Tornow!! (nicht blübend gefunden).

788. S. minimum Fr. Torffumpfe, gerftreut. B. Rl. Dachenow Schl. Gp. In einem fleinen Gumpf bei Bicheleberg!! Teufelsfenn !! zwijden bem Grunemalb- und Sunbeteblen-Gee!! Gumpfe norböftlich ber hundefehle !! Em. Dobbritom Rt.! B. 3mifden Beijsensee und Hohen = Sonnausen A. Br.! Sümpse diesseit der Jungsernheide und östlich vom Pfesserluch!! füblich von Tempelhos!! Rus dower Biesen D. K. Tasborf D. Br. Beim Landhof Sch. Rft. Diesseit bes großen Sees Bch.! Biesenthal: Sumpfe nach Lanke bin A. Br.

# 91. Familie. Araceae Juss.

### 353. Calla L.

789.- C. palustris L. Gilmpfe, befonbere auf Torfboben, zerstreut. Br. Schwiena bei Lehnin Rt. Götzer Elsbruch Sohr. P. Gr. Glienicke H. Teuselssee bei ben Ravensbergen Ad. Müller! Ruthewiesen Bs.! Kl. Machenow D. Sp. Saugarten Bl. am Grunewald = See!! Lw. Frankenforbe Rt.! Trebbin: Torfftich bei Schulzendorf Gr.! B. Zwijchen Frangofijch-Buchbolz und Buch Kr. Motternit in ber Jungfernheibe!! Wilmersborf D. R. D. Rabenftein-Mühle H. Tasborf Thiele! Alt-Landsberg Gae. Bucow: Bei ber Prighagener Milhle Sch. Hw. Baa-See Rn. Mft. Finowbruch Bch. beim kleinen See Bch.!! Biesenthal: Sümpfe nach Lanke hin A. Br.

## 354. Acorus L.

790. A. Calamus L. Gumpfe, Ufer, Graben, nicht felten. B. An ber Havel und Nuthe Bs. Sp. Bichelsberg!! Grunewalb Schl. Papenberge D. Ra. Königshorst H. S. Beelit; Salzbrunn Rt. Lw. Linbenberg Th. Trebbin: An ber Ruthe bei Mertens-mühle Gr.! B. Beißensee; Jungfernheibe D. Schöneberger Fenn Bl. Tempelhof; Treptow D. Rft. Kalmusbrücke; bei ber Babeanftalt Bch.

# 92. Familie. Orchidaceae Juss.

### 355. Orchis L.

791. O. Rivini Gouan. Trocknere Wiesen, meist A, im westlichen Gebiet zerstreut, im östlichen selten. Br. Lünow; Regür; Bewessen Schr. B. Jenseit des Neuen Palais Bs.! Sp.; Schönwalde; Heiligensee D. Dr. Germendorf Gae.! Na. Wiesen beim Finkenkrug!! westlich der Bredower Forst!! bei der Stadtsorst Gr.! nördlich am Lindholz; Tremmen Schr. Kremmen: Tietow N.!! Linnmer Wiesen westlich vom Birkhahndamm H.! T. Zwischen Kemnig und Niedelhorst P. B. Wiesen zwischen der Stadtmauer und Borhagen!! dei Friedrichsselbe D. Französisch-Buchbolz!! Rudower Wiesen!! Müncheberg O. Jaenicke. Wr. Berge Sch.! Nft. Stadtbruch; bei der Rogäser Schlesse.

792. Ö. tridentata Scop. Sonnige Higel, sehr selten. Mur in ber Obergegend. Fm. Amalienhof Bch. Mft. Karlswerf Bch.!

bier querft von H. entbedt.

793. O. coriophora L. Mäßig feuchte Wiesen, im westlichen Gebiet zerstreut, im östlichen sehlend. Nur A. Br. Weseram; Lisnow Schr. Pewesin!! P. Zwischen Bornim und Marquard Schp.!! Wiesen nördlich am Wildpart!! nörblich von Geltow Ad. Müller! Sp. Bei den Papenbergen R. zwischen Nieder-Neuendorf und Schönwalde Rn.! Or. Bögow H. Na. Wiesen nördlich vom Finkenkrug!! westlich an der Bredower Forst!! am Lindholz dei Paulinenau Rt.! Kremmen: Eubruch bei Linum H. Kithnick im Dorn Muss! Lw. Trift jenseit Elsthal; Frankenselde Rt.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Wiesen bei Boxhagen Jablonsky; Rudower Wiesen einzeln!!

794. O. Morio L. Trockne Biesen, sonnige hügel, Waldränder, zerstreut. Br. Ketzik (weißblühend) Schr.! P. Jenseit des Neuen Palais; Ruthewiesen Bs. Sp. Bei der Hundekehle einzeln Schp. Ra. Große faule Lake beim Finkenkrug!! nördlich am Lindholz H. S.! T. Kennnit; Niebelhorst P. Lw. Felgentreu Rt.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Wiesen nördlich der Huchsberge O. Jaenicke!! Französsichenderz Buch kr. Keinickendorf D. Steglit bei der Schöferei Bt. Tempelhof D. Rudower Wiesen Schp.! K. Tasborf D. AltsLandsberg Gae. Strausberg: Blumenthal Kr. Bucdow: Priphagen Schl. Wr. Berge Sch.! Bahlower Mihlte Thiele! Mft. Trampe Bch. Hetelberg Bt.

795. O. laxiflora Lmk. Rur

b) palustris Jacq. (als Art). Sumpfwiesen; im westlichen Gebiet gerftreut, im öftlichen selfen; besonbers A. Br. Gildwest-

Tich von Weseram viel!! Lünow; Kethir Schr. Pewesin im Löhsbruch!! B. Jenseit des Neuen Pasais Bs.! Marquard Schp.! Sp. Schönwalde D. Na. Nörblich vom Finsenkrug!! Wiesen bei der Stadt Gr.! nörblich am Lindholz Schr. Königshorst in der Kirschenkoppel H. S.! Kremmen N. Trebbin: Lüdersdorf Gr. B. Rudower Wiesen!! Mft. Bornemannspsul Bech.

796. O. maculata L. Trochnere Wiesen, seuchte Laubwälber, zerstreut. P. Zwischen bem Neuen Palais und Golm Bs.! Sp. Keh. Deiligensee D. Dr. Wanbelit Schl. Na. Wiese nörblich vom Finkenkrug!! nörblich von K. Bähnit!! Lw. Frankenselbe kt.! Schöneweibe Gr.! Trebbin: Schulzendorf Gr. B. Friedrichsselbe bein Landwehrkreuz Rei. heinersdorf D. Französisch-Buchholz Kr. Nei-nickendorf D. Jungsernheibe (weißblühend) Thiele! Audower Wiesen!! Alt-Landsberg Gae. Mft. Drebnits: an der Schwärze: Leuenberger

Wiesen Beh.! 797. O. latifolia L. Keuchte Wiesen, häufig.

798. O. in carnata L. Feuchte Wiesen, zerstreut. Br. Bewesin!! P. Golm Bs.! Sp. Grunewald!! Tegel Schp. Na. Briesetang W. M! große saule Lake beim Finkentrug!! Kremmen: Linum H.! Iw. Frankenselbe Rt.! B. Wiesen zwischen ber Stadtmauer und Borhagen!! Jungfernheibe!! Rubower Wiesen (auch weißblilbend)!! K. Tasborf Beyrich! Biesenthal: Wiesen nach Lank
bin A. Br.

### 356. Gymnadénia R. Br.

799. G. conopéa (L.) R. Br. Mäßig feuchte Wiesen, zersstreut; gern mit Orchis maculata L. Br. Weseram!! Lünow Schr. Bewesin!! P. Jenseit bes Neuen Palais!! Nuthewiesen Bs. zwischen Kl. Machenow und Teltow Bl. Sp.; Schönwalde; heiligensee D. Dr. Germenborf Gae.! Wanbelit Schl. Na. Nörblich vom Finsentrug!! westlich vom der Bredower Forst!! Kirchentoppel bei Königshorst H.S.! Lw. Süblich vom Elsthal Rt.! Lindenberg H.S. II.! zwischen Frankenselbe und Frankensörde Rt.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Wiesen beim Lichtenberger Kiet J.! Französsich-Buchdolf Kr. Reinickendorf D. Jungsernheide Kth. Wiesen nörblich von Wilmersdorf!! Rudower Wiesen!! Rs. Großer See; Tornow Bch.

800. G. densiflora (Wahlenb.) A. Dietrich. Wiesen, sehr zerstreut. Ra. Brieselang Jahn. B. Frangösisch-Buchholz nach Buch und Schönerlinde zu Kr. Rudower Wiesen!! (hier zuerst von D. entheckt). Strausberg bei ben Lilien-Convallienwällen Gae.!

### 357. Platanthéra Rich.

801. P. bifolia (L.) Rehb. Laubwälber, trodne Wiesen, ger-

streut. B. Ketikr Gr. Sp. Bei ber Hundekehle!! Papenberge!! an der Chaussee jenseit Tegel Schp. Na. Brieselang Gr. Bredower Fork W. M.! Lindholz!! Gr. Bähnit Schr. Lw. Frankenselbe; Felgentreuer Busch Kt. Trebbin: Zelle Gr.! B. Französisch-Buchholz Kr. Jungsernheibe westlich vom Artillerie-Schießplaty!! Rudower Wiesen: Köpnicher Heile D. Strausberg: Blumenthal D. Hw. Turnplaty; Brunnen Kn. Nst. Brunnen; Zainhammer; Bornemannspsuhl Bck.

802. P. montana (Schmidt) Rehb. fil. Lichte Laubwälber, felten, aber wohl mehrsach übersehen. Ra. Im westlichen Theil bes

Lindholzes!! zuerft von Hertzsch entbedt.

### 358. Hermínium R. Br.

803. H. Monorchis (L.) R. Br. Trodine Biefen, felten. B. Biefen zwifchen ber Stabtmauer und Borhagen!! Rubower Biefen!

### 359. Anacamptis Rich.

804. A. pyramidalis (L.) Rich. Trodne Biefen mit Mergelgrund, fehr felten. B. Biefen füblich vom Bufchtrug Dr. Klotzsch!

### 360. Cephalanthéra Rich.

805. C. grandiflora (L.) Babington. Schattige Laubmalber, Gebuiche, felten, aber ziemlich gefellig. Fm. Bieglerberg Rn.!!

Baschenberg Beh.!! Mft. Pfingftberg bei Rarlswert Beh.

806. C. rubra (L.) Rich. Trodne, schattige Wälber, meist unter Laubholz, sehr zerstreut und oft vereinzelt. P. Wildpark Bs. Walb an den Nuthewiesen in der Nähe des Forsthauses Bs.! Sp. Grunewald öftlich vom Teufelssenn Schp. Papenberge D. Schulzendorf Bl.! Dr. Zerpenschleuse Kr. Na. Beim Finkentrug einzeln Sanio! Hahnberge Gr.! Lindholz H.S.! B. Jungsernheide R. Köpnicker Heibe Bouché! R. Woltersdorfer Schleuse v. Chamisso jun.! Fw. Moderkesse zwischen dem Alaunwerk und Falkenberg Rn.! M. Zwischen dem Brunnen und Zainhammer Bch.! Spechthausen Bch.

### 361. Epipactis Haller.

807. E. Helleborine (L.) Ortz. Schattige Laubwälber, zerftreut. P. Charlottenhof; Sanssouci jenseit ber Eichen; Pirscheibe Schp. Hügel an der Griebnig Bs.! Sp. Papenberge D. Bamberge Bl. Tegel Kth. Or. Am Stintgraben Gae.! Na. Finkenkrug!! Bredwer Forst!! Stadtforst!! Lindholz Schr. Königshorst am Damm nach Deutschof H. S. Unterholz bei Dechtow H. S.! Lw. Etsthal Rt.! B. Friedrichsselber Park!! Jungsernheibe beim Forsthause Kö-

nigsbamm Schp.! Thiergarten beim Jagerhause!! Köpnider Beibe D. Fw. Brunnen; bei ber Rieger Ziegelei Sch. Rft. Darre; großer und

fleiner Schlangenpfuhl Bch.

808. E. palustris Crtz. Sumpfige Wiesen, zerstreut. Br. Beseram; Pewesin am Löthruch nörblich vom Kanal Schr. P. Muthewiesen zwischen Neuendorf und Drewit Bs.! Petwow; Glindow Sp. Sp. Kth. Grunewald!! Heiligensee D. Kremmen: Linumer Gräberei H.! Lw. Frankensörde Kt.! B. Wiesen zwischen der Stadtmauer und Borhagen!! Friedrichsselde D. Französisch-Buchholz Kr. Reinickendorf D. Jungfernheide Thiele! Audower Wiesen!! K. Wiesen Mitten Grund!! Tasborf Schl. AlteCandsberg Gae. Buchow: bei der Eichendorfer Wähle Sch.! Wr. Batsower Wiese Rn. (Am Malzmühlgraben Sch.) Nft. Rogsser Schleuse Baetke! zwischen dem kleinen und großen See Bch.! Biesenthal: Wiesen am Wege nach Lanke.

### 362. Listéra R. Br.

809. L. ovata (L.) R. Br. Laubwälder, Sumpfränder, feuchte Gebiliche, zerstreut. P. Zwischen Tornow und Templin Bs.! Ruthewiesen Bs. Sp. An der frummen Lanke H.!! Papenberge D. Tegel an der Chausse sillich der Mühle!! Na. An der Eisenbahm westlich der Halles füblich der Mühle!! Na. An der Eisenbahm westlich der Haltestelle Finkenkrug!! süblich an der großen saulen Lake!! Lindholz!! am grinnen Danum zw. Königshorst und Sandhorst H. S. Unterholz bei Dechtow H. Gr. Bähnit Schr. Aremmen: Rhinluch H. Lw. Frankenselber Rachthütung Rt. Trebbin: Zwischen Schulzendorf und Reuendorf Gr.! B. Bei den Huchsbergen J.! Französisch-Buchholz im Fart!! Jungfernheide bei der Mödernit Bl. Thiergarten unweit des Jägerhauses!! Alt-Landsberg Gae.! Fw. Dampfmilble dei Fassenders Rn. Mft. Schügenhaus; Zainhammer; Sommerselde; Tornow Bch.

### 363. Neóttia L.

810. N. nidus avis (L.) Rich. Schattige Laubwälber, sehr zerstreut. Sp. Grunewalb unweit Paulsborn Winkler; Papenberge!! Or. Liebenberg Gae.! Na. Brieselang!! Lindholz D. Strausberg: Blumenthal D. Fw. Baa-See; Hauptmannsweg Rn. zwischen bem Alaunwert und Falkenberg Rn.! Paschenberg Rn. Mft. An ber Schwärze; Spechthausen; Mönchsbrude Bch.!

## 364. Goodyéra R. Br.

811. G. repens (L.) R. Br. Schattige, moofige Balber, felsten. Sp. Nordwestlich von Tegel zu beiden Seiten ber Chaussee Rn.! Schp. Br. Buchnig bei Möglin Thiele!

### 365. Spiranthes Rich.

812. S. spiralis (L.) C. Koch. Trodne Triften, febr felten B. Beim hegemeister v. Chamisso! und an ber Strafe von ben nach A. zuerst von Dr. Klotzsch entbedt; seit mehreren Jahren nicht wieber gefunden.

### 366. Corallorrhíza Haller.

813. C. innata R. Br. Schattige Balber, auf abgefallenem Laube, Torffümpfe, selten. Sp. Im Torffumpf zwischen Paulsborn und bem Rhinmeister See A. Br.!! und am Rande besselben Bs.!! auerst von D. entbeckt. B. Thiergarten bei ber Fasanerie-Allee einzeln Helmrich! Müncheberg: Bei Neubobengrun Buek! hier zuerst von Dupuis für das Gebiet entbeckt.

### 367. Liparis Rich.

814. L. Loeselii (L.) Rich. Torffümpfe, sehr zerstreut. P. Bei Kl. Machenow Bs.! Sp. Sumpf nörblich vom Grunewald-See und zwischen Paulsborn und dem Rhinmeister-See!! Na. Beim Forsthaus Briefelang Gr.! B. Jungfernheibe Thiele! Aubower Wiesen D. K. Teuselssee bei den Müggelbergen Gr.! Mft. Zwischen bem großen und kleinen See Beh.

### 368. Malaxis Sw.

815. M. paludosa (L.) Sw. Torssümpse, sehr zerstreut, aber meift gesellig. Sp. Ginnpse zwischen bem Hunbekehlen- und Grune-wald-Gee!! B. Charlottenburg beim hohlen See Baetke; in einem Sumpf sübwestlich von Tempelhof Sanio! A. Waltersborf Racht Teufelssee bei den Miggelbergen D. Aft Zwischen dem großen und kleinen See einzeln Beh.! Biesenthal: In einem kleinen Sumpf nörblich vom Wege nach Lanke A.Br.!

### 369. Micróstylis Nutt.

816. M. monophylla (L.) Lindl. Torffümpfe, febr felten. Rur Rft. Zwischen bem großen und kleinen See von Bch. ! am 31. Juli 1857 entbeckt.

### 370. Cypripédium L.

817. C. Calceolus L. Schattige Laubwälber, fehr felten. Ra. Stadtforft von Gr.! einmal zahlreich gefunden; ob noch jett? Rft. Angeblich von Kr. in der Gegend des Forftortes Liefetriet fublich von Spechthausen gefunden.

# 93. Familie. Iridaceae Juss.

### \* Crocus Tourn.

\* C. vernus (L.) All. Saufige Zierpflanze; zunächft in Schlefien wilb.

### 371. Gladiolus Tourn.

818. G. paluster Gaud. Trodne Biefen, febr felten, aber gefellig. B. Rubower Biefen füblich ber Spreeheibe!! querft 1831 von Schl. entbedt.

\* G. communis L. 3m Gebiet nicht einheimisch, sonbern

nur in Garten.

### 372. Iris L.

819. I. Pseudacorus L. Gumpfe, Ufer, baufig.

820. I. sibirica L. Mäßig feuchte Wiesen, feuchte Landswälber, sehr zerstreut. Br. Pewesin auf ber harten Biese Sp.! Sp. Papenberge; Tegel D. Or. Bei Bernöve und Stüpnitz Rn.! Na. Bredower Forst Gr. Lindholz!! T. Riebelhorster Feldmark P. B. Friedrichsselbe D. Audower Wiesen!!

# Familie Amaryllidaceae R. Br.

### † Narcissus L.

† N. poeticus L. Stammt aus Sub-Europa; hier häufig in

Garten und zuweilen vermilbert, fo B. Part von Betom!!

† N. Pseudonarcissus L. Im Gebiet nicht einheimisch, sombern nur zuweisen in Garten und verwilbert, fo R. Schlofigarten Gr.

### † Leucosum L.

+ L. vernum L. Im Gebiet nicht einheimisch, sonbern guweilen in Garten und in Folge bessen verwilbert, so Br. Möglin Rn.

### + Galanthus L.

† G. nivalis L. Bierpffange aus Schlesien, überall in Garten und zuweilen innerhalb berfelben verwilbert; jo B. Auf bem Leipziger Plat W. M. Br. Möglin Rn.

# 94. Familie. Smilacaceae R. Br. 373. Paris L.

821. P. quadrifolius L. Schattige Laubwälber, Gebüsch, zerstreut. P. An ber Havel bei ber Ablage zwischen Tornow und Templin Bs.! Sp. Eiswerber D. zwischen Dallgow und Seeges selb!! Papenberge D. Tegel westlich vom Part!! Ra. Falkenhagen im Elsbruch D. Briefelang!! Haltestelle Finkenkrug!! Bredower Forst!! Lindholg!! am grünen Damm zwischen Königshorst und Sandhorst H. S.! Unterholz bei Dechtow H. Trebbin Gr.! B. Friedrichssels ber Part!! bei ben Huchsbergen!! Französisch Buch kr. Jungsernbeide bei der Dödernity!! Alte-Landsberg Gae.! Fw. Bas See Rn. bei der Dampfmilble bei Falkenberg Kn.! Rst. Leuenberger Wiesen; Schauzenberg Bch. an der Schwärze zwischen dem Gessundbrunnen und Zainhammer Bch.!!

### 374. Polygónatum Tourn.

822. P. officinale All. Trodne Wälber, Higel, zwischen Gebilsch, zerstreut. P. Pirschheibe!! Brauhausberg Torges! Sp. Bei der krummen Lanke Schp. Vapenberge; Tegel D. Dr. Zerpenschleufe Jahn. Na. Beim Bredower Forsthause!! Jahnberge!! Sandkrug bei Gr. Bahnit Schr. Trebbin Gr. B. Diesseit Buch Kr. Jungernbeide am süblichen Nande in der Nähe des Plötzenses Bl.! und östlich an der Mödernitg!! Hasenbeide D. Heideland zwischen Treptom und dem Reuen Krug!! K. Zwischen Woltersdorf und der Schleufe W. M.! Alt-Landsberg Gae. Blumberg Kth. Fw. Turnplatz Rn.! Fischerweg; Teuselsbriide Rn. Nft. Brunnen Bch.

823. P. multiflorum (L.) All. Schattige Laubwälber und Gebüsche, nicht selten. P. Sanssouci Schp.! Lindstedt Bs.! Dr. Schlößgarten Rn.! Na. Brieselang!! Bredower Forst!! Lindholg!! Hafanerie bei Königshorst!! Parf bei Gr. Bähnits!! Kremmen: Tietsow nach Flatow hin!! B. Friedrichsselber Part!! bei d. Kuchsbergen J.! Buch Kr. Schönhauser Part Rach! Jungsernheide D. Thiergarten Sanio! besonders beim Floraplat Bl. Johannisthal Rn.! Alts-Landsberg Gae. Fw. Dampsmilhe bei Falkenberg Kn.! Nft. Brunnen!! Spechtbausen Bl. Auch als Zierpflanze in Gärten.

### 375. Convallária L.

824. C. majalis L. Trodne Laub- und Rabelmalber, gerftreut; in letzteren meift nicht blühenb. B. Neuer Garten Bs. Sanssonci!! Sp. Walb nordöstlich ber Hundekehle!! Papenberge!! Tegel Schp. Na. Briefelang!! Bredower Forst!! Lindholz!! Fasanerie bei Königshorst H. S.!! zwischen dem Sandtrug und Barnewig!! B. An den Fuchsbergen!! sidöstlicher Theil der Jungfernheide!! Thiergarten Bl. Strausberg: Lisen-Convallen-Wälle Gae. Blumenthal D. Brunnen; Kischerthal; Teufelsbrücke Rn.! Nst. Zainhammer v. Chamisso jun.! Stampsmihle bei Spechthausen Bl. Ueberall als Zierpflanze in Gärten.

### 376. Smilácina Desf.

825. S. bifolia (L.) Desk. Laubwälder, Feuchte Gebiliche, an Simpsen, nicht selten. B. Sanssouci Schp. Sp. Beim Sausgarten!! Papenberge Kth. Ra. Brieselang!! Bredower Forst!! Lindsbolz H. S. Part bei Gr. Bähnig!! Lw. Renneberge Rt. B. Friesbrichsselber Bark!! an den Fuchsbergen!! Schönhauser Bark!! Jungsernheibe!! Thiergarten!! Treptow Kth. Hw. Brunnen; Zieglersberg; Alaunwerk Rn. Mst. Brunnen; Zainhammer Bch. Spechthaussen Bt.

# 95. Familie. Liliaceae D. C.

### + Túlipa Tourn.

† T. silvestris L. Im Gebiete nicht einheimisch, sonbern nur in Garten auf Rasenplaten zuweilen verwilbert. B. Neuer Garten in ber Rabe bes grunen hauses Bs.

\* T. Gesneriana L. Baufige Zierpflanze aus Guboft-

Europa.

### \* Fritillaria L.

\* F. imperialis L. Saufige Bierpflanze aus bem Orient.

### 377. Lílium L.

† L. bulbiferum L. Säufige Zierpflanze aus Mittelbeutsche lanb; verwilbert zuweilen auf Aedern. B. Kreuzberg am nörblichen Abhang!!

\* L. candidum L. Saufige Bierpflange aus bem Drient.

826. L. Martagon L. Laubmalber, fetten. Sp. Papenberge Thiele! Ra. Brebower Forft!! Auch als Zierpflange in Garten.

### 378. Anthéricum L.

827. A. Liliago L. Trodne Balber, fonnige Silgel, gerftreut. Br. Gr. Kreut Schr. Gobliter Fichten Schr.! P. Pirscheibe Ad.

Müller! Baumgartenbriid; Brauhausberg Bs. Sp. Pichelsberg D. Walb bei ber Hundelehle!! Papenberge; Bamberge; Tegler Heide D. Or. Zerpenschleuse Kr. Na. Weinberg H. S.! Lindholz H. S.! Lw. Beim Weichpsuhl Rt.! zwischen Frankenselbe und Zillichendorf Rt. Trebbin: Zelle Gr.! B. Fuchsberge; Weißensee; zwischen Reinidendorf und Hermsborf Schl. Spandauer Berg!! Wald beim hohlen See!! Hasenbeberg Gae. Budow: Prithagen Triebe! Fw. W. M.! Alt-Landsberg Gae. Budow: Prithagen Triebe! Fw. Dohlweg bei der Königshöhe; Atazienderg Rn. Paschenberg Bl. and der Chausse über Falkenberg!! Rft. Hinter dem Turnplat; im Walde nach Sommerselde hin Bch. Spechthausen Bl.

828. A. ramosum L. Trodne Bälber, Biesen, hügel, zerstreut. Br. Eiskutenberg bei Gr. Kreut; Mühlenberg bei Decty; Trebelberg bei Schmergow Schr. P. Pirschheibe Schp. Baumgartenbrild; Brauhausberg Bs. am Schlachtensee!! Sp. Pichelsberg!! Grunewald D. Papenberge Thiele! Tegel D. zwischen Schulzenborf und bem Sandkrug Kr. Na. Bei ber Haltelle Finkenkrug!! Lw. Rambenberge Rt.! Trebbin: Zelle Gr.! B. Fuchsberge!! Jungfernheibe bei ber Scharfrichterei!! Thiergarten Thiele! Hasenheibe D. Audower Wiesen!! Sprecheibe Rei. R. Nilbersdorfer Kalkberge Bl. Bossen: Walb sidlich von Sperenberg!! Mpl. Wald nach Sommerfelbe hin; zwischen bem Schütgenhause und bem Brunnen Bch.

### 379. Ornithógalum L.

829. O. umbollatum L. Biesen, Aeder, sehr zerstreut; theils weise wohl nur verwilbert. B. Charlottenhof; Sanssouci Bs.! beim Neuen Palais!! Beelity: Elsbolz Krumbholz. Lw. Frankenförde; Felgentreu Rt.! B. Schönhauser Part!! Charlottenburg am Romenbamm Filly und im Schlofzarten Rn. Aeder am alten Schagraben bei Abrechtshof W. M.!! Schöneberg Bl. Kreuzberg bem Ende ber Militairstraße gegenüber W. M.! und in der Lehmgrube bei der Hopfschen Brauerei R. an der Chaussee diesseit Tempelhof W. M. beim Neuen Krug Körnicke! Fw. Weinberg; Maunwert Rn.

† O. nutuns L. Zierpflange aus Gub-Europa; in Garten auf Graspläten vermilbert. P. Reuer Garten Bs.! B. Monbijou!! Garten bes Pringen Albrecht W. M.! Friedrichsfelber Part!! &.

Schlofigarten Gr.! Blumberg Kr. Rft. Kirchhof Beh.

### 380. Gágea Salisbury.

830. G. pratensis (Pers.) Schult. Aecker, Begränder, Geblische, nicht selten, z. B. B. Sanssouci; Ruinenberg Schp. Sp. Pichelswerber!! Tegel D. B. Köpnickerselb bei ber Dranienstraße!! Friedrichsselbe!! Pantow!! Schönhauser Part!! an ber Bestseite bes

Dippobrome !! Albrechtshof!! vor bem Salleschen Thor beim Berusa-lems-Kirchhof W. M.! Kreuzberg!! Alt-Landsberg Gae. Rft. Brun-nen Beh.

831. G. arvensis (Pers.) Schult. Aeder, Higel, Gebüsche, weniger häufig. P. An der Chausse nach Siche Scho. Sp. Pickels-werder!! Tegel D. Lw. Felgentreu Re.! B. Friedrichsfelde beim Chaussehaussel! an der Landsberger Chaussee!! Beigensee J.! Panstow!! Charlottendurger Schlößgarten Bl. an der Westseite des hippobroms!! Albrechtshof!! Kreuzberg W. M.! Rigdorf D. Alt-Landsberg Gae. Rst. An den Chaussen nach Oberberg und Fw. Bch.

832. G. saxátilis Koch. Sandige Waldwege, sehr selten. Rur P. Im Wald vor Alt-Teplit sparsam Bs.! Kieswege beim Reuen Palais und an der Rampe besselben!! Zuerst von Oenicke

entbedt. Erreicht bier ihre Grenze nach Rorboften.

833. G. silvatica (Pers.) Loud. Laubwälber, Gebilsche, sehr zerstreut. P. Sanssouci bei der kleinen Fontaine!! Charlottenhof Bs. Ra. Hahnberge Gr.! Jahnberge Rt.! Lw. Nörblich von der Stadt Rt.! B. Schönhausen D. K. Vogelsdorf D. Wr. Büchnit bei Möglin Rn. Methorfer Berge Walter. Fw. Zieglerberg Rn. Schlößberg Rn.! Nft. An der Schwärze diesseit des Zainhammers, nicht blühend Bch.!! Karlswerk H.

### \* Scilla L.

\* S. sibirica Andrews. Häufige Zierpflanze aus Rufland.

### 381. Allium L.

834. A. ursinum L. Feuchte, schattige Laubwälber, sehr seleten, aber äußerst zahlreich. Nur Na. Königshorst im Amtsgarten H.S.!! und in ber Fasanerie, hier in ungeheurer Anzahl!! Zuerst von H. entbeckt.

835. A. fallax (Don.) Schult. Sonnige Higel, trodne Balsber, fehr zerstreut. Sp. Schilbhorn Bauer!! Tegel D. Na. Jahnsberge H. S.! Buctow: Priphagen Schl. Fw. Revedereberg!! Afasienberg Rn.

A. sativum L. Ruchengewächs aus Gub-Europa.

b) Ophioscorodon Don. Richt felten in Gemusegarten.

\* A. Porrum L. Bekanntes Küchengewächs aus Süb-Europa. 836. A. vineale L. Trodne Hügel, Grasplätze, Aeder, besinders in D, nicht selten. B. Baumgartenbrück Bs. Sp. D. Grusnewald; Pichelsberg; Tegel Kth. Kremmen H. Lw. Weinberge Rt. Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Kolonie Hohen-Schönhausen!! Weisselfele D. Exercirplat vor dem Schönhauser Thor J. Charlotten-

burg D. beim zoologifden Garten!! Schoneberg Bl. Tempelbof D. Rrengberg!! bei ber Bafenheibe W. M.! Boffen: Sperenberg!! Br. Am Bege nach Biesborf Sch.! Möglin Rn. Mft. Meder an ber Chauffee nach Oberberg und nach Fm. Beh.

+ A. Scorodoprasum L. 3m Gebiet mohl nicht einbei-

mifch, fonbern nur jufällig vermilbert. B. Rofenthal R.

837. A. oleraceum L. Laubmalber, trodne Bugel, Gebuide, gerftreut. Br. Bewefin Schr. B. Beim Reuen Balais einzeln Schp.! Glindow Schr. Gp. Kth. Ra. Bredower Forft!! Ronigsborft bei ber Fafanerie H. S.! B. 3wifden ber Jungfernheibe und Charlottenburg D. A. Rübersborfer Kalkberge Thiele! Zossen: Speren-berger Gipsberge!! Alt-Landsberg Gae. Br. Am Upstall bei Schulgenborf Sch.! Batlower Müble Rn. Fm. Belvebereberg!! Bieglerberg; Broigsborf: Amalienhof Rn. Mft. Cichwerber; Brunnen Bch.

+ A. Schoenoprasum L. 3m Gebiet nicht einbeimijd. fonbern nur als Ruchenfraut in Garten und zuweilen verwilbert. Go

B. Beim Caupfubl!! Frw. Thiele!

† A. Ascalonicum L. Ruchenfraut aus bem Orient. \* A. Cepa L. Ueberall in Garten gebaut.

### 382. Aspáragus L.

838. A. altilis (L.) Aschs. Sonnige Sugel, Balbranber, gerftreut und theilweise mohl verwilbert. Br. Beferam Schr. B. Birid. beibe Schp. Baumgartenbrud!! Gp. Tegel D. Ra. Königsborft H. S. 2m. Lebmaruben Rt.! B. Fucheberge Bl. bei ber weißen Taube !! Jungfernheibe D. Charlottenburg; Thiergarten Bl. amifchen Wilmersborf und Schöneberg W. M. Br. An ber Buchnit Sch. Mft. Beh. Brunow Bl. Saufig in Garten, auf Medern gebaut.

### \* Hemerocallis L.

\* H. fulva L. Bierpflange aus Gubbeutichland.

### + Múscari Tourn.

† M. botryoides (L.) Mill. Bierpflanze aus Mittelbeutichland; jumeilen an Aderranbern, auf Grasplagen verwilbert. B. Bei Albrechtshof 1857 einzeln!! R. Schlofigarten Gr.!

### 96. Familie. Colchicaceae D. C.

### 383. Cólchicum Tourn.

839. C. auctumnale L. Feuchte Wiefen, febr felten. Br. Bewefin nörblich vom Löttanal weftlich ber Brude Schr.!! Ra. Bei ber Bredower Forst Thiele. Erreicht hier ihre Grenze nach Rord.

### 384. Toffeldia Huds.

840. T. calyculata (L. ex p.) Wahlenb. Wiefen, febr gerftreut. 2m. Wiefen bei Frankenförbe nach Gottsborf zu Rt.! B. Rubower Wiefen baufig!! Nft. Beim großen See Beh.!

# 97. Familie. Juncaceae Bartl.

### 385. Juncus L.

841. J. conglomeratus L. Feuchte Balbfiellen, Graben, Sumpfranber, gemein.

842. J. effusus L. Wie vorige, häufig.

843. J. glaucus Ehrh. Wie bie vorigen, gern auf Lehmboben, weniger häufig. P. Zwischen Bornim und Marquard; am Wannsies Schp.! Na. Walbrand beim Weinberg!! beim Selbelanger Jägerhausse!! Königshorst am Mangelshorster Damm H.S.! Kremmen Jahn; Linum H.! B. Beißense J.! am Hauptgraben zwischen ber Anhaltischen Eisenbahn Hanstein! Tempelhof; Ritborf D. Rudower Wiesen!! R. Zwischen dem Alten Grund und Ribersdorf W.M.! Alt-Landsberg Gae. Wr. An ber Blichnitz Sch. (bei der Malzmühle Sch.!) Rft. Kniedusch; Eichwerder Bch.

844. J. filiformis L. Moorwiesen, selten. B. Wiesen beim Kirchhofe Beh.! Sp. Wiesen nach Bichelsborf bin Caspary! B. Charlottenburg Vogel! Schlächterwiese früher, jett ausgerottet R.

R. Vogel.

845. J. capitatus Weigel. Sandige, seuchte Stellen, Gräben, Sumpfränder, zerstreut. P. Gr. Glienicke Vocke; Pirscheibe Schp. l. Sp. Staaken Körnicke! Kw. Jenseit der Weinderge H. S. II.! Franklenselbe; Frankensörde Rt. Schöneweide am Gänseplan!! Trebbin: 3elle Gr.! B. Nördlich von Weißenseel! zwischen Schol.! Schöneberg südwestlich vom botanischen Garten Schp.!! Tempelhof D. Zossen: 3wischen Kummersdorf und Sperenberg!! Biesenthal: Am Wege nach der Station A. Br.

846. J. articulatus L. Gumpfe, Graben, Ufer, gemein.

847. J. silvaticus Reichard. Wie vorige, weniger häufig. Kremmen: Linum H.! B. Jungfernheibe Winkler! Tempelhof!! Rubower Wiesen!! beim Reuen Krug Bl. Alt-Landsberg Gae. Storstow: Friedersborf H. Rft. Beim Kupferhammer; Graben biesseit bes Oberberger Chausseshauses Bch.!

848. J. atratus Krocker. Moorwiesen, selten, aber wohl mehrsach übersehen. B. Nuthewiesen bei Neuenborf 1857 Bs.!

849. J. obtusiflorus Ehrh. Torffümpfe, Wiesengrüben, User, serftreut. B. Beim Templin D. Na. Königshorst am Graben ber Tarmower Koppel H. S. ! K. Schulzenshöhe Jahn! Tasborf Schl.! Alt Landsberg: Am Bötz-See Gae! Budow: Prithagener Wilhse Sch.! Br. Batlower Biesen Sch. Rft. Beim großen See Bch.!

850. J. alpinus Vill. Sandige, moorige Stellen, Sumpfrinder, zerstreut. B. Golmer Bruch Bs.! Sp. Hundekehle Schp. B. Weißensee!! Jungfernheibe beim Pfefferluch Rei. beim Gesundbrumnen!! Schöneberg Thiele! Rubower Wiesen Bl. Mft. Großer See Bch.!!

851. J. supinus Mnch. Sumpfränder, Moorwiesen, zerstreut. Sp. Teufelssenn!! an der Bestseite des Grunewald-Sees!! Tegel D. B. Beifensee!! Jungfernheide bei den Rebbergen D. beim Pfesser.

luch!! Lantwit Thiele! R. Kth.

852. J. squarrosus L. Sandiger Moorboben, feuchte Walbstellen, zerstreut. Sp. Stadtforst D. Na. Beim Finkenkrug Jockmann! Lw. Bei den Ziegeleien; zwischen Frankenförde und Jülichendors Rt.! Trebbin: Scharsenbrücker Forst Gr.! B. Zwischen Weißensee und Hohen-Schönhausen A. Br.! Vertiesung bei der Pankstraße!! Jungfernheibe Bl. Charlottenburg am Sumpf südwesstlich vom hohlen See!! Rudower Wiesen!! Spreeheide W. M. Nst. In der Rähe der Leuenberger Wiesen! Beh.! Biesenthal: Auf Wiesen nach Lanke bin A. Br.

853. J. compressus Jacq. Feuchte Stellen, an Graben, auf

Biefen, nicht felten.

854. Gerardi Loisl. Wie vorige, nur auf Salzboben, fehr zerftreut. P. Uet westlich vom Dorse Schp.! Na. Zwischen ber Brebower Forst und Zeestow!! beim Selbelanger Jägerhause zahlreich!! Beelit: Salzbrunn P.

855. J. Tenagéa Ehrh. Auf tahlem, feuchtem Lehmboben, an Ufern, in Graben, fehr zerstreut. B. Beißensee nörblich vom Bege nach heinersborf!! Lantwig A. Br.! Tempelhof an ber blanten hölle

Bl. Wr. Batilow Sch.!

856. J. bufonius L. Auf feuchtem Boben, in Graben, ge-

### 386. Lúzula D. C.

857. L. pilosa (L. ex. p.) Willd. Schattige Balbstellen, nicht selten. P. Sanssouci Schp. beim Reuen Palais Ad. Müller! Sp. Am Grunewald-See W. M.! Pichelsberg!! Tegel Kth. Na. Bei der Halteftelle Finkenkrug!! Lw. Rauchenberge Rt. Trebbin: Lenzburg

Gr.! B. Schönhauser Part!! Jungfernheibe!! Thiergarten!! nörblich am zoologischen Garten!! Hasenheibe Kth. R. Am Kaltsee beim Meten Grund!! Mincheberg: Heibetrug!! Bucow: Elpsium!! Fw.

Schlofigrund!! Mft. !!

† L. angustifolia (Wulfen) Gke. Im Gebiet nicht einheismisch, sonbern nur zufällig eingeschleppt. P. Sanssouci einzeln Schp. ? B. Part von Französisch-Bucholz Körnicke! Thiergarten beim Hofsjäger!! \*) und bei ber Rouffeau-Insel Bl. Treptower Part Tittelbach.

858. L. campestris (L. ex p.) D. C. Trodne Balber, Bie-

fen, Biigel, gemein.

b) multiflora Lejeune (als Art). Feuchte, schattige Walbstellen, Sumpfränder, zerstreut. Sp. Am westlichen User des Grune-wald-Sees (mit blasser Blitte) W.M.! Papenberge D. Na. Bredower Forst!! Kremmen: Rhinluch H. Ew. Ziegeleien; zwischen Frankenförde und Felgentren Re.! B. Jungsernheide beim Plötzenset!! Witzleben W.M.! Thiergarten beim Hossiger!! Tempelhof D. süblich von Treptow!! Budow: Pritzhagen Thiele! Fw. Zieglerberg; Alaunwerk Rn. Rst. Lenenberger Wiesen Beh.

# 98. Familie. Cyperaceae Juss. 387. Cyperus L.

859. C. flavescens L. Sumpfränder, ausgetrocknete Gräben, User, auf sandig-moorigem Boben, zerstreut. P. Kaput H.1
Teuselssee bei den Ravensbergen Bs.! Wannse Schp.! Sp. Am
Grunnewald-See!! bei der Hundelehle!! Dr. Liebenwalde Gae.! Beeitz: Elsholz Krumbholz. Lw. Unweit des Weinberges bei Dobbritow Re.! Schöneweide am Gänseplan!! B. Weißensee; Jungfernheide D. am hohlen See viel!! Tempelhof D. Aft. Am Wege nach Britz zwischen dem großen und kleinen See Beh.!!

860. C. fuscus L. Wie voriger, auf Schlamm- und Moorboben, verbreitet, aber oft unbeständig. P. Jenseit des Neuen Palais Bs. Baumgartenbriick Bs.! Sp. Am Grunewald-See auf der Bestseite!! Hundekehle Schp. Tegel Kth. Or. Gae. Na. Königshorst an der Eiskellerkoppel H. S.! Kremmen: Linum H.! B. An der Spree diesseit Stralau Rei.! Weißensee an den Pfühlen beim Chausseedause!! Jungfernheide D. Charlottenburg beim hohlen See Rei.!

<sup>\*)</sup> An berfelben Stelle findet fich bie gleichfalls ber Blora fremde Poa silvatlea Vill., fowie Carex silvatica Huda., welche fonft in ber Nabe Berlins fehlt.

Thiergarten an ben Teichen 1857 Tietz! Audower Wiesen Bl. Br. Batslower Wiese Rn. Fm. Ahrenbstehle Rn. Rft. Chorin A. Br.! bei ben Leuenberger Wiesen Bch.!

### 388. Schoenus L.

861. S. nigricans L. Torfwiesen, febr felten, aber gefellig. R. Siblich von Tasborf R.! Thiele!

### 389. Cládium Patrick Browne.

862. C. Mariscus (L.) R. Br. Seen, Torffümpfe, fehr zerftreut. B. Bewefin im Moor nach Rostow bin Schr. P. An ber nörblichen Seite bes Schlachtenfees!! K. Tasborf Lessing! Alt-Landsberg: Im Bot- und Fanger-See Gae.!

### 390. Rhynchóspora Vahl.

863. R. alba (L.) Vahl ex p. Torffümpfe, sehr zerstreut. B. Philippsthal Bs.! Sp. Zwischen bem Hunbekehlen- und Grunewaldsee!! R. Am Teufelssee bei ben Müggelbergen Rach! Tasborf D. Fw. Baa-Fenn Rn. Rft. Am großen See Bch.!

### 391. Heleócharis R. Br.

864. H. palustris (L.) R. Br. Sümpfe, Gräben, Ufer, gemein 865. H. uniglumis (Lk.) R. u. Sch. Moorwiesen, Sumpfranber, zerstreut. Br. Pewesin Schr. P. Auhsort Bs.! Or. Wiessen füblich von Germenborf Rn! Aw. Felgentreu Rt.! B. Zwischen Rummelsburg und bem Kietg!! Aut-Landsberg Gae.! Aft. Zwischen bem großen und kleinen See Bch.

866. H. acicularis (L.) R. Br. Sumpfränder, an und in Seen, Teichen, nicht selten, 3. B. B. Sp. Teufelssenn!! am Grunewald-See Rei. Tegel D. Or. Liebenwalde Gae.! B. Beis-

fenfee!! Jungfernheibe D. Tempelhof!!

### 392. Scirpus L.

867. S. pauciflorus Lights. Moorwiesen, Ufer, Sumpfränber, zerstreut. Br. Bewesin am löttanal Schr. B. Am südwestl. Ende bes Schlachtenses Rn.! Schp. Sp. Tegel bei der Mithle A. Br. Dr. Wiesen südlich von Germendorf Rn.! B. Vor der Jungfernbeide Sanio! Wilmersdorf Thiele! am Silvand der Schlächterwiese W. M.1 R. Rübersdorf D. Budow: Am See Schl. Rft. Am Kanal; Hohen-Kinow Bch.

868. S. setaceus L. Sumpfranber, Ufer, ausgetrochnete Graben, auf fanbigem Moorboben, zerftreut. P. Jenfeit bes Reuen Palais Bs.! Sp. Savelufer bei Bichelsberg!! Bichelswerber!! Grunewald D. süblich von Tegel A. Br.! Kremmen: Rhinluch H. Lew. Frankenförbe Rt.! Schöneweibe am Ganseplan!! Trebbin: Zelle Gr.! B. Beißensee beim Psuhl nörblich vom Chausseehause!! Jungsernseibe D. am hohlen See W. M.! sübwestlich vom botanischen Garten!! Lankwit A. Br. R. Kth. Rft. Bei ben Leuenberger Wiesen Beh.! am Wege nach Britz zwischen bem großen und kleinen See!!

869. S. supinus L. Wie voriger, selten und meist unbestänbig, ist mehrere Jahre aussetzend. Dr. Liebenwalde Gae.! B. Beissenser am Pfuhl nörblich vom Chaussechause 1845 Garcke! an der Dranke 1852 viel Körnicke! seitdem öfter vergeblich gesucht; Lank-

wit 1855 A. Br.!

370. S. lacustris L. Geen, Graben, Bluffe, haufig.

871. S. Tabernaemontáni Gmel. Sümpfe, Gräben, besondrs auf Salzboben, zerstreut. Br. Pewesin Sp. B. Uet Hanstein' Sp. Bei den Papenbergen D. Ra. Zwischen der Bredower Forst und Zeestow!! beim Selbesanger Jägerhause!! Königshorst an der Tarmower Koppel H. S. Beelity: Salzbrunn P. B. Weispenfer; Jungfernheide; Tempelhof D. zwischen dem Buschrug und dem Forstlause Ober-Rigdorf W. M.! K. Tasborf D. Alt-Landsberg: Krummensee Gae.!

82. S. Holoschoenus L. Sanbige, niedrige Triften in ber Mibe größerer Gewässer, sehr selten, aber gesellig. P. Um öftlichen Savelufer, Werber gegenüber und von bort gegen Geltow bin!!

8'3. S. marítimus L. Gräben, Simpfe, Ufer, zerstreut, gern auf Schoben. Br. Pewefin!! P. Jenseit bes Neuen Palais Weiland! an ben Seen bei Werber Schr. Sp. An ber Havel nach Pichelsbor hin R. süblich von Pichelsberg!! Na. Briefelang D. Damm wischen bem Weinberg und Dreibriden H. beim Selbelanger Jägerhause! Seelenhorst H. S.! Beelitz: Salzbrunn Rt.! Trebbin Gr. B. Am inken Spreeuser unterhalb Charlottenburg Bl. Zossen: An ber Nott Gr.

b, monostáchyus. Mit ber Hanptart, auf Salzboben. Na. Dammnordwestl. v. Weinberg Schr. beim Selbelanger Jägerhause!! 874. S. silváticus L. Gräben, Sümpse, zerstreut. Br. Schwienabei Lehnin Rt.! P. Ablage beim Tornow Bs. Sp. Grusuwald D'Papenberge Schl.! Dr. Herteselb Hanstein! Na. Berge Bs. Dechton H. S.! Kremmen: Linum H.! Beelit: Elsholz Krumbholz. B. Eiblich von Borhagen!! am Graben bei ben Fuchsbergen!! an ber Packe bei ber Löffelbricke Rei. an einem Sumps westlich von Rieber-Schnhausen!! Schöneberger Busch Bl. an ber Chausse biets seitt bes Buchtruges!! zwischen bem Buschtruge und bem Forsthause Ober-Rigbof W. M. Neuer Arug Gr. Wr. Upstall bei Schulzendorf

Rn. Aft. Am Kanal; an ber Schwärze; Graben am Beibendumm Beh.

875. S. compressus (L. erweitert) Pers. Wiesen, Tisten, User, zerstreut. Sp. D. an der Sübseite des Grunewald-Sees U. M.! Staalen; Heiligensee D. Tegel an der Chaussee süblich von der Mible!! Ra. Zwischen der Bredower Forst und Zeestow!! üblich am Lindholz Sehr. Mangelsborft H. S.! Gr. Bähnitz am nordössichen Ende des Sees!! B. Zwischen Rummelsburg und dem Lichtnerger Kietz Sehp.! Jungsernheide D. Charlottenburg Kth. Wilmesbors D. Köpnider Heibe Kth. K. Am Kalkse nördlich der Schuse!! Alt-Landsberg Gae.! (Wr. Am Malzmühlgraben Sch.) Rft am Bege bei der Kalmusbriide Beh.

876. S. rufus (Huds.) Schrad. Salzhaltige Triften, set seben. Nur Na. Süblich vom Selbelanger Jägerhause!! zuerst von k.

gefunden.

### 393. Erióphorum L.

877. E. vaginatum L. Torfsümpfe, zerstreut. P. Nuthwiesen Bs. bei den Ravensbergen Ad. Müller! Sp. Grunewald!! Etabtsorst; Tegler heibe D. Ra. Bredower Forst!! Trebbin: Kunmersborfer Forst Gr. B. Jungfernheibe!! Spreeheide Schl. Alt-Andsberg Gas. Storkow: Im kleinen Scaby-Luch H. Buctow: Li der Prithkagener Dühle Sch. Fw. Baa-Fenn Rn. Rst. Am profen See Bch.

878. E. polystáchyum L. ex p. Torffümpfe, Moowiesen,

häufig.

879. E. latifolium Hoppe. Wie voriges, zerstreut Ep. Torffumpf zwischen bem Grunewald- und Hundekehlen-Seel Lw. Frankenselbe Rt.! B. Jungfernheide D. Wilmersdorf Thieel sid vom Buschtrug!! A. Bei Schulzenshöhe unweit Rübesbors!! Strausberg: Beim Forsthaus Schlag Gae.! Br. Batlower Wiesen Sch. (am Malzmühlgraben Sch.) Nft. Am großen See Bc.

880. E. gracile Koch. Torfjümpfe, sehr zerstreut. P Zehlenborf im trummen Fenn!! Sp. Grunewalb!! B. Destlich vn Französisch-Buchholz!! Sümpfe süblich der Jungsernheide! Lankwiz Thiele! K. Tasborf D. Strausberg: Beim Forsthaus Schlag Gae.! Budow:

Bei ber Prithagener Mihle Sch.

#### 394. Carex Micheli.

881. C. dioeca L. Torf- und Moorwiesen, sehr zestreut. P. Bei ber Friedrich-Wilhelmsbrücke Vocke! Sp. Sumpf nedlich vom Grunewald-See!! Tegel Kth. B. Zwischen Rummelsbur und bem Riet R.! Jungfernheibe Schl.! Rubower Wiesen beim Buschtrug!!

und filblich ber Spreeheibe!! R. Tasborf D. Alt-Landsberg Gue. Budow: Bei ber Brithagener Milble Sch. Br. Batlower Mible Sch.! Rft. Kinow-Wiesen nach bem Rupferhammer bin Bch.! amiichen bem großen und fleinen Gee Beh. Biesenthal: In einem Sumpf nördlich vom Bege nach Lante A. Br.

C. Davalliana Sm. Sumpfwiesen, febr felten und zweifel-

haft. B. Bitleben 1820 D. ! ob noch jett?

882. C. pulicaris L. Moorwiesen, febr felten, aber gesellig. Dr. Biefen amifden Germenborf und bem Garnow rechts bom Bege nach Rremmen Rn. !

883. C. chordorrhiza Ehrh. Torffimpfe, febr felten. B. Jungfernheibe füblich vom Ranal in ber Rabe bes Blobenfees R.!

in neuerer Beit noch nicht wieber gefunben.

884. C. disticha Huds. Sumpfwiesen, Ufer, Graben, nicht felten. Br. Beferam!! B. Sanssouci; Ablage Be. Sp. Am Grunewalb!! Dr. Liebenberg Hanstein! Ra. Fintentrug W. M.! große faule Latel! Königsborft!! Torfftich nörblich bes Lindbolges!! Kremmen: Linum H.! B. Bei ben Fuchsbergen Schp.! Doabit Bl. am Ranal vor bem Rottbuffer Thor!! Bufchfrug Thiele! an ber Spreebeibe W. M.! Alt Canbsberg Gae. Br. Bei ber fleinen Daible Sch.! Mit. Bei ber Ralmusbrude Bch.

885. C. arenaria L. Flugfant, fanbige Ufer, häufig, g. B. B. Berber gegenüber an beiben Savelufern!! Beblenborf!! Gp. Bichelsberg! Ra. Beinberg; Jahnberge H. S. &w. H. S. II.! Bwifden Borhagen und bem Lichtenberger Riet!! Fucheberge!! amiichen Moabit und ber Jungfernbeibe!! beim boblen Gee!! fubmeftlich vom botanifden Garten!! Mft. Bornemannspfuhl Beh.

886. C. vulpina L. Graben, Sumpfwiefen, haufig. 887. C. muricata L. Trodnere Biefen, feuchte Balbstellen, nicht felten. B. Tornow Winkler! Gp.; Tegel Kth. Dr. Liebenberg Hanstein! Ra. Bei ber Salteftelle Kintentrug!! Linbholg!! Roniasborft H. S. Bei ben Fuchsbergen Schp.! Friedrichshain J.!! Jungfernheibe D. zwischen bem Spanbauer Bod und Bichelsberg!! Thiergarten Bl. Tempelhof fliblich am Rirchhof W. M.! Treptow Kth. Alt-Landsberg Gae. Rft. Balb nach Commerfelbe bin!!

888. C. teretiúscula Good. Torfwiefen, febr gerftreut. B. Teltow C. Bouché sen.! Sp. Grunewalb!! Stadtforft D. Kremmen: Rhinluch H. B. Friedrichsfelbe D. Jungfernheibe!! Buichfrug Thiele! Mft. Wiesen nach bem Rupferhammer bin; Ralmusbrude Beh.

889. C. panniculata L. Gumpfe, Ufer, Torfwiesen, gerftreut. Gp. 3m. Baulsborn u. bem Rhinmeifter-Gee!! Bavelufer bei Bichelsberg Bl. Bichelswerber; Beiligensee D. Na. Falfenhagen D. B. Gublid vom Lichtenberger Riet!! Modernit beim Ronigsbamm!!

Bitleben W. M. ! R. D. Alt-Landsberg Gae. Fw. Bei ber Ba-

piermuble Rn. ! Mft. Brunnen; Bainhammer Beh.

890. C. paradoxa Willd. Wie vorige, zerstreut. Sp. D. zwischen bem Grunewald-See und ber Hundelehle W. M.! Dr. Rn.! Kremmen: Rhinsluch H.! B. Nördlich vom Lichtenberger Kietz stäch! öftlich von Französisch-Buchholz Körnicke! Jungsernheibe sith vom Kanal, in der Nähe des Plötzensees! und Mödernit beim Königsdamm!! (hier zuerst von Willdenow entbeckt und beschrieben.) Bigleben W. M.! R. D. Alt-Landsberg Gae. Br. Batsower Wiese Rn. Rst. Leuenberger Wiesen Bch.

891. C. Schreberi Schrk. Trodne Balber, Higel, nicht selten. P. Baumgartenbriid!! Tornow Winkler! Brauhausberg Bs.! Sp.; Pichelsberg D. Pichelswerder!! Grunewalb!! Na. Bredower Forst!! Lindholz!! B. Fuchsberge!! Jungfernheibe!! Hafenheibe D. Köpnider heibe W. M.! R. Müggelberge!! Alt-Landsberg Gae.

Fr. Baichenberg Beh.

b) gracillima. Trodne Laubwälber, felten, aber gefellig. Ra. Brebower Forft, ben Boben an einigen Stellen gang liber-

giebenb !!

892. C. ligerica Gay. An ähnlichen Orten, wie C. arenaria L. und meist mit bieser, etwas seltener. P. Zwischen Zehlenborf und ber Forst!! Sp. Schibhorn Schp. 1 B. Fuchsberge!! (hier zuerst von A. Br. entbeckt) westlich am zoologischen Garten!! Hasenbeibe Hl. !

893. C. brizoides L. Schattige Laubwälber, febr felten.

Rur Fm. Bieglerberg Rn.!

S94. C. remota L. Laubwälber, an schattigen und quelligen Stellen, sehr zerstreut. Sp. Papenberge!! Tegel D. Dr. Stroßberge Rn.! Liebenberg Hanstein! Na. Beim Fintentrug Sanio! beim Forschaus Briefelang W. M.! Beelit: Wittbrieben Rn.! B. Jungsfernheibe R. Alt-Lanbsberg Gae. Fw. Brunnen; Ahrendskehle; Schlößgrund Rn. Köthen im Wasserthau!! Rft. Brunnen!! und an ber Schwärze auswärts bis Spechthausen; Lenenberger Wiesen Bch.

895. C. echinata Murr. Silmpfe, feucht Walbstellen, nicht selten. P. Kaput Hanstein! Al. Machenow Ad. Müller! Sp. Grune-wald!! Stadtforst; Tegler Heide D. Ra. Weg zwischen der Haltesstelle und bem Finkenkrug W. M.! Lw. Beim südlichen Kirchhof Re.! Trebbin: Scharsenbrider Forst Gr.! B. Jungfernheide!! Tempel-hof Kosa! Köpnicker Heide D. Alt-Landsberg Gae. Fw. Sonnenburg Sch. Rf. Bei der Kalmusbriide; am kleinen See Bek.

896. C. leporina L. Moorwiesen, feuchte Balbstellen, nicht selten. Sp.; Grunewalb; Beiligensee D. Na. haltestelle Finkentrug!! Lw. Frankenfelbe Rt.! Trebbin: Scharfenbruder Forst Gr.!

B. Wiefen beim Lichtenberger Riet Sehp.! Rolonie Doben-Schonbaufen!! fublich ber Drante an einem fleinen Gumpf!! Jungfernheibe bei ben Rebbergen!! Thiergarten Vogel! beim boblen Gee!! Tempelhof!! zwischen Rixborf und bem Buschtrug W. M.! Röpnider Beibe Schl. Alt: Landsberg Gae. Fm. Sonnenburg Sch. Rft. Oberheibe besonbere bei ben Leuenberger Wiesen Beh.

b) argyroglochin Hornemann (als Art). Wie bie Sauptart, viel feltener. B. Biefen norblich von Bilmereborf W. M.!

897. C. elongata L. Feuchte Balbftellen, Sumpfranber, gerftreut. B. Ruthewiesen Be. Gp. Teufelsgraben bei Bichelsberg!! Grunewalb D. Ra. Gilbrand ber großen faulen Late beim Finten-trug!! Kremmen: Rhinluch H.! B. Frangofijch-Buchholg Körnicke! Jungfernheibe in ber Dodernit!! Thiergarten W. M. Schoneberg Krauss! Köpnider Heibe D. Alt-Landsberg Gae. Bucow: Prits-hagen Schl. Rft. Brunnen; Zainhammer Beh. 898. C. canoscons L. Walbsimpse, Gräben, zerstreut. Sp.

Am Teufelsfenn!! und im Teufelsgraben!! Grunewalb !! Rremmen: Rhinluch H. Ew. Lehmgruben Rt.! Tobtenschenke H. S. II.!! Trebbin: Scharfenbrilder Forft Gr.! B. Jungfernheibe!! Thiergarten Vogelt Röpnider Beibe Scht. Alt-Landsberg Gae. Budow: Prits-hagen Scht. Rft. Zainhammer; zwischen bem tleinen und großen

Gee Bch.

899. C. stricta Good. Tiefe Gumpfe, nicht felten, 3. B. B. Zwijden bem Bilbpart und ber Berberichen Fahrstelle!! Gp. Grunewald!! Ra. Un ben tieferen Stellen bes großen havellandischen Luches in ungeheurer Menge, hauptsächlich bie sogenannten "Billen" bilbenb!! E. Riebelhorft P. B. Jungfernheibe!! Schöne-berger Fenn Bl. zwischen Rixborf und bem Forsthaus Ober-Rixborf!! Alt-Landsberg Gae. Mft. Brunnenpromenabe; großer Colangenpfubl Beh.

900. C. caespitosa L. Moormiefen, Balbfilmpfe, febr gerftreut, aber mobl mehrfach überfeben. Da. Große faule Late beim Kintenfrug!! bier 1856 von A. Br. querft für bas Bebiet entbedt. B. Wiesen nörblich vom Lichtenberger Riet Schp.! J.!! Diodernit beim Königsbamm 1858!! Ronnenwiesen einzeln W. M.!! Dit. amifchen ber Borftabt und Dobberts Garten; beim Beibenbamm Beh. Biefen öftlich von ber Stadt am Bege nach bem Gichwerber!! gwiichen bem fleinen und großen Gee Beh.!

901. C. Goodenoughii Gay. Biefen, Silmpfe, Ufer, gemein.

b) melaena Wimm. (als Art). B. Zwischen Beifensee und Boben-Schönhaufen A. Br.!

c) chlorocarpa Wimm. (als Art). Zehlenborf unweit ber

Saltestelle A. Br.!

d) turfosa Fr. (als Art). Torffümpfe, selten, aber wohl mehrsach übersehen. Sp. Zwischen bem Grunewalb- und Hundekehlen-See A. Br.!!

902. C. gracilis Curt. Wie vorige, nicht felten.

b) prolixa Fr. (als Art). Na. Große faule Lake beim Fin-

tentrug A. Br.!

903. C. Buxbaumii Wahlenb. Mäßig feuchte Wiesen, sehr zerstreut. Na. Brieselang R.! Bouché! Kremmen: Rhinluch H.! B. Rubower Wiesen A. Br.!! Mft. Wiese beim Spittel Ilse; alter

Wafferfall Beh.!

- "904. C. limosa L. Torffümpfe, zerstreut. -B. Nuthewiesen Bs. Zehlendorf im krummen Fenn Jahn!! Sp. Grunewald!! Kremmen: Rhinluck H. B. Jungsernheide beim Plötzensee, süblick vom Kanal!! Tempelhof D. K. Tasborf D. Alt-Landsberg Gae. Bucow: Bei ber Prighagener Mühle Sch. Rft. Kalmusbriicke Bch.! zwischen bem großen und kleinen See Bch.!! Biesenthal: Am Wege nach Lanke A. Br.
- 905. C. supina Wahlend. Trodne Bälber, sonnige Higel, meist D, nur im Havel- und Obergebiet, zerstreut, aber gesellig. B. Neblig, zwischen ber Chaussee nach Spandau und der Krampnitz Hanstein! Ruinenberg Bl. Wildpark beim baierischen Häuschen Schp.! Baumgartenbriid össtich vom Weinberg!! Sp. Pickelswerder!! (hier zuerst von R. silr das Gebiet entbeckt); Pickelsberg!! Schilbhorn Hanstein!! am Teufelssenn Schp.!! Ra. Piepenberge in der Bredower Korst A. Br.!! Budow Bch. Fw. Paschenberg unter der Karlsburg Beh.!!
- 906. C. pilulifora L. Laub- und Nabelmälber, besonders an Sumpfrändern, nicht seiten. B. Authewiesen Bs. Sp. Grunewald!! Papenberge!! Ra. Haltestelle Finkentrug!! Lindholz!! Lw. Zinnaiche Forst Re.! Trebbin: Scharsenbrücker Forst Gr.! B. Jungfernheide!! Thiergarten D. Spreeheide W. M. K. Wald nach Friedrichshagen hin W. M.! Alt-Landsberg Gae. Fw. Sch. Rft. Zainhammer; Oberheide Bch. Cichwerder!!

907. C. tomentosa L. Mäßig feuchte Wiesen, nur an ber Bestigrenze bes Gebiets. Br. Pewesiner Biesen nörblich vom Lös-

tanal westlich ber Briide Schr.!!

908. C. montana L. Schattige Wälber, besonders unter Laubholz, sehr zerstreut. Sp. Grunewald D. Na. Faltenhagener Heibe
D. B. Jungsernheibe zwischen dem Plötzensee und den Rehbergen
1855 A. Br.!! Johannisthal Thiele! Alt-Landsberg Gae. Fw. Pa-

pengrund; beim Turnplat Rn.! Rft. Beim Schutenhause; beim

Befundbrunnen Beh. !! Spechthaufen Beh.

909. C. ericetorum Poll. Trodne Balber, häufig, 3. B. P. Brauhausberg Sanio! Sp. Pichelsberg Bl. Grunewalb!! Stabtsorft!! Kremmen: Bei ber Linumer Ziegelei H.! B. Huchsberge!! beim Gasthof zur weißen Taube!! Jungfernheibe!! beim Spanbauer Bod!! nörblich am zoologischen Garten!! K. Erkner!! Br. Berge Sch. Mt. Destlich vom Schanzenberg!! Oberheibe; Waldweg nach bem Brunnen Bch.

910. C. praecox Jacq. Wie vorige, häufig, 3. B. B. Baumsgartenbrud!! Sp. Pichelswerber!! Grunewald!! Stabtsorst D. Na. Bredower Forst!! Lindholz!! B. Schönhauser Parl W. M.! Jungsfernheide!! nörblich am zoologischen Garten!! Köpnicker Heide D. K. Rahnsbors!! Erkner!! Alt-Landsberg Gae. Bucow: Clysium!! Wr. Berge Sch. Büchnit bei Möglin Rn. Nft. Destlich vom Schan-

genberg !! Oberheibe; Balbmeg nach bem Brunnen Bch.

b) umbrosa Host. Schattige Balbstellen, gerstreut. Sp. 3n ber Gegend von Lichelsberg Hanstein! B. Jungferuheibe!!

911. C. humilis Leyss. Trodne Walbstellen, jonnige Higel, meist D, nur in ber Havels und Obergegend, sehr zerstreut. B. Sanssouci Bs.! Baumgartenbriid auf ben Higeln zwischen bem Wirthshause und bem Weinberg Krumbholz!! Bucow: Prithagen Sch.! Rn.! hier zuerst im Gebiet von Walter entbedt. Fw. Schmiebes

berg Rn. füblich vom Maunwert Rn.!! Bafchenberg Bch.!!

912. C. digitata L. Laubwälber, Gebülche, sehr zerstreut. P. Sanssouci; zwischen Tornow und Templin Bs.! Sp. Bichelsberg Bouche; Papenberge Kth. Dr. Rn.! Liebenberg im Park Hanstein! Ra. Süblich vom Forsthaus Brieselang W. M.! Bredower Forst A. Br.!! B. Schloßgarten bei Charlottenburg R. K. Am norböslischen Ufer bes Kalkses beim Alten Grund!! Strausberg: Blumenthal Kr. Müncheberg: Heibekrug!! Budow: Im Elpsium!! Hw. Brunnen Rn. Teufelsbrücke Rn.!! Köthen Rn. Nst. sehr häusig, z. B. unter bem Schligenhause!! beim Brunnen!!

913. C. panicea L. Feuchte Biefen, Sumpfranber, häufig.

914. C. glauca Scop. Wiesen, Ufer, Gebüsche, zerstreut. Br. Bewesin!! Sp. D. bei Paulsborn W. M.! Na. Wiesen nördlich vom Fintentrug!! westlich der Bredower Forst!! Kremmen: Tietow!! Rhinfuch H.! Led Ledwissen Rt.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Wiese vor dem Franksurter Thor Vinkler! Französisch-Buchofz!! Bungfernheide beim Plögensee südlich vom Kanal Winkler!! Wilmersdorf Thiele! Rudower Wiesen Körnicke! Alt-Landsberg Gae. (Br. Am Malzmühlgraben Sch.) Rst. Eichwerder!! großer Schlangenspsuh; Leuenberger Wiesen Bch.

915. C. maxima Scop. Feuchte Gebuiche, febr felten. Sp. Am Ranbe ber Savelwiesen nach ben Babenbergen bin D.!

916. C. palloscons L. Schattige Wälber, Biesen, zerstreut. Sp. D. Papenberge Thiele! Or. Liebenberg Hanstein! Na. Zwischen ber Hantelelle und ber großen sausen Late beim Finkenkrug!! B. Wiesen bei Borhagen Rei.! Jungsernheibe D. zwischen bem Spandauer Bod und Pichelsberg!! Thiergarten beim Hofiger!! Nubom; Treptom D. Alt-Landsberg Gae. Budow: Prithagen Sch. Fw. Sonnenburg Sch.! Schlösgrund Rn.! Nst. Leuenberger Wiesen; Zainhammer; Eisenhammer Boch.

917. C. flava L. Moorwiesen, zerstreut. Br. Schwiena bei Lehnin Rt.! Or. Zwischen Reu-Holland und dem Liebenberger Busch Hanstein! Na. Beim Finkenkrug!! Bredower Forst Schr. Br. Wiesen beim Buschkrug!! K. Schulzenshöhe bei Rüdersborf!! Tasborf Schl. Alt-Landsberg Gae. Bucow: Britzbagen Schl. Ast. Leuen-

berger Biefen Beh.

b) Ood éri Ehrh. (als Art). Wiesen, Sumpfränder, Ufer, nicht selten; z. B. Sp. Grunewald!! Ra. Große faule Late!! Pau-linenau!! Königshorst H. S.! Kremmen: Rhinluch H. Lw. Beim Kirchhof Rt.! B. Frangösisch-Buchbolz Kr. Jungfernbeibe!! Ru-

bower Biefen!! "Rft. Leuenberger Biefen Boh.

918. C. distans L. Mäßig feuchte Biesen, gern auf Salzboben, zerstreut. Br. Pewesin!! B. Uet Schp.! Sp. Pichelsberge Kth. Papenberge D. Na. Haltestelle Fintentrug W. M.! und große saule Lake!! am südwesklichen Rande des Lindholzes!! Königshorst: Karpsenteicksoppel H.S.! Kremmen: Tietzow!! Rhinluch H.! T. Niedelhorst P. Lw. Frankensöbe Rt.! Schöneweide Gr.! B. Wiesen zwischen der Stadtmauer u. Borhagen!! Jungsernheide D. Schöneberg Thiede! Ruddow Welen!! Alt-Landsberg Gae. Bucdow Sch.! Wr. Beim Spring Sch. Fw. Bei der Papiermilhse Rn.! Mft. Westelich von der Berliner Chausse am Fuse des Schanzenberges Bch.!!

919. C. fulva Good. Feuchte Biefen, fehr zerstreut. Ra. Biefen nörblich vom Finkenkrug zahlreich!! Kremmen: Linum H. B. Destlich von Frangösisch - Buchholz Körnicket Rubower Wiefen

Garcke!

920. C. silvática Huds. Schattige Laubwälber, gern auf quelligem Boben, öfter mit C. remota L., sehr zerstreut. Sp. Papenberge; Tegel D. Or. Liebenberger Parl Hanstein! Ra. Beim Finkentrug Sanio! B. Thiergarten beim Hossäger einzeln!! (woh! eingeschleppt). Fw. Baa-See; Falkenberg bei der Papiermühle Rn.! Köthen im Wasserthal!! Rst. Eichwerder; bei den Leuenberger Wiesen Boh. beim Brunnen Boh.!! beim Zainhammer; Spechthausen Bok.

921. C. Pseudocyperus L. Sümpfe, Gräben, Ufer, zersftreut. B. Ruthewiesen bei Drewitz Bs. Sp. D. am Grunewaldssee!! Tegel am See A. Br.! Kremmen: Linum H.! Lw. Franskensörbe Rt.! Trebbin: Schulzenborf Gr.! B. Jungfernheibe am Kanal!! und östlich am Psefferluch!! zwischen bem Spanbauer Bod und Pichelsberg!! am Hauptgraben nörblich von Wilmersborf W. M. Tempelhof süblich vom Gute!! zwischen Rirborf und Forsthaus Oberskiedors!! Aubower Wiesen!! Alte-Landsberg Gae. Wr. Kagensee bei Möglin; Batslower Wiese Rn. Ast. Beim Zainhammer Beh. beim alten Wassersall W. M.! zwischen bem kleinen und großen See Beh.

922. C. ampullacea Good. Torffümpfe, zerstreut. B. Bs.!
Sp. D. Grunewald!! Papenberge D. Rremmen: Linum H.! B.
Rummelsburg D. Jungfernheibe Kth. Alt-Landsberg Gae. Rft.

Leuenberger Biefen Beh.

923. C. vesicaria L. ex p. Sumpfwiesen, Gräben, nicht selten. Sp. D. Pichelsberg an ber Havel!! Grunewald!! Papenberge D. Na. Große fause Late beim Finkenkrug!! nörblich vom Hinkenkrug W. M! Kremmen: Bei ber Linumer Ziegelei H.1 B. Rummelsburg; Friedrichssselbe D. Beißense bei der Orankel! Jungfernheide D. Thiergarten Tietz! Hauptgraben östlich der Votsbamer Eisenbahn W. M.! zwischen Rigborf und Forsthaus Ober-Kirdors!! Treptow D. K. Rabenstein-Mühle W. M.! Alt-Landsberg Gae. Fw. Sonnenburg Sch. Rft. Leuenberger Wiesen Bch.

924. C. paludosa Good. Sumpfwiesen, Gräben, nicht selten, z. B. Sp. Grunewalb!! Ra. An ber großen faulen Lake beim Finkenkrug!! süblich von Lobeossund H. S. ! Kremmen: Tietzow am neuen Damm!! Linum bei ber krummen Horst H.! B. Beim Lichtenberger Kietz Schp.! am Plötzense!! Wigleben!! Thiergarten; Schpeneberg Bl. Köpnicker Weg, Treptow gegenüber W. M.! A. Rabenstein-Müble W. M.! Alt-Landsberg Gae. Br. Möglin Sch.! Aft.

Biefen nach bem Gichwerber bin!!

925. C. riparia Curt. Gräben, Ufer, Balbstümpfe, nicht seleten. P. Nörblich vom Wildpart!! Sp. D. zwischen Dallgow und Seegefeld!! Na. Finkentrug W.M.! Lindholz an der Eisenbahn!! Nordhof am Dammgraben H. S. Lw. Nach Lindenberg hin H. S. II.! Bei den Fuchsbergen D. Jungsernheibe am Spandauer Beg W.M.! gegenüber der Tichyschen Badeansalt Bl.! Treptow D. Altsandsberg Gae. Nft. Am Kanal; an der Schwärze Bch.

926. C. filiformis L. Torffümpfe, sehr zerstreut. Sp. Grunewald!! Stadtsorst D. Kremmen: Linum H.! B. Jungsernheibel! Tempelhof Kih. Alt-Landsberg Gae. Fw. Sonnenburg Sch.! Rst.

Am großen Gee; Forsthaus bei Trampe Bch.

927. C. hirta L. Feuchte Sanbstellen, Biefen, häufig.
b) hirtaeformis Pers. (als Art). Wie bie hauptart, viel feltener. B. Saupfubl Kth. Tempelbof Schl. 917 x 919. C. flava x fulva. Ra. Briefelang D.!

## 99. Familie. Gramina Juss.

#### \* Zea L.

\* Z. Mays L. Aus Amerita; bier und ba in Menge gebaut.

#### 395. Pánicum L.

928. P. sanguinale L. Auf Canbboben, an Wegen, auf Medern, befondere im Gartenlande, gerftreut. B. Babelsberg Be. Da. Königshorft; Gr. Babnit Gr.! Em. Am Wege nach Gottom!! B. In Garten innerhalb ber Stadt!! Bilmereborf Thiele! Schoneberg!! Sandwege in ber Safenheibe!! an ber Spreeheibe W. M. Mft. An ber Gifenbahn nach bem Zainhammer bin Bch.

P. ciliare Retz. Bie voriges, febr felten und zweifelhaft. Mur Ra. Bei Gr. Babnit Walter! ob noch jest? vielleicht nur ein-

mal zufällig eingeschleppt.

929, P. filiforme (Koeler.) Gke. Sanbfelber, fanbige Bege, bäufig.

930. P. orus galli L. Feuchte Neder, Begränber, häufig. + P. miliacoum L. Aus Afien; hier und ba gebaut und

jumeilen auf Schutt, an Begranbern einzeln verwilbert.

#### 396. Setária P. B.

931. S. verticillata (L.) P. B. Gartenland, Baune, febr gerftreut, urfprünglich wohl nicht einheimisch. B. Bornim Schp.! Werber Schr. Gp. D. Alt-Landsberg: Frebersdorf im Bfarrgarten Gae.! Fr. Un Baunen beim Brunnen!!

932. S. viridis (L.) P. B. Sanbige und fanbig-lehmige Meder,

Gartenland, gemein.

933. S. glauca (L.) P. B. Meder, befonbere auf fanbigem Lehmboben in D, nicht felten, 3. B. B. Behlenborf!! Gp. Rubleben Winkler! Ra. Gliblich ber Stadt!! B. 3mijden Wilmereborf und Schöneberg!! an ber Anhaltischen Gifenbahn gwifden Schoneberg und Tempelhof!! fiblich von Tempelhof!! Fm. Beinberg!! Rft. Sinter bem Rirdhof; Drachentopf Beh.!

\* S. italica (L.) P. B. erweitert. Aus Gub-Europa. Dur an ber Beftgrenze Da. Bufchow Schr. in größerer Menge gebaut,

fonft nur bier und ba in Garten.

#### 397. Phálarís L.

934. P. arundinacea L. Sumpfwiesen, Graben, Ufer, nicht felten.

b) picta. Bierpflange in Garten.

† P. canariensis L. Stammt aus Silb-Europa; hier und ba in Görten gebaut und zuweilen auf Schutt in Menge verwilbert, boch selten beständig. B. Leipziger Straße; Bornsteb Bs.! jenseit bes Neuen Palais Bs. An der Chausse zwischen Beelig und T. An. B. Boigtland Bl. Seegerscher Holzplatz Bl.! Schutskelle bei der w. d. hepdt-Brücke W. M.! in der Stadt an Rinnsteinen in der Leipziger Straße zuweilen zahlreich, doch wegen der Straßenreinigung selten zur Blüthe kommend Bl.!! Rft. Bch.!

### 398. Hieróchloë Gmel.

935. H. odorata (L.) Wahlenb. Mäßig feuchte Wiesen, sehr zerstreut. Rur A. B. Reuer Garten am Jungfern Gee Hanstein! am rechten haveluser oberhalb Baumgartenbriid Sanio! an ber has vel bei ber Ablage Bs.! Ep. Nordostseite von Vichelswerder Schp.!! bei ben Pichelsbergen D. Tegel am See A. Br.! Henningsborf D. Dr. Am Grabow-See Rn.! B. Wiesen am Kanal zwischen ber Kottsbusser und Schlesischen Etraße (besonders am nörblichen Ufer) Sickenberger!! an der Chausse jenseit Treptow Caspary!! K. Jenseit bes Bunzelschen Etablissements Gr.!

#### 399. Anthoxanthum L.

936. A. odoratum L. Biejen, feuchte Balbftellen, fehr häufig.

## 400. Alopecúrus L.

937. A. pratensis L. Biefen, fehr häufig.

† A. agrestis L. Im Gebiet nicht einheimisch, sondern nur eingeschleppt und verwilbert. P. Auf bem Bornstedter Felb einmal gablreich Beh.! Wr. Frankenfelbe, gebaut und verwilbert Sch.!

938. A. geniculatus L. Feuchte Wiesen, Ufer, Sumpfranber, nicht selten, z. B. Na. Schmiebetoppel bei Königshorst H. S. ! Kremmen: Tietow!! Linum H.! B. Wiesen östlich ber Scharfrichterei!! am Kanal zwischen ber Kottbuffer und Schlesischen Straße!! silböstlich von Ripbors!! Ast. Weg nach bem Cichwerber Bch.

939. A. fulvus Sm. Bie voriger, nicht selten, 3. B. Na. Am Lindholz H. S.! Lw. Lehngruben Re.! B. An ben Huchsbergen Rei. bei ber Dranke!! bei ber unteren Kanalschleuse!! zw. bem zoologischen Garten u. Wilmersborf!! Wiese an ber Potsbamer Eisenbahn biesseit Schöneberg W. M. Rft. Weg nach b. Eichwerder Bch.

#### 401. Phleum L.

940. P. Boehmeri Wib. Sonnige Higel, trodne Wälber, zerstreut, meist in D. Br. Eiskutenberg bei Gr. Kreut Schr. K. Sanssouci bei der Windmilhle Schp.! Baumgartenbrika!! Sp. Grunewald!! Na. Brieselang!! Jahnberge!! Dechtower Kiefernheibe H. S.! B. Huchsberge!! Grasplätze vor dem Schosse in Charlottev burg!! Steglit D. Wilmersdorf Bl. Aursührstendamm W. M. Tempelhof D. Rollberge Schp.! jenseit Treptow D. K. Tasborf Schl. Wr. Rathsborf Sch.! Hw. Paschenberg!! Nst. Bei der Sommerselder Windminkse!! Schlienhaus; Brunnen Bch. Biesenthal: Lank Schl.

b) viviparum. Schattige Stellen. Ra. Um Bege zwijchen bem Finkenkrug und Forsthaus Briefelang jährlich, zuweilen in

Menge A. Br.!!

941. P. pratense L. Biefen, häufig.

b) nodosum L. (als Art). Trodne hügel, Balber, nicht häufig, aber wohl vielfach übersehen. P. Wildpark Schp.

## 402. Cýnodon Rich.

942. C. Daotylon (L.) Pers. Sandige Triften, Higel, sehr selten, aber gesellig. Nur P. Baumgartenbrild am Fuße ber Higel nahe bem Wirthshause am Wege nach Kaput!! zuerst von R. ent bedt; auf bem linken haveluser bei Werber R.

#### 403. Léersia Solander.

943. L. oryzoides (L.) Sw. Ufer, Sumpfwiesen, sehr zerstreut, aber wohl wegen ber seltenen Blüthenentwickelung mehrsat übersehen. B. Bei der Ziegelei unweit der Pfauen-Insel Vocke. Sp. Am Grunewald-See dem Schlosse gegenüber Vocke!! Tegel Schl.! Dr. An der Havel, der Badestelle gegenüber Rn.! B. Rummelsburg D. Charlottenburg Kth. am Kanal v. d. Kottbuffer Thor Bl.

## † Polypógon Desf.

† P. monspeliensis (L.) Desf. Zuweilen auf Aeckern unter Serrabella mit ausgesäet, so B. Zwischen Schöneberg und Steglit 1857 Garcke.

## 404. Agrostis L.

944. A. vulgaris With. Wiefen, feuchte Walbstellen, baufig. 945. A. alba L. Wie voriges, weniger häufig, 3. B. P. D. Sp. D. Tegel Kth. Na. Frebenhorft bei Königshorft H. S.! B.

Besundbrunnen Kth. Reinidendorf D. Moabit Bl. Thiergarten D. iesseit Schöneberg Bauer; Treptow D. Br. Nach Biesborf bin Sch.

946. A. canina L. Sumpfwiesen, moorige Walbstellen, nicht elten, 3. B. Sp.; Grunewalb; Tegel Kth. B. Moabit Bl. Thiersarten Kth. süblich von Wilmersborf!! Schöneberg Bl. Fw. Baasee Sch.! Mft. Beim kleinen See; Sommerfelbe Bch.

## 405. Apéra Adans.

947. A. Spica venti (L.) P. B. Feuchte Aeder, Triften, zemein.

## 406. Calamagrostis Adans.

948. C. lanceolata Rth. Sumpfwiesen, zerstreut. Sp. Grustewald!! Papenberge Thiele! Na. Bredower Forst W. M. B. Straau; Jungsernheibe D. zwischen bem Spandauer Bod und Pichelsverg; Schöneberger Busch Bl. Alt-Landsberg Gae. Fw. Sonnenburg Sch. Ast. Großer Schlangenpsuhl; Leuenberger Wiesen Bch.

949. C. epigéa (L.) Rth. Trockner Balbboben, sonnige Hisel, Flugsand, nicht selten. P. Baumgartenbrück Schp. Sp. Grunewald; Stadtsorst D. Tegser Seide Kih. Lw. Rolzenburg H. S. 11.1 B. Huchsberge!! Wuhsseidel! bei der weißen Taube!! Granatenberge!! wischen Beinidendorf und Hermsborf Schl. Jungfernheide!! beim zoologischen Garten; Hasenbeide W. M. Köpnicker Heide! R. Mittelheide!! Rübersborfer Kalkberge Thiele!

950. C. neglecta (Ehrh.) auct. Movrwiesen, besonders auf Torfboben, zerstreut. B. Drewig Radecke! Sp. Hundelehle Bl. Stabtsorst Kth. Kremmen: Linum H.! B. Zwischen Rummelsburg und R. Kth. biesseit ber Jungsernheibe!! zwischen dem Spandauer Bod und Pichelsberg!! Rudower Wiesen!! Rft. Beim Spittel; am Tröbelsteig in der Rabe der Schleuse beim Eisenwert Bech.

951. C. arundinacea (L.) Rth. Schattige Balber, fehr zerftreut. Sp. Bichelsberg Bl. Papenberge Thiele! Dr. Gae.! B. Jungfernheibe D. Fw. Sch! Rft. Zwischen bem Schitzenhause und

bem Brunnen Beh.! Spechthaufen Beh.

## † Ammóphila Host.

† A. arenaria (L.) Lk. An ben Seeklisten einheimisch; hier nur jum Binben bes Flugsandes ausgesäet und hier und ba halb wilb, ober völlig verwilbert. Sp. Zwischen Bichelsberg und Ruh- leben noch vor wenigen Jahren Winkler, jett burch ben Festungsbau verschwunden. Dr. Am westlichen Bord bes Kanals nach Pinnow hin Rn.! Na. Ribbeck R.! Kremmen: Rach Dorotheenhof hin

Jahn. B. Zwischen Reinidenborf und hermsborf Schl. Bionier-Uebungsplat W. M.!!

#### 407. Milium L.

952. M. effusum L. Schattige Laubwälber, zerstreut. F. Sanssouci!! Sp. Papenberge D. Na. Briefelang!! Bredower Forst!! Lindholz!! Kajanerie bei Königshorst!! B. Friedrichsselbe D. Thiergarten, besonders bei Bellevue!! Köpnider heide D. Fw. Brunnen Rn. Zieglerberg Rn.!! Köthen!! Aft. Brunnen; Zainhammer Bck. Biesenthal: Lanke Schl.

## 408. Stupa L.

953. S. pennata L. Sonnige Higel, trodne Balber, besonders auf Sandboben, zerstreut. P. An der Chausse zwischen Alein-Glienicke und der Friedrich-Wilhelmsbrücke Schp.! Sp. Nach Falkenhagen hin; Bamberge; Sandkrug bei hermsborf D. Dr. Destlich am Lehnitz-See Rn.! zwischen Grüneberg und löwenberg; zwischen Falkenthal und Zehbenick Jahn. Na. Kleine Jahnberge H. S.! Buchsberge Radecke! (ob noch jett?); in einem Balbchen zwischen Friedrichsselbe und Marzahn Hanstein. Bernau Jahn. Mittenwalte: Beinberg bei Gr. Machenow Bl. Buchow Radig. Br. Berge nach Biesdorf hin Sch.! Fw. Atazienberg; Fischerthal; Laugerei Rn.! Higgel siblich vom Maunwerk Rn.!! Falkenberg Bch.

954. S. capillata L. Sonnige Hügel, meist auf Sanbboben, nur D, zerstreut. Br. Mühlen- und Springberg bei Deet Schr.! Trebelberg bei Schnergow Hechel! P. Sanssouci bei ber Windsmühle Schp.! Drachenberg Bs.! Geltow Vocke! Baumgartenbrück auf bem heineberg!! Glindower Berge Schr. Sp. Sanblrug bei hermsborf Kr. K. Rübersborfer Kaltberge Bl. Br. Upstall; Laubhof; Alt-Gaul Rn. Fw. Alazienberg; Fischerthal; Laugerei Kn. zwischen bem Maunwert und bem Schosberg Rn.!! Fallenberg über ber

Chauffee Beh. Mft. Pfingftberg; Gichwerber Beh.

## 409. Phragmites Trin.

955. P. vulnerans (Gil.) Aschs. Ufer ber Fluffe, Seen, Sumpfwiesen, sehr haufig.

## 410. Sesléria Scop.

956. S. coerulea (L.) Arduino. Kalkberge, fehr selten. K. Rübersborfer Kalkberge Gr.!

#### 411. Koeléria Pers.

957. K. oristata (L.) Pers. Trodne Balber, Biefen, Sügel, nicht felten.

958. K. glauca (Schk.) D. C. Sonnige Higel, Kiefernwälster, meist auf Sanbboben, nicht selten. P. Baumgartenbrück Bs. 1 an der Chausse zwischen Al. Glienicke und der Friedrich-Wisselmsbrücke Vockel Sp. Schl.! Pichelswerder; Grunewald Kth. Forst süblich von Tegel!! Kremmen: Linum H.! Lw. Rauchenberge Rt. B. Fuchsberge J.! Friedrichsbrin J.!! Iungsernheibe Kth. Spanbauer Berg!! deim hohlen See!! zwischen Wilmersdorf und Schöneberg!! Dasenheibe Hl.! K. Schl.! Wr. Wöglin nach Kunersdorf bin Sch. Fw. Hohlweg; Monte Caprino Rn. Nst. Wald nach Sommerfelbe hin!!

#### 412. Aira L.

959. A. caespitosa L. Feuchter Balbboben, Moorwiefen,

hänfig.

960. A. flexuosa L. Trodne Wälber, Higel, zerstreut, aber gesellig. Br. Götzer Berge Schr. P. Potsbamer Forst Bs. beim Schlachtenset! Sp. Grunewald, besonders bei Pickelsberg!! und an den Thalabhängen von der krummen kanke die zur Hundelehle!! Na. Zwischen der Haltestelle und dem Finkenkrug W. M.! kw. Raudenberge Rt. B. Jungsernheide beim Kanal!! Thiergarten beim Hossigger!! Hasende D. Altekandsberg Gas. Wr. Möglin: Bilchenit Rn. Fw. Beim Schlößberg Sch. Ast. Am Wege nach dem Zainbammer Bch.

## 413. Corynéphorus P. B.

961. C. canoscons (L.) P. B. Sanbfelber, Riefernwälber, gemein.

## 414. Holcus L.

962. H. lanatus L. Fruchtbare Wiesen, häufig. 963. H. mollis L. Schattige, seuchte Balbstellen, Gebiliche, Begränber, zerstreut. Sp. Bei ber Hundekehle Bl.! Papenberge Thiele! Tegel D. B. Jungsernheibe bei ber Mödernit A. Br.! Thiergarten bei den Zelten!! und beim Hossiger!! nordwestlich Baver! Kornicke; zwischen Schöneberg und Tenupelhof Baver! Rudower Wiesen unweit Forsthaus Ober-Nithors!! Alt-Landsberg Gas. Fw. Sonnenburg Sch. Rft. Brunnen Bch.

#### 415. Arrhenátherum P. B.

964. A. elatius (L.) M. u. K. Wiefen, Laubwälber, Wegränder, nicht selten. P. Pfauen-Insel Schp. Sp. Grunewald bei der Rhimmeister-Brüde!! Tegel D. Na. Bredower Forst!! Lindholz!! Jahnberge!! Part bei Gr. Bähnith!! B. Huchsberge D. Pantow Schl. Jungfernheide D. Chaussee auf dem Spandauer Berge!! Thiergaren Bl. nördlich am zoologischen Garten!! Wiese an der Potsdamer Eisenbahn nördlich von Scholerg!! Haseheide; Rollberge D. Logelsborf Schl. Fw. Sch.! Ms. In der Chaussee dieseit Tornow!! Auch häusig auf Grasplätzen angesäet.

#### 416. Avéna L.

\* A. sativa L. Saufig, besonders auf feuchtem Boden, gebaut. Baterland unbekannt.

\* A. orientalis Schreb. Gelten gebaut, fo Br. Franken-

felbe Sch.!

† A. strigosa Schreb. Selten gebaut, so Br. Frankenselbe Sch.! aber hier und da unter A sativa L., so Sp. Ruhleben Kth. Lw. Rt.! B. Gesundbrunnen Schp.! Wilmersdorf Thiele! Lankwik Rach! Alt-Landsberg Gae. Rst. Bch.

† A. fatua L. hier und ba unter A. sativa L., fo B. An ber Chaussee nach Stralau!! Schöneberg John! Br. Batlower

Mühle Rn.

965. A. pubescens L. Wiesen, lichte Walbstellen, häufig. P. Baumgartenbrild!! Sp. D. Na. Lindholz an der Eisenbahn!! Königshorst am Seelenhorster Damm H. S. Kremmen: Linum am Birkhahndamm H.! Trebbin: Schulzendorf Gr.! B. Wiesen zwischen der Stadmager und Borhagen!! Fuchsberge!! disset französischen ber Stadmager und nordöstlich vom Vorse!! Jungfernheibe süblich vom Riögensee!! Spandauer Berg Bl. Wiese an der Potsdamer Eisenbahn nördlich vom Schüneberg W. M.! Hasenheibe D. Rudower Wiesen!! Alt-Landsberg Gae. Nft. Schützenhaus; Brunnen Beh.

966. A. pratensis L. Sonnige Bugel, trodne Balber, nicht baufig. Br. Eistutenberg bei Gr. Kreut Schr.! B. Beineberg bei Baumgartenbrud!! B. Fuchsberge!! Rebberge D. Jungfernheibe fub-

lich vom Plotensee Sanio! Rollberge D.

967. A. flavescens L. Biesen, Grasplätze, zerstreut. P. Sanssouci unter ben Eichen Schp.! Ra. Paulinenau Rt.! B. Jungsernseibe D. am sinten User bes Kanals unterhalb ber Lichtenstein-Brilde W. M.! zwischen Wilmersborf und Schöneberg Thiele! Harbeibe D. Alt-Landsberg Gae. Rft. Trampe Bch. Auch hier und ba ausgestet.

968. A. oaryophyllea (L.) Web. Trockner Walbboben, somnige higel, auf Sanbboben, zerstreut. P. Katharinenholz Schp. Na. Brieselang Kth. Lw. Nach Frankenförde hin Rt.1 B. Beißenjee D. am hohsen See!! Lankwitz Thiele! Hasenheide Kth. am Sübrand ber Spreeheide!! Neuer Krug Bl. Nft. Forstgarten Bch.! Vie-

jenthal: Zwischen Dannewit und Delchow Schl.

969. A. praecox (L.) P. B. Wie vorige, öfter mit ihr, zerftreut. P. Pirscheibe Schp.! Wald zwischen Al. Glienide und ber Friedrich-Wischelmsbriide Vocke! Sp. Beim Teufelssenn!! bei Caatminkel A. Br.!! Tegel Bauer! Or. Lehnig Schl. am Gradows See; zwischen Bernöve und Stüpnig Rn.! Beelig: Elsholz Krumbholz. Lw. Zwischen Frankensörde und Felgentreu Rt.! B. Bein hohlen See A. Br.!! Lankwig Thiele! A. Friedrichshagen H. Alisbersdorfer Kalkberge Bauer! Fw. Mazienberg; Laugerei Rn. Rausberberg Rn.! Mft. Forstgarten; Wald nach Spechthausen hin Beh.! Biesenthal: Zwischen Dannewig und Melchow Schl.

#### 417. Triódia R. Br.

970. T. decumbens (L.) R. Br. Bälber, sanbiger Moorboben, nicht selten. B. Katharinenholz Schp.! Sp. Forst bei ber Hundelehle!! Pickelberg; Stadtsorst; Papenberge D. Tegelsche Heibe Schp.! Ra. Bredower Forst W. M. beim Weinberg!! Im. Schones weide Gr.! Trebbin: Schulzendorf Gr. B. Pankow auf dem rechten Pankeuser unweit der steinernen Brücke!! Jungsernheide W. M.! Hasenheide; Köpnicker Heibe D. K. Müggelberge!! Rst. Schützenshaus; Brunnen Bch.

#### 418. Mélica L.

971. M. nutans L. Laubwälder, Gebüsche, zerstreut. B. Sanssouci Bs.! Sp. Grunewald zwischen Paulsborn und bem Rhin-meister-See Schp. Papenberge!! Tegel Schp.! Schuzendorf Bl. Ra. Bredower Forst!! Stadtsorst (Hahnberge) Gr.! Trebbin: Schulzendorf in einem Garten Gr.! B. Thiergarten D. Alt-Landsberg Gae.! Budow: Cthsium!! Fw. Brunnen; Zieglerberg; Alaunwerk Rn. Mt. Brunnen!! Zainhammer; Spechthausen Bch. Biesenthal: Lanke Schl.

972. M. uniflora Retz. Schattige Laubwälber, fehr zerstreut. Ra. Briefelang D. Or. Liebenberger Part R.! Gae.! N.! Fm. Brunnen; Zieglerberg; Maunwert Rn. Rft. Beim alten Bafferfall Bauer

1850! W. M.!!

#### 419. Briza L.

† B. maxima L. Bierpflanze aus Gut-Europa; zuweilen in

Garten und in ber Rabe berfelben verwilbert. Dr. Garten Rn.! Da. In ber Rabe bee ftabtifden Forftbaufes Gr.!

973. B. media L. Biefen, Balbranber, baufig.

#### 420. Poa L.

974. P. annua L. Bege, Gartensand, Wiesen, gemein. 975. P. bulbosa L. Sonnige Bugel, gerftreut. Bisber nur

B. Schmargenborf am Sobiweg!! beobachtet.

b) crispa Thuill. (als Art). Connige Bugel, Balber, Begranber, nicht felten. B. Sanssouci unter ben Gichen; Reigenmauer Schp. an ber Chauffee gwifden ber Pfauen-Infel und bem Bannfee Vocke! Rremmen: Rhinluch H.! B. Friedrichsfelber Part!! Schönhaufer Part!! Jungfernheibe D. Moabit Bl. am Ronigsmeg jenfeit Bigleben W. M! Bilmersborf Schl. Sügel füblich von Tempelhof!! Safenheibe D. am Röpnider Beg bieffeit bes Reuen Rruges W. M.! Alt-Landsberg Gae. Mft. Beim Gefundbrunnen fparfam Beh.

976. P. alpina L. Mur

b) badensis Haenke (ale Art). Connige Bugel, febr felten. B. Gubliches Ufer ber Bfauen-Infel Vocke! (ob einbeimifd?)

Fm. Anhöhen westlich vom Brunnenthal Christ 1855!

977. P. nemoralis L. Schattige Balber, nicht felten, a. B. Da. Brebower Forft!! Linbbola!! Fasanerie bei Konigeborft H. S.! Gr. Babnit Schr. &w. Elethal H. S. II.! B. Thiergarten!! Alt-Landsberg Gae. Fm. Schlofgrund !! Rft. Brunnen; Bainbammer

Beh. Spechtbaufen Schl. Biefentbal: Lante Schl.

978. P. serotina Ehrh. Feuchte Biefen, Ufer, nicht felten, 3. B. Sp. Grunewalb Bauer! B. Wiefen gwijchen ber Stabtmauer und Borhagen!! Jungfernheibe Bauer; Spreeufer, ber Tichpiden Babeanstalt gegenilber Bl. Wiefen zwischen bem goologischen Barten und Wilmersborf!! füblich von Bilmersborf!! Rft. Bei ber Delmuble; Forftatabemie Beh.

+ P. silvatica Vill. 3m Gebiet nicht einheimisch, fonbern nur zufällig auf Grasplaten eingeschleppt B. Thiergarten beim Sofjäger!!

979. P. trivialis L. Wiefen, häufig.

980. P. pratensis L. Wiefen, Balber, Begranber, gemein. 981. P. compressa L. Mauern, Sügel, Begränber, bejonbere in D, nicht felten. B. Ufermauer bee Luftgartene Bl. Beblenborf Sp. D. Bapenberge Thiele! Dr. Buhlsborfer Beibe Schl. 2m. Lehmgruben Rt.! B. Lange Bride; Colof D. Beigenfee Kth. Charlottenburg D. Arenzberg!! Tempelhof an ber Kirchhofsmauer W. M.! Rollberge D. K. Schloß D. Boltersborfer Schleufe!!

Mauern in Mt-Landsberg !! Bernau Schl. Fw. Sch.! Rft. Unterheibe, besonbers an ber Angermünder Chanffee Boh.

## 421. Glycéria R. Br.

982. G. altissima (Gil.) Gke. Graben, Sumpfe, Ufer, häufig. 983. G. fluitans (L.) R. Br. Wie vorige, fehr häufig.

b) pumila. Sumpfrander, gerftreut. Gp. Teufelsfenn!!

B. Am hoblen Gee Rach!

984. G. plicata Fr. Wie vorige, nicht häufig, aber mohl mehrfach übersehen. Bisher nur B. Biefenweg in ber Rabe bes

Frankfurter Thore 1856 von mir entbedt!!

985. G. distans (L.) Wahlend. Dorfstraßen, Wiesen, Triften, auf Salzdoben, sehr zerstreut. B. lletz Radecke! Baumgartenskrild Drees! Nuthewiesen Bs.! Dr. Zwischen der Havelbrilde und der chemischen Fabrik Rn.! Na. Zwischen der Bredower Forst und Zeestow!! deim Samm nordwestlich vom Weinderg!! Beim Selbanger Jägerhause!! Pessin Rt.! Kremmen: Tietzow N.! B. Köpnider Beld D. vor dem Franksurter Thor D.!! Borhagen Winkler!! Seesgricher Holzplatz A. Br.! vor dem Halleschen Thor nördlich der Ulamen-Kaserne Bauer! Wr. Möglin; Bahlower Wiese Rn.! Fw. Mannswert bei der Hitte Kn.

986. G. aquática (L.) Presl. Gräben, Quellen, Floßholz, iehr zerstreut. Na. Gr.! Dammgräben im großen Havellänbischen uch nörblich vom Linbholz Schr. B. Floßholz in ber Spree Rn.! Thiergarten R. Buschtrug Thierle! Rixborf süböstlich vom Dorfe Bauer! K. Am Stienitz-See bei Tasborf A. Br.! Alt-Landsberg Gae.! Br. M Batlower Mihstenstieß Sch.! Hw. An Quellen Schl. Kft. Graben am Weibendamm Bch.!! Torssich am Wege nach Britz Bch.

## 422. Molinia Mnch.

987. M. coerulea (L.) Mnch. Moorwiesen, seuchte Walbstellen, nicht selten. Sp. Hundekehle Bl. Papenberge; Tegel Schl. Ka. Haltestelle Finkenkrug!! Königshorst H. S. B. Bei den Fuchsbergen Schp. Friedrichsselber Part!! Jungsernheibe Schl. zwischen dem Joologischen Garten und Wilmersdors W. M.! Rudower Wiesen Raddecke! Wiesen am Köpnicker Weg!! K. Tasbors am Stienity-See kn. Buctow; Eichendorfer Mühle Sch. Mst. Leuenberger Wiesen; am Wege nach Bornemannspfuhl Bch.

b) arundinacea Schrk. Schattiger Balbboben. B. Gans-

souci unter ben Gichen Schp.! Ra. Lindholz!!

## 423. Dáctylis L.

988. D. glomerata L. Wiefen, ichattige Balber, Grasplate bäufig.

## 424. Cynosúrus L.

989. C. cristatus L. Wiefen, Triften, baufig.

#### 425. Festúca L.

990. F. myura Ehrh. Connige Gugel, Balber, Begrander, auf Canbboben, fehr gerftreut, zuweilen unbeftanbig. Ra. heineberg bei Gr. Babnit gablreich 1853 Sehr.! bann nicht wieber. R. Boltersborf; am Stienit = Gee bei Tasborf 1858 Rn. Alt - Landsberg: Am Steig nach Fredersborf 1843 viel, später spärlich Gae.! Fm. Maunwert bei ber Butte; Abrendstehle Rn. Rft. Forstgarten Bch.!

991. F. sciuroides Rth. Wie porige, viel feltener. B. 3m. Schöneberg und Tempelhof Rach! Buerft von C. Bouche

sen, entbedt.

992. F. ovina L. Balber, Sanbfelber, trodne Bugel, gemein. 993, F. duriuscula L. syst. Schattige Laubmalber, Bebiliche, gerftreut. Sp. Stadtforft D. Dr. Strobberge Rn. Ra. Brebower Forft!! Lindholg Rt.! B. Lichtenberger Riet Sonder! beim Roologijchen Garten Lucae! Thiergarten Schur! Lantwit C. Bouche sen. Könnider Beibe Schl.! Br. Bablomer Biefe Rn. Rm. Brunnen Sch.! Mft. Schütenbaus Beh. Brunnen Beh.! Bainbammer Beh. 994. F. rubra L. Balber, etmas feuchter Sanbboben, nicht

felten.

995. F. gigantea (L.) Vill. Schattige Laubmalber, gerftreut. B. Sansfouci Bs.! Sp. Papenberge D. Ra. Briefelang!! Brebower Forft Schr. Apfelhorft in ber Stadtforft Gr. Fafanerie bei Roniasborft H. S.! B. Friedrichsfelber Bart! Thiergarten!! (Br. Gebilich bei ber Malzmühle Sch.) Frm. Brunnen Rn. Atazienberg Rn.!! Sammerthal; Rothen Rn. Rft. Brunnen und an ber Comarge auf-

marte bis Spechthaufen Beh. Biefenthal: Lante Sehl.

996. F. borealis (Trin.) M. u. K. Sumpfwiesen, Graben, Ufer ber Fliffe und Seen, fehr gerftreut. B. Beiliger See R. Savel zwischen bem Tornow und Templin Bs. ! Baumgartenbrild D. Gr. Bichelsberg D. Tegler Gee Kornicke! Dr. Birtenwerber; Graben hinter bem Schlofigarten Rn. ! Rremmen: Rhinluch am Rhin und ben Schifffahrtstanalen H. B. Um Markgrafenbamm!! Stralau biesfeit ber Rirche Bauer; amifchen bem Samburger Babnhof und ber Strafanftalt Kornicke! Treptow D. Buerft von Klank entbedt; er reicht bier ihre Gubgrenge.

997. F. arudinacea Schreb. Moorwiesen, Ufer, nicht selten, 3. B. B. Beim Reuen Palais Schp. Schlachtensee!! Na. Königshorst am Seelenhorster Damm H. S.! Trebbin: Zwischen bem Bahnhof und Schulzenbors!! B. Markgrasenbamm!! Pantow an ber Pante!! Schoneberger Busch Bl. Br. Möglin an ber Büchnitz Sch. Aft. Beibenbamm; Zainbammer Bch.

998. F. elatior L. Biefen, Triften, haufig.

## 426. Brachypódium P. B.

999. B. silvaticum (Huds.) R. u. Sch. Schattige Laubwälber, Gebülche, zerstrent. B. Sanssouci Bs.! Schp.! Sp. Tegel D. Na. Briefelang D. Bredower Forst!! Lindholz D. Halanerie bei Königs-horst H S.! Unterholz bei Dechtow H. B. Friedrichsselber Park!! Schönhauser Park R. Thiergarten, besonders zwischen den Zelten und Bellevue und beim Jägerhause!! Att-Landsberg Gae. Br. Büchnig bei Möglin Rn. (bei der Malznühle Sch.!) Hw. Hammerthal Rn. Zieglerberg Rn.!! Rst. Beim Brunnen!! Karlswerk H.

1000. B. pinnatum (L. ex p.) P. B. Trodne Wälber, Hisgel, zerstreut, aber jehr gesellig und zuweisen weite Strecken überziehend. B. Sanssouci bei der Windmühle Schp.! Baumgartenbrück Bs. Sp. Grunewald, besonders bei der Hundesehle!! Papenberge; Tegel D. Na. Falkenhagen D. Lindholz!! B. Jungsernheide bet der Schafrichterei!! nördlich am zoologischen Garten!! K. Zwischen der Woltersdorfer Schleuse und den Rüdersdorfer Kalkbergen!! Altsandsberg Gae. Wr. Batsower Mühle Rn. Fw. Ruinenberg; Afazzienberg Rn. Aft. Großer Schlangenpsuhs; Karlswert Bch.

## 427. Bromus L.

1001. B. secalinus L. Aeder, besonders unter Roggen, banfia.

1002. B. racemosus L. Fruchtbare Wiesen, zerstreut. P. Eiche Bch. B. Wiesen zwischen ber Stadtmauer und Borhagen!! Wiesen beim zoologischen Garten C. Bouché sen.! Steglit D. Wiese am Kanal zwischen bem Kottbuffer und Schlesischen Thor!! Br. Batzlower Mühle Sch.!

1003. B. commutatus Schrad. Aeder, Begränber, fehr zerfirent. Ra. Paulinenau öfilich vom Bege nach Seibelang Hertzsch!
B. Friedrichsfelbe D. zwischen Charlottenburg und bem Spanbauer
Bock Sanio! Steglit D. an ber Potsbamer Cifenbahn bieffeit Schoneberg W. M.! R. D. Baruther Nieberung Rbh.

1004. B. mollis L. Aecker, Wegränder, Wiesen, sehr häufig. 1005. B. arvensis L. Aecker, Wegränder, Higel, auf Candund Lehmboben, ftellenweise häufig. B. Brandenburger Kommunitation Bl. Rummelsburg!! Fuchsberge Rei.! Seegericher Solaplat Bl. Rreugberg!! Fm. Sch.! Dift. An ber Chauffee nach Fm. Bch.

1006. B. asper Murr. Schattige Laubmalber, felten.

Sanssouci bei ben Sabinerinnen Bch.

b) serotinus Beneken (als Art). Schattige Laubwälber, febr gerftreut. Mft. Gefundbrunnen Beh. alter Bafferfall; am Flieg

bieffeit Spechthaufen Beh.!

1007. B. erectus Huds. Wiefen, Grasplate, Wegranber, gerftreut. Bobl meift nur angejaet. Br. Bewefin am füblichen Ball bes Löttanale 1856 Schr.! fpater ausgerottet. B. Reuer Garten W. M.! Gp. An ber Chauffee nach Rubleben!! Dr. Biejen füblich von Germenborf (bier mahricheinlich wilb) Rn.! Ra. Paulinenau füblich vom Bege nach Berge Hertzsch! B. Thiergarten D. Grasplate in und vor bem Schlofigarten ju Charlottenburg!! Alt-Landsberg Gae.! Br. Büchnit bei Möglin Rn. (wohl wilb).

1008. B. inermis Leyss. Connige Sigel, Begranber, meift D, gerftreut. Br. Buchenberg bei Got Schr. B. Braubausberg W. M. hinter bem Rirchhoje Bs.! Gp. D. Bichelswerber an ber Norbostjeite!! Na. Jahnberge!! Rremmen H. B. 3mifchen Rummelsburg und bem Riet Schp.! an ber Chauffee bieffeit Beiffenfee A. Br. ! bei ber Scharfrichterei!! Spanbauer Berg Bl. weftlich am hippobrom!! amifden Wilmersborf und Schoneberg Schp. Botsbamer Gifenbahn füblich von Schöneberg W. M. R. Dablebori Alt-Landsberg Gae.! Br. Buchnit; Batlower Berge; Land. Frw. Sinter bem Beinberg Sch.! an ber Chauffee über bof Rn. Faltenberg!! Mft. Schütenbaus; Brunnen Beh.

1009. B. sterilis L. An Mauern, Baunen, Wegranbern, nicht felten. B. Sansfouci Schp. Cb. Bichelsborf!! Ra. An ber Rafas nerie bei Königsborft H. S. B. Branbenburger Rommunitation Bl. an ber Stadtmauer amifchen ber Gifenbabnpforte und bem Frantfurter Thor !! Rummelsburg Schp. ! Friedrichsfelbe; Moabit Schl. Chanbauer Bod!! Charlottenburg an ber Kirche!! Thiergarten Bl. Soos

neberg; Sasenheibe W. M. Fm. Paschenberg !!
1010. B. tootorum L. Sanbselber, Begranber, haufig.

## 428. Tríticum L.

\* T. vulgare Vill. Baterland unbefannt; auf Lehmboben in D, ftellenweise in Menge gebaut.

\* T. turgidum L. Geltener gebaut,

\* T. durum Desf. Nur versuchsweise gebaut. Br. Frantenfelbe Sch.1

\* T. polonicum L. Cbenfo. Br. Frankenfelbe Sch.!

\* T. Spelta L. Sier und ba gebaut, boch meift nur in Garten.

\* T. monococcum L. Bersucheweise gebaut. Br. Franenfelbe Sch.!

1011. T. repens L. Begranber, Meder, Biefen, Balber,

emein.

b) caesium Presl. (als Art). Bisher nur B. Zwischen ber Jungfernheibe u. Moabit; am Plogenfee; Seegericher holgplat Bl. !

1012. T. caninum (L.) Schreb. Laubwälder, zerstreut. Dr. Schlofigarten Rn.! Teschorf Rn. Liebenberg Bch. Ra. Beim Bresower Forsthause 1855 von mir gefunden!! (von Mund zuerst in dieser Gegend für das Gebiet entdect); Fasanterie bei Königshorst H. S.! B. Friedrichöfelber Park K. Müller!! Fw. Zwischen dem Belvederend Mazienberg Rn. Rs. Vom Zainhammer dis Spechthausen an der Schwärze Bch.! Trampe im herrschaftlichen Garten Bch.

## + Secale L.

† S. cereale L. Baterland unbefannt; überall gebaut; auf Schutt, an Wegen zuweilen einzeln verwilbert.

## 429. Élymus L.

† E. arenarius L. An ben Kiften einheimisch; im Gebiete seit 100 Jahren jum Binden bes Flugsandes angesäet und bann meist verwitbert. Br. Deetger Mühlenberg Schr. P. Babersberg Bs.! Kremmen: Dorotheenhof Jahn. B. Zwischen bem Bedding und Reinidenborf!! zwischen Reinidenborf und hermsborf D. zwischen ber Jungsernbeibe und Moabit sehr viel!! Hasenbeibe einzeln!!

1013. E. europaeus L. Schattige Gebiliche, febr felten. Rur

B. An ber Griebnit bei Türkshof 1854 von Bs.! entbedt.

#### 430. Hordeum L.

\* H. vulgare L. Baterland unbefannt; überall gebaut.

\* H. hexastichum L. hier wohl nicht gebaut, aber zuweisten unter anderen Saaten.

\* H. distichum L. Baufig gebaut.

1014. H. murinum L. Wegranber, Baune, gemein.

#### 431. Lólium L.

1015. L. perenne L. Biefen, Begränder, febr häufig.

† L. multiflorum Poir. In Subbeutschland einheimisch; hier nur zuweilen auf Grasplätzen angesaet und verwilbert, so B. Sanssouci Radecke!

1016. L. temulentum L. Aeder, befonbere unter Safer, nicht felten.

1017. L. arvense Schrad. Rur unter Flache, febr gerftreut.

B. Bei ber Dampsmible Ad. Müller! Marquard Hanstein! Em. Dobbritom Rt. B. Ripborf Rn.! Rft. Beh.

#### 432. Nardus L.

1018. N. stricts L. Sanbiger Moorboben, trodne Wälber, Wiesen, nicht selten. Sp. Grunewalb an ber Havel Vockel beim Rhinmeister-See!! Ew. Zinnasche Forst Rt. B. Jungsernheibe beim Kanal!! Charlottenburg beim bohlen See!! Schöneberg Bl. Schlächterwiese!! Rubower Wiesen!! Nst. Lichterselbe; beim Trampeschen Forsthause Bch.!

## II. Gymnospermae.

## 100. Familie. Coniferae Juss.

#### \* Taxus Tourn.

\* T. baccata L. Im Gebiet nicht mehr als einheimisch be- tannt; hanfig in Garten und Parts gepflanzt.

### 433. Juniperus L.

1019. J. communis L. Riefernwälber, sonnige hilgel, zerstreut. Sp. Bei Baulsborn einzeln!! Tegeliche heibe!! Stolpesche Heibe Schl. Na. Bei ber haltestelle Fintentrug Rei. R. Rübersborfer Kaltberge!! Bernau; Berneuchen; Strausberg Schl. Fw. Köthen Bl.

\* J. virginiana L. Bierbaum aus Rorbamerita. Gin febr

fones Exemplar B. Schonhaufer Part.

\* J. Sabina L. Bierftrauch aus Gubbeutichland. Gins ber größten u. alteften Exemplare B. Im Ronigliden botanifden Garten.

## \* Thuja L.

\* T. occidentalis L. Häufiger Zierstrauch aus Nordamerita, besonders auf Begräbnisplätzen gepflanzt.

#### 434. Pinus Tourn.

1020. P. silvestris L. Bei weitem ber baufigste, auf Sanbboben fast ber ausschließlich vortommende Balbbaum bes Bebiets.

\* P. Strobus L. Aus Norbamerita. Nicht felten in Parts gepflanzt, bier und ba in gangen Beftanben fo bei Budow Caspary.

## \* Abies Tourn.

\* A. alba Mill. Baufiger Bierbaum aus Mittelbeutschlanb.

#### \* Picea Lk.

\* P. excelsa (Lmk.) Lk. Im Gebiet nicht einheimisch, aber liberall in Parts, auch nicht selten einzeln in Wälbern gepflanzt. In einiger Menge 3. B. in ber Jungfernheibe beim Forsthause Rö-nigsbamm Rn.

#### \* Larix Tourn.

\* L. docidus Mill. Zunächst in Schlesten einheimisch; in Barts nicht selten, zuweilen auch in Wälbern in einiger Menge gespstanzt. So B. Jungsernheibe beim Forsthause Königsbamm!! Königswusterhausen unweit bes Forsthauses Fasanerie!!

## Cryptógamae.

## I. Cormóphyta.

#### A. Filicínae.

a. Gonioptérides Willd.

101. Familie. Equisetaceae D. C.

## 435. Equisétum L.

1021. E. arvense L. Aeder, Begranber, Gebuiche, Biefen, gemein.

b) campestre Schultz (als Art). Sanbhügel, selten. B. Bei Witsleben A. Br.!!

c) nemorosum A. Br. Schattige Walbstellen, zerstreut. Ra. Briefelang!! B. Charlottenburger Schlofigarten!! Lw. Sch.! Rft. Unter bem Schützenhaufe!!

1022. E. Telmatea Ehrh. Schattige Abhänge in ber Rabe von Gewässern, sehr selten. Bisber nur Rft. Zwischen bem Brun-

nen und Bainhammer 1857 bon Beh.!! entbedt.

1023. E. silvaticum L. Schattige Balber, zerstreut. Sp. Papenberge; Tegel D. Dr. Schmachtenhagen Gae. Ra. Zwischen bem Finkenkrug und bem Forschause Briefelang!! am Wege zwischen bem Finkenkrug und bem Eisenbahnübergang des Bredower Weges!! Bw. Am Fuß ber Renneberge Rt.! B. Zwischen Französisch Buchbolz und Buch Kr. Gesundbrunnen; Reinickendorf D. am Chaussegraben beim Artillerie-Schiefplat!! Thiergarten in der Gegend bes

Jagerhaufes Bl.!! Ropnider Beibe Kth. Frw. Connenburg; Brunnen; Maunwert Rn. Rft. Trobelfteig zwijden bem Rupfer- und Gifenbammer Beh.!

1024. E. pratense Ehrh. Bie voriges, febr gerftreut. Da. Nördlich vom Fintentrug und am Wege von ba nach bem Forsthause Briefelang 1854 A. Br.!! B. Charlottenburger Cobloggarten an ber Beffeite A. Br.!! querft bier von Schl. für bas Gebiet entbedt. Fm. Alaunwert Beh. Rft. Trobelfteig zwischen bem Rupfer- und Gifenbammer; Spechthaufen Bch.1

1025. E. palustre L. Biefen, Graben, Cumpfrander, nicht felten, a. B. B. Glindower Biegeleien Schr. Cp. Bichelsmerber!! bem Schlof Grunewald gegenüber !! Rremmen: Tietow !! Em. Lebmgruben Rt.! B. Wiesen zwischen ber Stabtmauer und Borbagen J. Beigenfee!! bei ber Bantftrage W. M. norblich vom Samburger Babnhof!! Bilmersborf Thiele! am Kanal zwischen bem Salleschen und Kottbuffer Thor W. M. an ber Chauffee bieffeit bes Buichtruges!! R. Um Ralffee norblich ber Boltersborfer Schleufe!! Alt-Lanbeberg Gae.! Mft. Am Bege nach bem Gidwerber!!

b) prostratum Hoppe (als Art). Wie bie Sauptart, febr gerftreut. B. Um Spreeufer nach Stralau bin Körnicke! R. Tas-

borf Bauer!

1026. E. limosum L. Gumpfe, Graben, Ufer, febr baufig.

1027. E. hiemale L. Sanbhugel, Triften, trodne Biefen und Balber, gerftreut. B. Savelabhange bei Baumgartenbrud ant Beineberg! gwifden ber Moorlante und ber Pfauen-Infel!! am Schlachtenfee Schp.! Gp. Savelabbange zwifden Bichelsberg und bem Teufelsgraben!! Papenberge D. am Bug ber Bamberge Bl. Dr. Strobberge Gae.! Ra. Lindholg H. Jahnberge am nordweftlichen Enbe!! B. Beim Gafthof gur weißen Taube J.!! norblich von Beifensee!! beim Gesundbrunnen, besonders gablreich am Cichengraben zwischen ber Gifenbahn und ber Pantftrage!! Jungfernbeibe fubweftlich vom Plotenfee!! Kreugberg D. Rubower Biefen!! Fm. R. Mit. Bainbammer D.

b) paleaceum Schleicher (als Art). Wie bie Sauptart, viel feltener. B. Savelabhang jenfeit Tornow Winkler! B. An

ber Gifenbahn beim Gefunbbrunnen Schp. !!

1021 × 1026. E. arvense × limosum. Reuchte, fanbige Triften, febr felten, aber mobl mehrfach überfeben. B. Deftlich vom Bege amifden Alt-Geltow und bem Berberichen Kabrbaufe' 1857 Sanio!

## b. Hydroptérides Willd.

## 102. Familie. Marsileaceae Bartl.

#### 436. Pilulária L.

1028. P. globulifora L. Sumpf- und Teichränder, fehr felten, aber wohl mehrfach übersehen; zuweilen Jahre lang nicht erscheinenb. B. An einem Pfuhl südwestlich von Tempelhof Rach!!

# 103. Familie. Salviniaceae Bartl. 437. Salvinia Micheli.

1029. S. natans (L.) All. In stehenden und langsam sließenden Gewässern schwimmend, sehr zerstreut; mit Floßholz öfter wandernd. P. Havel bei Baumgartenbriick Voeke! beim Tornom! bei der Ziegelei unweit der Pfauen-Insel Vocke! Sp. An der Offeite von Pichelswerder Li. B. Floßholz am Oberbaum!! Charlottenburg beim Schloßgarten D.

## c. Bryoptérides Willd.

## 104. Familie. Lycopodiaceae D. C.

## 438. Lycopódium L

1030. L. Solago L. Walbstümpfe, gern an ben Wurzeln von Erlen, sehr zerstreut. Sp. Grunewalb D. B. Jungfernheibe in ber Mödernitz Tittelbach. Köpnicker heibe Dr. Klotzsch! Müncheberg: Nach bem Heibekrug hin Thiele! Fw. Sonnenburg nahe bem Saufenngraben Rn. bei ber Teufelsbrücke einzeln Rn.!! Nft. Am kleinen See Bch.

1031. L. annotinum L. Schattige Balbstellen, besonbers an Sümpsen, zerstreut. P. An ber Sübseite bes Schacktenses Schp.!! Sp. Grunewald süblich von Paulsborn!! Tegel D. B. Jungsert heibe D. Köpnider Heibe Dr. Klotzsch! R. Beim Teufelsse meit ber Milgelberge Bl.! Stausberg: Blumenthal Kr. Fw. Sonnenburg beim Sausenngraben; Teuselsbrücke Rn. Mst. Bei ben Leuerberger Biesen Bch.! am Wege nach Trampe; bei Spechthausen Bch.

1032. L. inundatum L. An Walbsümpfen, auf sanbigem Moorboben, zerstreut. B. Gr. Glienicke Vocke! Saubube beim Stern Bs. Zehlendorf Kth. Sp. Grunewald Thiele! Dr. Zwischen Sandbausen und ber Schäferei Gae. Ra. Brieselang Kr. am Bolchow bei Buschow Schr. B. Weißensee nach Hohen-Schönhausen hin A. Br.! und nörblich vom Heinersdorfer Weg!! zwischen Fankow und dem Gesundbrunnen in Vertiesungen nörblich und südlich der Panke Wink-

ler!! R. Beim Teufelsfee unweit ber Müggelberge Kosa!

1033. L. clavatum L. Trodne Wälber, Moorboben, nicht selten. P. Sanssonci; Bildpark Schp.! Potsbamer Heibe Bs. Sp. Stabtsorft!! Ra. Bei ber Haltestelle Hintenkrug!! B. Friedrichsselbe sinds vom Park!! Bertiefungen beim Gesumbkrunnen!! Jungfernheide!! beim hohlen See!! Rudower Wiesen!! K. Zwischen Johannisthal und Glienide W. M. Alt-Landsberg Gae.! Hw. Bei ber Teuselsbride!! Rft. Beh. Biesenthal: Im Balbe bei Lante Sanio! 1034. L. Chamaecyparissus A. Br. Schattige Kiefern-

malber, selten, aber vielleicht mehrsach übersehen. B. Birichheibe öftlich von ber Chaussee!! Rft. Bei ben Leuenberger Wiesen Beh.!

1035. L. complanatum L. Kiefernwälber, sehr zerstreut. Sp. Grunewalb D. Tegel nordwestlich vom Wirthshause Schp. Sandtrug Kr. Or. Sarnow Gae. B. Jungsernheibe; Köpnicker Heibe D. K. Kranichsberge Dr. Berg. Fw. Harnetopf Gae. Sonnenburg beim Sausenngraben Rn. bei ber Teufelsbrücke Rn.!! Rft. Spechthausen bei ber Stampsmühle Bl.

#### d. Fílices L.

# 105. Familie. Ophioglossaceae R. Br. 439. Botrýchium Sw.

1036. B. Lunária (L.) Sw. Sonnige, begraste Hügel, trocine Balbstellen, Wiesen, zerstreut, zuweilen unbeständig. P. An der Chausse biesseit Neu-Geltow Bs.! Karlsberg; Brauhausberg Schp. Sp. Nordöslich von Pichelsberg Caspary!! Grunewald beim Sausgarten; am See nördlich von Saatwinkel A. Br.!! Na. Große saule Lete beim Finkenkrug A. Br.! B. Huchsberge!! beim Gesundbrunsnen Jahn! bei den Nehbergen Caspary!! Sübseite der Junsernheibe O. Jaenicke! Charlottenburg D. Lankwig Thiele! Rollberge Schp.! K. Rübersdorfer Kalkberge Schl.! Br. Unweit des Springs Sch.

1037. B. lanceolatum (Gmel.) Roeper. Wie voriges, meist in Gesellschaft besselben, sehr zerstreut und öster unbeständig. B. Wildpart; Rarisberg Schp.! Sp. Nordöstlich von Pichelsberg im Grunde 1853 Caspary!! in der Gegend der Hundelschse Körnicke; am See nördlich vom Saatwinkel A. Br.!! B. Friedrichsselbe Schl.! Granatenberge Li. Gesundbrunnen an der Eisendahn Sanio! an der Chausse nach Tegel A. Br.!

1038. B. Matricariae (Schrk.) Spr. Sandiger Moorboben, an Balbsumpsen, sehr selten. Or. An der Rehkuble zwischen Hoben-Neuendorf und dem Briesenschen Theerosen Dr. Homann! B. In einer Bertiefung beim Gesundbrunnen mit Lycopodium inundatum

L. 1855 von Schp.!! entbedt.

## 440. Ophioglossum L.

1039. O. vulgatum L. Mäßig feuchte Biesen, an Walbssümpfen, zerstreut. Br. Bewesin am Kanal nach bem See zu Schr. Sp. Tegel unweit bes Wirthshauses Rn.! Dr. Neu-Holland Jahn. Na. Große faule Late beim Finkenkrug A. Br.! Lw. Frankenförbe Rt.! Wiesen süblich von Boxhagen!! Friedrichsfelbe D. Französisch Buchholz Kr. Jungfernheibe in der Mödernity!! Wiesen dieseit Schöneberg D. Audower Wiesen!! Treptow D. Fw. Bei der Papiermühle Rn.! Rft. An der Eisenbahn im Finowthal Boh.!

## 106. Familie. Osmundaceae R. Br.

## 441. Osmunda L.

1040. O. regalis L. Feuchte Walbstellen, an Simpfen, zerstreut. P. An ber Sübseite bes Schlachtensees Schp.!! Sp. Best lich vom Wege zwischen Sp. und Nieber-Neuenborf In.! Papenberge Thiele! Tegel D. Or. Zwischen henningsborf und Böhow H. zwischen Sachsenhausen und bem Theerosen In.! Liebenwalbe Gae. Na. Beim Finkenkrug Körnicke!! B. Jungfernheibe in ber Gegend ber Kanalbrucke bei Königsbamm!!

# 107. Familie. Polypodiaceae R. Br. 442. Polypódium L.

1041. P. vulgare L. Balber, besonders an Abhangen, Baummurzeln, Graben, nicht felten. B. Beim Templin Bs. Abhange gwi-

schen ber Moorlanke und ber Pfanen-Insel!! Sp. Bichelswerber!! Bapenberge Körnicke! Tegel im Bark!! Na. Bredower Forst!! Lw. Forst westlich von Gottow!! B. Beiße Sand-Berge an ber faulen Spree Rei.! Thiergarten-bei ber Hofjäger-Allee!! A. Abhänge ber Boltersborfer Schleuse gegeniber!! Alt-Landsberg: Stadtsorst Gae.! Budow: Silberkehle!! zw. der Alten Mible u. Hermersborf im Hohl-weg!! Fw. Schlosgarten Bl. silblich vom Alaunwerk!! Paschenberg!! Mt. Destlich vom Schanzenberg!! unter dem Schügenhause!!

#### 443. Pteris L.

1042. P. aquilina L. Trodne Balber, febr baufig.

#### 444. Blechnum L.

1043. B. Spicant (L.) With. Schattige Balber, besonbers in ber Rahe von Sumpfen, febr zerstreut. B. Bei ber Saubube unmeit bes Sterns Bs. Sp. Grunewalb Körnicke! Tegel in ber Rahe bes Gasthoses Rn.! B. Jungfernheibe nörblich vom Kanal weftlich ber Brude bei Königsbamm Sanio!!

## 445. Asplénium L.

1044. A. Trichomanes L. Hohlwege, Abhange an Baumwurzeln, sehr zerstreut. R. Gegenüber ber Boltersdorfer Schleuse R. Budow: Elysium O. Jaenicke; Hohlweg zwischen ber Alten Muhle und hermersborf!! Fw. Steinkuhlen Rn. sublich vom Alaunwert Rn.!!

1045. A. Filix femina (L.) Bernh. Feuchte Bebuiche,

Sumpfranber, baufig.

1046. A. Ruta muraria L. Mauern, meift an ber nach Rorben gekehrten Seite, zerstreut. B. An ber Rampe beim Ruinenberg Bs.!! Talutten Weiland!! Sp. Stabtmauer D. B. An ber Norbseite bes Gießhauses viel und schön!! westliche Mauer bes Charlottenburger Schlofgartens!! Alt-Lanbsberg an ber Stabtmauer, besonders an ber Berliner Thorbrude Gae.!! Nft. Magbalenen-Kirche Beh.!! Stabtmauer Beh.

## 446. Phegópteris Fée.

1047. P. polypodioides Fée. Schattige Laubwälber, sehr zerstreut. Sp. Tegel D. B. Thiergarten in der Nähe des Jägershauses einmal spärlich von Bl. gefunden. Fw. Erste Steinkuhle jenseit des Brunnens Rn.!

1048. P. Dryopteris (L.) Fee. Schattige Balber, Schluch.

# Register.

Abies Tourn. 191. Acalyphaceae Kl. u. Gke. 138. Acer L. 31. Aceraceae D. C. 31. Achillea L. 83. Achyrophorus Scop. 92. Acorus L. 151. Actaea L. 7. Adonis Dillen. 3. Adoxa L. 71. Aegopodium L. 64. Aesculus L. 31. Aethusa L. 66. Agrimonia Tourn. 52. Agrostemma L. 24. Agrostis L. 178. Aira L. 181. Ajuga L. 125. Albersia Kth. 130. Alchemilla Tourn. 51. Alectorolophus Haller. 118. Alisma L. 146. Alismaceae Juss. 146.

Alliaria Adans. 12.

Allium L. 161. Alnus Tourn. 141. Alopecurus L. 177. Alsinaceae D. C. 25. Alsine Wahlenb. 26. Althaea L. 29. Alyssum L. 14. Amarantaceae Juss. 130. Amarantus L. 130. Amaryllidaceae R. Br. 157. Ambrosiaceae Lk. 96. Amelanchier Med. 53. Ammi Tourn. 64. Ammophila Host. 179. Ampelides H. B. K. 31. Ampelopsis Mich. 31. Amygdalaceae Juss. 46. Amygdalus L. 46. Anacamptis Rich. 154. Anagallis L. 128. Anchusa L. 107. Andromeda L. 99. Anemone Tourn. 3. Anethum Tourn. 68.

Angelica L. 67. Anthemis L. 83. Anthericum L. 159. Anthoxanthum L. 177. Anthriscus Hoffm. 69. Anthyllis L. 37. Antirrhinum L. 113. Apera Adans. 179. Apium L. 64. Apocynaceae R. Br. 103. Aquifoliaceae D. C. 102. Aquilegia Tourn. 6. Arabis L. 10. Araceae Juss. 151. Araliaceae Juss. 70. Archangelica Hoffm. 67. Arctostaphylus Adans. 99. Arenaria L. 26. Aristolochia Tourn. 136. Aristolochiaceae Juss. 136. Armeria Willd, 129. Arnica L. 85. Arnoseris Gaertn. 90. Arrhenatherum P. B. 182. Artemisia L. 82. Asarum Tourn. 137. Asclepiadaceae R. Br. 102. Asclepias L. 102. Asparagus L. 162. Asperugo Tourn. 106. Asperula L. 73. Aspidium Sw. 198. Asplenium L. 197. Aster L. 77. Astragalus L. 41. Astrantia Tourn. 63. Atriplex Tourn. 133. Avena L. 182.

Ballota L. 124. Balsamina D. C. 33.

Balsaminaceae Rich. 33. Barbaraea R. Br. 10. · Batrachium E. Mey. 4. Bellis L. 79. Berberidaceae Vent. 7. Berberis L. 7. Berteroa D. C. 14. Berula Koch. 65. Beta L. 133. Betonica L. 124. Betula Tourn. 141. Betulaceae Rich. 141. Bidens L. 81. Blechnum L. 197. Blitum Tourn. 132. Boraginaceae Desv. 106. Borago L. 107. Botrychium Sw. 195. Brachypodium P. B. 187. Brassica L. 13. Briza L. 183. Bromus L. 187. Bryonia L. 58. Bulliarda D. C. 60. Bunias L. 17. Bupleurum L. 65. Butomaceae Rich. 146. Butomus Tourn. 146. Buxus Tourn. 138.

Calamagrostis Adans. 179.
Calamintha Much. 121.
Calendula L. 87.
Calla L. 151.
Calliopsis Rehb. 81,
Callistephus Cass. 78.
Callitrichaceae Lk. 57.
Callitriche L. 57.
Calluna Salisbury. 100.
Caltha L. 6.
Camelina Crtz. 15.

Campanula L. 97. Campanulaceae Juss. 97. Cannabaceae Endl. 139. Cannabis Tourn. 139. Caprifoliaceae Juss. 71. Capsella Vent. 16. Caragana Lmk. 40. Cardamine L. 11. Carduus L. 88. Carex Micheli. 168. Carlina Tourn. 88. Carpinus L. 141. Carum L. 65. Castanea Tourn. 140. Caucalis L. 69. Celastraceae R. Br. 34. Celsia L. 112. Centaurea L. 89. Centunculus L. 128. Cephalanthera Rich. 154. Cerastium L. 27. Ceratophyllaceae Gray. 57. Ceratophyllum L. 57. Chaerophyllum L. 69. Chaeturus Willd. 124. Chelidonium Tourn. 8. Chenopodiaceae Vent. 131. Chenopodium Tourn. 131. Chimophila Pursh. 101. Chondrilla Tourn. 93. Chrysanthemum L. 84. Chrysosplenium Tourn. 62. Cichorium Tourn. 90. Cicuta L. 63. Circaea Tourn. 55. Cirsium Tourn. 87. Cistaceae Dun. 17. Cladium P. Br. 166. Claytonia L. 59. Clematis L. 1. Cnidium Cuss. 66. Cochlearia L. 15. Colchicaceae D. C. 162.

Colchicum Tourn. 162. Colutea L. 40. Comarum L. 49. Compositue Adans. 76. Coniferae Juss. 190. Conium L. 70. Convallaria L. 158. Convolvulaceae Juss. 105. Convolvulus L. 105. Corallorrhiza Haller: 156. Coriandrum L. 70. Cornaceae D. C. 70. Cornus Tourn. 70. Coronaria L. 24. Coronilla L. 41. Coronopus Haller. 16. Corrigiola L. 59. Corydallis D. C. 9. Corylus L. 141. Corynephorus P. B. 181. Cotoneaster Med. 53. Cracca Rivin. 43. Crassulaceae D. C. 60. Crataegus L. 53. Crepis L. 94. Crocus Tourn. 157. Cruciferae Juss. 9. Cucubalus Tourn. 22. Cucamis L. 58. Cucurbita L. 58. Cucurbitaceae Juss. 58. Cupuliferae Rich. 140. Cuscuta Tourn. 106. Cydonia Tourn. 53. Cynodon Rich. 178. Cynoglossum L. 107. Cynosurus L. 186. Cyperaceae Juss. 165. Cyperus L. 165. Cypripedium L. 156. Cystopteris Bernh. 199. Cytisus L. 36.

Dactylis 186.
Daphne L. 135.
Datura L. 111.
Daucus Tourn. 69.
Delphinium Tourn. 7.
Dianthus L. 21.
Digitalis Tourn. 113.
Diplotaxis D. C. 14.
Dipsacaceae D. C. 75.
Dipsacus Tourn. 75.
Doronicum L. 85.
Drosera L. 19.
Droseraceae D. C. 19.

Echinodorus Rich. 146. Echinops L. 87. Echinospermum Sw. 107. Echium Tourn. 108. Elaeagnaceae R. Br. 136. Elaeagnus L. 136. Elatinaceae Camb. 28. Elatine L. 28. Elsholtzia Willd. 119. Elymus L. 189. Epimedium L. 7. Epilobium L. 54. Epipactis Haller. 154. Equisetaceae D. C. 192. Equisetum L. 192. Erica L. 100. Ericaceae Klotzsch. 100. Erigeron L. 79. Eriophorum L. 168. Erodium L'Her. 33. Erophila D. C. 15. Erucastrum Presl. 14. Ervum Tourn. 43. Eryngium Tourn. 63. Erysimum L. 13. Erythraea Renealm. 104.

Euonymus Tourn. 35. Eupatorium Tourn. 76. Euphorbiaceae Kl. u. Gke. 137. Euphrasia Tourn. 118.

Fagopyrum Tourn. 135.
Fagus Tourn. 140.
Falcaria Rivin. 64.
Festuca L. 186.
Ficaria Dillen. 5.
Filago Tourn. 81.
Frngaria L. 48.
Frangula Tourn. 35.
Fraxinus Tourn. 102.
Fritillaria L. 159.
Fumaria Tourn. 9.
Fumariaceae D. C. 9.

Gagea Salisbury 160. Galanthus L. 157. Galega Tourn. 40. Galeobdolon Huds. 122. Galeopsis L. 122. Galinsoga Ruiz u. Pavon. 80. Galium L. 73. Genista L. 36. Gentiana L. 104. Gentianaceae Juss. 103. Geraniaceae D. C. 32. Geranium L. 32. Geum L. 47. Gladiolus Tourn. 157. Glaux Tourn. 129. Glechoma L. 121. Glyceria R. Br. 185. Gnaphalium Tourn. 82. Goodyera R. Br. 155.

Gramina Juss. 176. Gratiola L. 112. Grossulariaceae D. C. 61. Gymnadenia R. Br. 153. Gypsophila L. 20.

Halorrhagidaceae R. Br. 56.

Hedera L. 70. Heleocharis R. Br. 166. Helianthemum Tourn, 17, Helianthus L. 81. Helichrysum Gaertn. 82. Heliopsis Pers. 81. Heliotropium L. 106. Helleborus Adans. 6. Helminthia Juss. 91. Helosciadium Koch. 64. Hemerocallis L. 162. Hepatica Dillen. 2. Heracleum L. 68. Herminium R. Br. 154. Herniaria Tourn. 59. Hesperis L. 12. Hieracium Tourn. 94. Hierochloë Gmel. 177. Hippocastanaceae D. C. 31. Hippophaë L. 136. Hippuridaceae Lk. 56. Hippuris L. 56. Holcus L. 181. Holosteum L. 26. Hordeum L. 189. Hottonia Boerh. 129. Humulus L. 139. Hydrocharidaceae D. C. 145. Hydrocharis L. 145. Hydrocotyle Tourn. 63. Hyoscyamus Tourn. 110. Hypericaceae D. C. 30. Hypericum L. 30. Hypochoeris L. 92.

Hypopityaceae Klotzsch. 100. Hyssopus L. 121.

Jasione L. 97.
Iberis L. 16.
Ilex L. 102.
Illecebrum Tourn. 59.
Impatiens L. 33.
Inula L. 79.
Iridaceae Juss. 157.
Iris L. 157.
Juglandaceae D. C. 140.
Juglans L. 140.
Juncaceae Bartl. 163.
Juncaginaceae Rich. 147.
Juncus L. 163.
Juniperus L. 190.
Jurinea Cass. 89.

Merria D. C. 47. Knautia L. 75. Koeleria Pers. 181.

Labiatae Juss. 119.
Lactuca L. 93.
Lamium L. 122.
Lampsana Tourn. 90.
Lappa Tourn. 88.
Larix Tourn. 191.
Laserpicium Tourn. 69.
Lathraea L. 119.
Lathyrus L. 44.
Ledum L. 100.
Leersia Soland. 178.
Lemna L. 150.
Lemnaceae Lk. 150.
Lens Tourn. 44.

Lentibulariaceae Rich. 126. Leontodon L. 90. Leonurus L. 124. Lepidium L. 16. Leucoium L. 157. Levisticum Koch. 67. Ligustrum Tourn. 102. Liliaceae D. C. 159. Lilium L. 159. Limnanthemum Gmel. 103. Limosella L. 117. Linaceae D. C. 28. Linaria Tourn. 113. Linnaea Gron. 72. Linum L. 28. Liparis Rich. 156. Listera R. Br. 155. Lithospermum L. 108. Litorella L. 130. Lobelia L. 97. Lobeliaceae Juss. 97. Lolium L. 189. Lonicera L. 72. Loranthaceae Don. 71. Lotus L. 40. Lunaria L. 15. Lupinus L. 36. Luzula D. C. 164. Lycium L. 109. Lycopersicum Tourn. 110. Lycopodiaceae D. C. 194. Lycopodium L. 194. Lycopus L. 120. Lysimachia L. 127. Lythraceae Juss. 57. Lythrum L. 57.

Madia Molina. 81. Malachium Fr. 27. Malaxis Sw. 156. Malva L. 29. Malvaceae R. Br. 29. Marrubium L. 124. Marsileaceae Bartl. 194. Matricaria L. 84. Medicago L. 37. Melampyrum Tourn. 117. Melandryum Roehl. 24. Melica L. 183. Melilotus Tourn. 37. Melissa L. 121. Melittis L. 122. Mentha L. 119. Menvanthes L. 103. Mercurialis L. 138. Mespilus L. 53. Microstylis Nutt. 156. Milium L. 180. Mimulus L. 114. Moehringia L. 26. Moenchia Ehrh. 27. Molinia Much. 185. Monotropa L. 101. Montia Micheli. 59. Moraceae Endl. 139. Morus Tourn. 139. Mulgedium Cass. 93. Muscari Tourn, 162. Myosotis L. 108. Myosurus Dillen. 4. Myriophyllum Vaillant. 56.

Najadaceae Lk. 150. Najas L. 150. Narcissus L. 157. Nardus L. 190. Nasturtium R. Br. 9. Negundo Mnch. 31. Neottia L. 155. Nepeta L. 121. Neslea Desv. 16. Nicandra Adans. 110. Nicotiana L. 111. Nigella Tourn. 6. Nuphar Sm. 8. Nymphaea L. 7. Nymphaeaceae D. C. 7.

Penanthe L. 66. Oenothera L. 55. Oleaceae Lindl. 102. Omphalodes Tourn. 107. Onagraceae Juss. 54. Onobrychis Tourn. 42. Ononis L. 36. Onopordon Vaillant. 88. Ophioglossaceae R. Br. 195. Ophioglossum L. 196. Orchidaceae Juss. 152. Orchis L. 152. Origanum L. 120. Ormenis Cass. 84. Ornithogalum L. 160. Ornithopus L. 42. Orobanche L. 118. Osmunda L. 196. Osmundaceae R. Br. 196. Ostericum Hoffm. 67. Oxalidaceae D. C. 34. Oxalis L. 34. Oxytropis D. C. 41.

Panicum L. 176.
Papaver Tourn. 8.
Papaveraceae D. C. 8.
Papilionatae L. 35.
Parietaria Tourn. 139.

Paris L. 158. Parnassia Tourn. 20. Paronychiaceae St. Hil. 59. Pastinaca L. 68. Pedicularis L. 118. Peplis L. 58. Persica Tourn. 46. Petasites Tourn. 76. Petroselinum Hoffm. 64. Peucedanum L. 68. Phalaris L. 177. Pharbitis Choisy. 106. Phaseolus L. 46. Phegopteris Fée. 197. Philadelphaceae Don. 58. Philadelphus L. 58. Phleum L. 178. Phragmites Trin. 180 Phyllanthaceae Kl. u. Gke. 138. Physalis L. 110. Phyteuma L. 97. Picea Lk. 191. Picris L. 91. Pilularia L. 194. Pimpinella L. 65. Pinguicula Tourn. 126. Pinus Tourn, 191 Pirola Tourn. 100. Pirus L. 53. Pisum Tourn. 44. Plantaginaceae Jnss. 130. Plantago L. 130. Platanaceae Lestib. 142. Platanthera Rich. 153. Platanus L. 142. Plumbaginaceae Juss. 129. Poa L. 184. Podospermum D. C. 92. Polemoniaceae Lindl. 105. Polemonium Tourn. 105. Polycnemum L. 131. Polygala L. 20. Polygalaceae Juss. 20.

Polygonaceae Juss. 133. Polygonatum Tourn. 158. Polygonum L. 134. Polypodiaceae R. Br. 196. Polypodium L. 196. Polypogon Desf. 178. Pomariae Lindl. 53. Populus Tourn. 145. Portulaca Tourn. 59. Portulacaceae Juss. 59. Potamiae Juss. 147. Potamogeton L. 147. Potentilla L. 49. Poterium L. 52. Primula L. 128. Primulaceae Vent. 127. Prunella L. 125. Prunus L. 46. Ptelea L. 34. Pteris L. 197. Pulicaria Gaertn. 80. Pulmonaria Tourn. 108. Pulsatilla Tourn. 2.

Quercus L. 140

Radiola Dillen. 28.
Ramischia Opiz 101
Ranunculaceae Juss. 1.
Ranunculus Haller. 4.
Raphanistrum Tourn. 17.
Raphanus Tourn. 17.
Rapistrum Boerh. 17.
Reseda L. 19.
Resedaceae D. C. 19.
Rhamnaceae R. Br. 35.
Rhadoraceaeae Kl. 100.
Rhus Tourn. 35.

Rhynchospora Vahl. 166. Ribes L. 61. Robinia L. 40. Rosa Tourn. 51. Rosaceae Juss. 47. Rubiaceae Juss. 72. Rubus L. 48. Rudbeckia L. 81. Rumex L. 133. Ruta Tourn. 34. Rutaceae Juss. 34.

Sagina L. 25. Sagittaria L. 146. Salicaceae Rich. 142. Salicornia Tourn. 131. Salix Tourn. 142. Salsola L. 131. Salvia L. 120. Salvinia Micheli, 194. Salviniaceae Bartl. 194. Sambucus Tourn. 71. Samolus Tourn. 129. Sanguisorba L. 52. Sanicula L. 63. Santalaceae R. Br. 136. Saponaria L. 22. Sarothamnus Wimm. 35. Satureja L. 121. Saxifraga L. 62. Saxifragaceae Vent. 62. Scabiosa L. 75. Scheuchzeria L. 147. Schoenus L. 166. Scilla L. 161. Scirpus L. 166. Scleranthaceae Lk. 60. Scleranthus L. 60. Scorzonera L. 91. Scrophularia Tourn. 112. Scrophulariaceae R. Br. 111. Scutellaria L. 124. Secale L. 189.

Secale L. 189. Sedum L. 60. Selinum L. 67.

Sempervivum L. 61.

Senecio L. 85.

Serratula L. 89.

Seseli L. 66. Sesleria Scop. 180.

Sesleria Scop. 180. Setaria P. B. 176.

Sherardia Dillen. 72.

Sicyos L. 58.

Silaus Bess. 67.

Silenaceae D. C. 20.

Silena I 93

Silene L. 23.

Silybum Vaillant. 87.

Sinapis Tourn. 13. Siphonandrae Klotzsch. 99.

Sisymbrium L. 12.

Sium L. 65.

Smilacaceae R. Br. 158.

Smilacina Desf. 159.

Solanaceae Juss. 109.

Solanum L. 109.

Solidago L. 79.

Sonchus L. 93.

Sorbaria A. Br. 47.

Sparganium Tourn. 150.

Specularia Heister. 99. Spergula L. 25.

Spergularia Presl. 25.

Spinacia Tourn. 133.

Spiraea L. 47.

Spiranthes Rich. 156.

Stachys L 123.

Staphylea L. 34.

Stellaria L. 26. Stenactis Cass. 78.

Stratiotes L. 145.

Stupa L. 180.

Succisa M. u. K. 75.

Swertia L. 104.

Symphytum L. 108. Syringa L. 102.

Taraxacum Haller. 92. Taxus Tourn. 190. Teesdalea R. Br. 16. Terebinthaceae D. C. 35. Tetragonolobus Scop. 40. Teucrium L. 125.

Thalictrum Tourn. 1. Thesium L. 136.

Thlaspi Dillen. 15. Thrincia Rth. 90.

Thuja L. 190.

Thymelaeaceae Juss. 135. Thymus L. 120.

Thymus L. 120. Thysselinum Rivin. 68.

Tilia L. 30.
Tiliaceae Juss. 30.

Tithymalus Scop. 137. Tofieldia Huds. 163.

Tordylium Tourn. 69. Torilis Adans. 69.

Torilis Adans. 69. Tragopogon L. 91.

Trapa L. 56. Trientalis L. 127.

Trifolium Tourn. 38.

Triglochin L. 147. Trigonella L. 37.

Triodia R. Br. 183.

Triticum L. 188. Trollius L. 6.

Tulipa Tourn. 159. Tunica Scop. 21.

Turritis Dillen. 10. Tussilago Tourn. 76.

Typha Tourn. 150.

Typhaceae Juss. 150.

Ulmaceae Mirb. 140. Ulmaria Gil. 47. Ulmus L. 140. Umbelliferae Juss. 63. Urtica Tourn. 138. Urticaceae Endl. 138. Utricularia L. 127.

Waccinium L. 99. Valeriana L. 74. Valerianaceae D. C. 74. Valerianella Tourn. 74. Verbascum L. 111. Verbena L. 126. Verbenaceae Juss. 126. Veronica L. 114. Viburnum L. 71. Vicia L. 42. Vinca L. 103. Vincetoxicum Mnch. 103. Viola Tourn. 17. Violaceae D. C. 17. Viscaria Roehl. 22. Viscum L. 71. Vitis L. 32.

Waldsteinia Willd. 48.

Xanthium Tourn. 96. Xanthoxylaceae Adr. Juss. 34.

Zannichellia Micheli. 149. Zea L. 176.

# Berbefferungen.

Geit	e 5	Beile	20	v.	u.	lies: weftlich flatt: wetglich.
	5		16	<b>v</b> .	u.	lies: Lietow fatt: Tietow.
	14		2	b.	0.	lies: Rriegersfelbe fatt: Rringersfelbe.
	18		14	<b>b</b> .	u.	lies: Schr. ftatt: S.
	20		4	b.	u.	lies: D. C. ftatt: Juss.
=	28		6	b.	0.	lies: öftlich ftatt: nörblich.
	57					lies: Ceratophyllaceae flatt: Cerataphyl-
						laceae.
	63		4	v.	u.	lies: Cicuta statt: Circuta.
=	80		9	b.	u.	lies: Galinsóga statt: Galinsógea.
	90		4	v.	u.	fcalte ein: Wiefen, Triften vor: Balber.
	111		10	b.	o.	lies: norböftlichen ftatt: norbweftlichen.
	118		7	v	0.	fcalte ein: R. vor: Friedrichshagen.
	119		6	b.	0.	lies: Squamaria ftatt: Sqamaria.
	154		1	v.	ø.	lies: Br. ftatt: B.

Bebrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin.

# Flora

ber

# Provinz Brandenburg,

Det

Altmark und des Bergogthums Magdeburg.

Zum Gebrauche in Schulen und auf Excursionen bearbeitet

pen

Dr. Paul Micherion.

Dritte Abtheilung.

Specialflora von Magdeburg.

Berlin, 1864.

Berlag von Angust Hirschwald.
unter ben Linben Rr. 68.

# Berzeichniß

ber

# Phanerogamen und Gefäßkryptogamen,

welche im Umfreise von fünf Meilen um

# Magdeburg

bisher beobachtet worden find.

Bufammengestellt und berausgegeben

- pen

Dr. Paul Nicherion.

Berlin, 1864.

Berlag von August Birfdmalt. unter ben Linten Rr. 68.

# Vorrede.

Magdeburg, die Hauptstadt der reichen und intelligenten Broving Sachsen, ber Sit breier höherer Lehranstalten, entbehrt bis jett einer Flora feiner Umgegend. Dies ift um fo auffal= lenber, als biefe Gegend für die Begetation besonders gunftige Bedingungen Darbietet. Un ber Grenze bes mittelbeutschen Flötgebirges und ber nördlichen Diluvialebene gelegen, ver= einigt fie beiben Bebieten eigenthumliche Bflangen; fobann wird fte von der Elbe durchströmt, deren Fluthen, wie die ihrer Re-benflüsse, besonders der Saale, gar manche seltene Pflanze aus Böhmen, Sachsen, Thuringen berabgeführt und bier eingeburgert haben. Diefen gunftigen Bedingungen entsprechend, hat bie Umgebung Magdeburge auf 31,4 Quadratmeilen 1041 Befaßpflanzen aufzuweisen, einen Reichthum, ber ihre Flora in ben Stand fest, fich mit ben meisten Lotalfloren Nord= und Mittelbeutschlands zu meffen. Auch find biefe Schätze feineswegs unbemertt geblieben. Abgesehen von ben Beobachtungen Schol= ler's \*) im letten Drittel bes vorigen Jahrhunderts, Die jum großen Theil noch heute ihren Werth behalten, hat Berr Bofapotheter F. Hartmann seit bereits vierzig, sowie Berr Ghmma-fiallehrer Banfe seit breißig Jahren die nähere und entferntere Umgegend botanisch durchforscht. Letterer hat besonders seit 1855 bas botanifche Studium mit erneutem Gifer wieder auf-

<sup>\*)</sup> Flora Barbiensis. Lips. 1775. Supplem. Barb. 1787.

genommen und unterstütt von gleichgesinnten Freunden und eifrigen Schülern, bas Webiet nach allen Richtungen planmäßig burchlucht. Durch bas freundliche Entgegenkommen ber genannten und noch zu nennenden Freunde ber Botanit ift bem Berfaffer, der fich feit 1853 zu wiederholten Malen und in verschiedenen Zeiten beg Jahres wochenlang in Magdeburg aufgehalten und bas Gebiet täglich und in ben verschiedensten Richtungen burchstreift hat, Die Belegenheit gegeben worden, fast alle intereffanten Bflangen beffelben an ihren Standorten zu beobachten und fo bas Resultat jahrelanger Forschungen in furger Beit zur eignen Anschauung zu bringen. In jenen fconen Cagen, Die ber Berfaffer unter bem gaftlichen Dache feines vaterlichen Freundes Sartmann nur mit ber scientia amabilis beschäftigt verlebte, und welche er ftets zu ben angenehmften Erinnerungen feines Lebens rechnen wird, außerten Die botanischen Freunde, welche zwar ein reiches Material gesammelt hatten, aber burch Berufsaeschäfte und andere Berhaltniffe an ber Bearbeitung beffelben bisher gehindert worden maren, oft ben Bunfd, nach einer Lotalflora, und munterten ben Berfaffer auf. eine folche herauszugeben. Go ift unter ber bereitwilligften Unterstützung von allen Seiten das gegenwärtige Werkchen entstan-ben. Dies möge zur Erklärung des allerdings auffallenden Umstandes bienen, bag die erfte Flora Magbeburgs von einem Fremben verfaft ift.

Ueber die äußere Einrichtung des Werkdens ist Folgendes zu bemerken. Da die Begrenzung einer Lokalstora in den meisten Fällen etwas völlig Willkürliches ist, so ist das Gebiet rein mathematisch abgegrenzt worden, nämlich durch einen mit dem Halbmesser von fünf dentschen Meilen um Magdeburg gesichlagenen Kreis. Dasselbe ist nach seiner allgemeinen geognostischen Beschaffenheit in drei Regionen eingetheilt worden,

nämlich:

A (Alluvium), die Flufithäler ber Elbe und ihrer Nebenflüffe, Saale (mit Bobe) und Ohre.

Diluvium), bas außerhalb ber Flugthäler gelegene Be-

biet öftlich ber Elbe und nördlich ber Dhre.

(Flotgebirge), ben von ben verschiebenen febimentaren Schichten ber unteren Roblenformation ober Culm = Grauwade,

bes Rothliegenden, bes Bechsteins, bes bunten Sandsteins, bes Muschelfalfs, Des Reupers, Des Lias, Des oberen Jura, Der oligocanen Tertiarformation, fo wie von den abnormen Maffen bes Borphyre eingenommenen Raum, welcher öftlich vom Elb-. nördlich vom Ohrethal begrengt wird. Die speciellen geognosti= iden Berhaltniffe Diefer Wegend find von Fr. Soffmann\*) in einer, nach bem Urtheil eines ber gründlichsten geognoftischen Renner Mordbeutschlands, auch jett noch fast völlig genügenden Beife abgehandelt \*\*).

Die Angaben Dieses Werkchens beruhen auf Beobachtungen. bie fast ohne Ausnahme erft feit 1850 angestellt find. Es ift Dies von um fo größerer Bichtigfeit, als gerade in Diefem Bebiete, beffen fprichwörtliche Fruchtbarteit feine Bewohner gur möglichsten Ausbehnung bes Rulturbodens auffordert, ber Botanifer oft genug feine Lieblingeplate bem Bfluge verfallen fiebt.

Die Standorte find ftets in einer bestimmten Reibenfolge. nach ben Umgebungen ber Stabte und größeren Orte geordnet, aufgeführt; ber Raumersparung wegen sind die häufiger vor-

fommenden Namen der letteren abgefürzt, nämlich:

Bg. Burg. Brb. Barby. Brn. Bernburg. M. Magbeburg.

R. Rogan. D. Dichersleben.

S. Schönebed. St. Staffurt.

R. Reuhalbensleben. 2B. Wolmirftebt.

3. Berbft.

Ebenso find auch die Namen ber Beobachter abgefürzt, nämlich: Bns. Banfe, Lehrer am Babagogium bes Rloftere U. L. Frauen zu Dt., unterftutte ben Berfaffer burch gablreiche fcbrift= liche und mündliche Mittheilungen; Dk. Deife, Lehrer an ber

<sup>\*)</sup> Beitrage jur genaueren Kenntniß ber geognoftischen Berbaltniffe von Nordbeutschland. 1. Theil. Berlin, 1822 (1823). - Ueberficht ber orographischen und geognoftischen Berhaltniffe vom nordweftlichen Deutschland. Leipzig, 1830.

<sup>\*\*)</sup> Befentliche Erweiterungen unferer Renntniß feit Soffmann find nur die Buweisung bes Canbfteins von Plotte jur Graumade. fowie bie Entbedung bes oberen Jura zwischen Robensleben unb Bellen und im oberen Allerthale burch Dr. Emalb.

Bürgerschule zu Bg., mündliche und schriftliche Mittheilungen; E. Otto Engel, Pharmaceut, jett in Dessau, früher Gymnasiaft in M.; Eb. Ebeling, Lehrer an der Bürgerschule in M., desgl.; K. Dr. Korschel, Lehrer in Krossen, früher in Bg.: Flora von Burg, Burg 1856 und direkte Mittheilungen; M. S. Max Schulze, Gymnasiast in M., schristliche und mündliche Mittheilungen über die Gegend von N.; S. Schneisder, Bürgermeister a. D., früher in Schönebed, Manustript über die Standorte des Gediets; Sp. Dr. Th. Spieker, Oberslehrer an der Realschule zu Potsdam, früher in Brn., Mittheilungen über die Flora von Brn.; T. Dr. E. Torges, Königlicher Assistanzer in M., schriftliche und mündliche Mittheilungen. Außerdem sind die Werke von Schat, und Garck\*\*) benutzt worden. ! bedeutet, daß dem Bersasser trockne Exemplare von dem gedachten Standorte vorlagen; !! daß er die Pflanze selbst dort beobachtete.

Allen benjenigen, welche burch ihre uneigennützige und wohlwollende Unterstützung das Zustandekommen des Werkchens möglich gemacht haben, sei hiermit der herzlichste Dank ausgesprochen. Wöge es ihnen und allen Freunden der lieblichen Pflan-

zenwelt als zuverläffiger Führer von Ruten fein!

Berlin, ben 1. Januar 1859.

Dr. Paul Aicherson.

\*\*) Flora von Halle. Halle 1848.

<sup>\*)</sup> Flora von Salberstadt. Salberstadt 1854.

# Phanerógamae.

# I. Angiospermae.

# A. Dicotylédones.

# 1. Familie. Ranunculaceae Juss.

#### 1. Clématis L.

1. C. recta L. Wiesen und Gebiliche bes Elbthals, also A. Brb. Zwischen Göbnig und Dornburg!! S. Kapitelbusch!! Elbinsel Eb. M. Elbbamm bei Prester!! Rothehorn-Wiesen E.!! Damm süblich vom Bieberiger Busch T.!! Bg. Süblich vom Dunker See K.! R. Am Unterholzer Berg E.!!

\*C. Vitalba L. nur angepflangt, g. B. M. Friedrich : Wil- beime : Garten.

#### 2. Thalictrum Tourn.

2. T. flexuosum Bernh. Wiesen, Abhänge, zerstreut. S. Spite Berg bei Alten-Salze; Fuß ber Zenser Berge S.! Frohseiche Berge Eb. M. Rothehorn-Wiesen!! an ber Chansse nach Gerwisch S. R. Burgwall bei Althalbensleben M.S.! Brn. Eb.

b) majus Koch (als Art) G. Wolfstehlenbusch S!

3. T. angustifolium Jcq. Wiesen und Gebuiche, nur A, ichr zerstreut. S. Wolfskehlenbusch S. Dt. Rothehorn T.! Bg. 3wischen Detershagen und löbekühn K. R. Unterhagen E.!! R. Erbke am Bullengraben E., M. S.!

4. T. flavum L. Wiesen, wohl nur A, häufig, 3. B. S. Buschwiesen S. M. Wiesen zwischen bem Subenburger Thor und Friedrich-Wilhelms-Garten!! Rotheborn-Wiesen S. Bg. Rachtweibe K.

R. Freischitz M. S.! Papenberg; Erbte M. S. R. Bathen !! D. Bulferstebt Scht. Bobennieberung von Tarthun bis St. Scht.

#### 3. Hepática Dillen.

5. H. triloba Chaix. Laubholzwälber, Gebüsche, sehr zerstrem. R. Papenberg M. S.! Bellenberge bei Dönnstebt S., M. S.! D. Brandsleber Holz am Bach S.; Hatel!!

#### 4. Pulsatilla Tourn.

6. P. vulgaris Mill. Sonnige Hügel, lichte Wälber, zerstrent Z. Butterberg!! S. Plögth; zwischen Pretzin und Dornburg; Reut Milhte Eb. M. Zwischen Wahlitz und Gommern E.! Bg. Westlich von ven Chausse-Kienen K.! Wissen-Rogdsen J. Müller. R. In und am Oberhagen E.!! N. Kolbiger Heibe bei Planken M.S.! Benitz M.S.! Benitz M.S.! Bernitz M.S.! Bernitz M.S.! Egeln Scht.

7. P. pratensis (L.) Mill. An benjelben Orten als vorige, of mit ihr zusammen. S. Mühlinger, Kejeken-, Frohseiche Berge, Besterhusen S. Randau; Plöth Eb. M. Alusheibe Bns. R. Am Oberhagen!! R. Kolbiger heibe M. S.! Galgenberg; heibe nach bem

Detel gu M. S.

#### 5. Anemone L.

8. A. nemorosa L. Gebüsche, Laubwälber, gemein, 3. B. Brb. Bei Dornburg S. S. Kapitelbusch; Grünewalbe S. Kreuzhorst Eb. M. Zuderbusch; Bogelgesang Eb. Bieberitzer Busch S. R. Dagen E. Rammstebt!! R. Planten; Benitz; Papenberg; Hagen M.S. Wellenberge bei Dönnstebt S. D. Hatel S. Egelsche Forst S. 9. A. ranunculoides L. Gebüsche, Laubwälber, häusig. Brb. Schlößgarten zu Dornburg S. S. Busch; Kapitelbusch S.; bei

9. A. ranunculoides L. Gebiliche, Laubwälder, häufig. Brb. Schlösgarten zu Dornburg S. S. Buich; Kapitelbusch S.; bei Grünewalbe am Rachtigallensteig!! M. Bogelgesang T.! Bg. Birgerholz zwischen Heibau und Sandforthslake K.! R. Hagen. H. Benit M. S.! beim Schweinering im Oberholz M. S.! Papenberg M. S. Wellenberge bei Dönnstedt S. D. Hatel S. Egelsch: Forft S.

#### 6. Adónis Dillen.

† A. auctumnalis L. Zierpflanze aus Gub. Europa, verwilbert. R. Auf Aedern neben ber Chauffee bei Gr. Ammensieben M. S.!

10. A. aestivalis L. Lehmader, zerftreut. G. Bwifchen Salze und Relgeleben; vor Eggereborf S. M. An ber Leipziger Chauffee

Eb. Rrafauer Ader Bns. 2B. Meder nach Camewegen gu H. En-

gel!! D. Chermie; Ampfurt Eb.

† A. flammeus Jog. Meder, mabriceinlich mit frembem Gamen eingeführt, baber unbeständig. G. Bon Eb. nur einigemal ge-

funden. D. Am Satel Scht.

11. A. vernales L. Abhänge, Felbraine nur F, meist auf Ralt. R. Gutenswegen; Gliffig M. S. ! D. An ber flibl. Spite bes Brandsleber Bolges neben ben Riefern S. Beteborn am Batelberg; Rrottorf an ber zweiten Steintuble Scht. St. Bwifden Bornide und Bedlingen S. Reundorf am tablen Grafemeg!! Brn. Aderraine nach Grena zu Sp.!

#### 7. Myosúrus Dillen.

12. M. minimus L. Meder gemein.

### 8. Batráchium E. Meyer.

13. B. hederaceum (L.) E. Mey. Quellen, seichte fliegenbe Graben, Moorloder, fehr zerftreut. 2B. 3mifden Fareleben u. Bie-lit E. R. Graben neben bem Weg nach bem Sagen am Sühnerberg bis 1855 E.!, bann ausgerottet; R. Graben bieffeit bes ichwarzen Bfuble bei Bulftringen M. S.! (Etwas jenfeit ber nordl. Grenze bei ber Lüberiter Baffermühle E!!)

14. B. aquatile (L.) E. Mey. In fugem und falgigem, fteben-

bem und fliegenbem Baffer fehr gemein.

15. B. divaricatum (Schrk.) Wimm. Stebenbe und langfam fliegenbe Gemaffer häufig. 3. Pfannenteich!! G. Rothe; Teich bei ber Kreughorft S. D. Bechaner Gee S. Mittel - Elbe!! Teich beim Bieberiber Buich S. Bg. Rillauer Mühlteich!!

16. B. fluitans (Lmk.) Wimm. Schnell fliegenbe Bemaffer, felten. D. Bobe bom Ausfluß bes Daublgrabens bei Rrottorf ab-

märts Scht.

#### 9. Ranúnculus Haller.

17. R. Flammula L. Gumpfe, Graben, gemein.

18. R. Lingua L. Tiefe Gumpfe, Graben, gerftreut. Brb. Babeger Teich!! G. Beim Finn S. B. Zwischen Farsleben und Bie-lit E. Camswegen!! Bg. Riegripp S. zwischen habberg und Dilmte Bufen unweit ber Station!! D. Freischuts M. S. D. Bulferflebt Sch.

19. R. illyricus L. Sonnige Bugel, nur F. G. Am Summelsberg!! und auf ben Frohseichen Bergen Eb.!! St. Bei Loberburg; Bedlingen; und bei St. felbft Scht. In ben 4 letten Standorten meift von Schafen abgeweibet und nicht blübenb.

20. R. auricomus L. Laubwälber, häufig. 3. B. Bufch S. Grünewalbe!! D. Bieberiger Buid!! Derrnfrug!! Bg. K. Sagen; Bellenberge M. S. D. Satel!!

21. R. acer L. Wiefen, Gebiliche, gemein.

22. R. lanuginosus L. Feuchte, ichattige Laubmalber, febr gerftreut. Bg. Burgerholg amifden bem Beibbau und ber Canb fortbelate K.!! Bulfbagen S. R. Unterbolger Berg E.!! Unter-

bagen E. R. Wellenberge bei Donnftebt S., M. S.!

23. R. polyanthemus L. Wiefen, Damme, Laubmalber, meift M, baufig, 3. B. G. Rapitelbuich!! bei Grunewalbe; por Ranbau S. Dt. Un ber Berliner Chauffee!! an ber Elbe gwifchen Frie brichftabt und herrntrug!! Bg. Deichwall K. Bulfbagen K.! R. Mue E. M. S.

24. R. repens L. Wiefen, gemein.

25. R. bulbosus L. Abhange, Wegrander, Laubwalb, febr

bäufig.

26. R. sardous Crtz. Lehmader mit feuchtem Untergrunt. gerftreut. 3. Bor bem Beibethor !! bei Butricau !! G. Am Ronbel: beim Sooltanal; bei Gr. Mühlingen S. Di. Gulborf Eb. füblich bom Bieberiter Buich!! 2B. Am füblichen Bege nach Samsmegen!! Bg. Bürgermart K.!

27. R. arvensis L. Meder, befonbers auf Lehmboben, febr baufig, g. B. 3. Butricau!! G. Felgeleben; Summeleberg Eb. amifchen Bretin und Dornburg neben bem Balbe S. Rablenberge Eb. D. Bei Dobenborf!! filblich vom Bieberiter Bufch!! 2B. Am

Bege nach Camewegen!! Bg. Ober-Giltter K.
28. R. sceleratus L. An Graben, Gimpfen, ilberichwemmten Stellen febr baufig, 3. B. G. Bullenwiefe Eb. am Soolfanal S. Badmunbe Eb. D. Un ber Sternichange!! Langenwebbingen!! B. Bwifden Camsmegen und Linbhorft!! Bg. K. R. Pabenberg M. S.

#### 10. Ficária Dillen.

29. F. ranunculoides Mnch. Laubwalber, Bebuiche gemein, 3. B. G. Bufd S. Grunewalbe !! Dl. Bieberiter Bufd S. R. Rammftebt !!

#### II. Caltha L.

30. C. palustris L. Raffe Biefen, gemein.

#### 12. Trollius L.

31. T. europaeus L. Mäßig fenchte Balbwiesen, felten. D. Bwifden Alt-Brandsleben und Eggenfiebt öftlich vom Bege; Safel im Bafferthal S.

#### 13. Nigella Tourn.

32. N. arvensis L. Lehmäder in F und D, zerstreut. Z. Acder zwischen bem Friedrichsholz und Eichholz!! S. Milhlinger, Zenjer, Frohjesche und Sohliche Berge S. Westerhüfen Eb. M. Zwischen Dobenborf und Sulldorf!! R. Am Steinort E.! Mühlensselb E.! N. Aeder beim Warenberge M. S.! D. Emmersberg Scht.

#### 14. Aquilégia Tourn.

33. A. vulgaris L. Laubwälber, selten. R. Oberhagen am Junterwege E.!! D. hatel Scht. Gine häufige Zierpflanze.

### 15. Delphínium Tourn.

34. D. Consolida L. Meder, gemein.

#### 16. Aconitum Tourn.

35. A. variogatum L. Bergige Laubwälber, selten. D. hatel: Oppeniches holz am Rochstebter Bege und vorbern Schmerlenteich Eb.!

# Familie Berberidaceae Vent.

#### \* Bérberis L.

\* B. vulgaris L. Im Gebiet nicht einheimisch, sondern nur gu Beden u. f. w. gepflangt.

# 2. Familie. Nymphaeaceae D. C.

### 17. Nymphaea L.

36. N. alba L. Stehende Gemässer, häufig, 3. B. B. Babesger Teich!! S. Röthe; Grünewalbe S. Kreuzhorst Eb. M. Bechauer See Bns. Bg. Kirchwasser, Dunter See K. N. Behrends Wiese; alte Ohre; Freischilt M. S. O. Kuhlachen bei Alidenborf Scht.

#### 18. Nuphar Sm.

37. N. luteum (L.) Sm. Wie vorige, oft mit ihr zusammen, z. B. Brb. Gr. Rosenburg Eb. S. Röthe, Grilnewalbe S. Kreuzhorft Eb. M. Pechauer See Bns. Bg. K. N. mit voriger M. S. D. Alte Bobe bei Gröningen Eb. Krottorf am Amt; Alidenborf Scht.

# 3. Familie. Papaveraceae D. C.

#### 19. Papaver Tourn.

38. P. Argemone L. Meder, febr häufig.

39. P. hybridum L. Kultivirter Boben, fehr felten. D. An ber Eisenbahn vor bem Bruche und an ber nörblichen Seite bes mittleren Grabens im Bruche, westlich von ben Stegen Scht. Kalbe auf Schutthaufen bei einer Tuchfabrik von S.! nur einmal gefunden, wohl nur eingeschleppt.

40. P. Rhoeas L. Meder, gemein.

41. P. dubium L. Aeder nicht häufig. S. Eisenbahngraben nach Gnabau; Frohsesche Berge; zwischen Pretin und Dornburg S. M. Zwischen Diesborf und Nieber-Dobeleben Bns.

\*P. somniferum L. Auf Aedern gebaut, besonders F.

#### 20. Chelidónium Tourn.

42. Ch. majus L. Baune, Schutthaufen, Wegranter, gemein.

# 4. Familie. Fumariaceae D. C.

### 21. Corydallis D. C.

43. C. cava (L.) Sohw. u. K. Feuchte, schattige Gebüsche und Laubwälber, zerstreut. W. Barleber Busch S. Bg. Am Deichwall stiblich vom Dunker See K.!! R. Kapellberg E.!! Unterholzer Berg E. R. Wellenberge bei Dönnstebt M. S.! Egeln Eb. Brn. Krumbholz Sp.! Saalbüsche oberhalb Kalbe Bns.

44. C. intermedia (L.) Mer. Wie vorige. R. Bactofenberg M. S. ! Papenberg M. S. ! Ronnenspring; Althalbensleber Ziegeln M. S. Bellenberge bei Dönnstebt Bas. ! D. Alte Dorf F. Reineke.

45. C. pumila Host. Wie vorige. Brb. Zwischen Tochheim und ber Polei=Milhte S. S. Neue Milhte bei Gommern an ber Ehle E.! R. Bacosenberg M. S.! Althalbensleber Park beim Elbpavillon M. S.! Bellenberge bei Dönnstebt Bns.! M. S.!

†C. lutea (L.) D. C. Zierpflanze aus Sibbeutschland, völlig eingebürgert. 3. An ben fünftlichen Felsen im Schlofigarten!! und an ber Chaussebriide bei Biltrichau!! M. An Mauern in Budan Bns.! hier schon seit 20 Jahren.

#### 22. Fumária Tourn.

† F. capreolata L. In Garten bei Brb, verwilbert Rother! Db noch jest ju finben?

46. F. officinalis L. Auf fultivirtem Boben, gemein. 47. F. Vaillantii Loisl. Aeder, Gartenland, nur F, felter. G. Doben Eb. St. Un ber Gifenbahn bei Banfefurt Bns.! Rathmanneborf im Amtegarten Bns.

# 5. Familie. Cruciferae Juss.

#### + Cheiranthus L.

† Ch. Cheiri L. Zierpflange aus Gilbbeutichland, verwilbert. St. An ber Ctabtmauer und am Zwinger auf ber Guboftfeite Garcke!

#### 23. Nastúrtium R. Br.

48. N. officinale R. Br. In Graben mit fugem und falgigem Baffer, haufig. 3. Butterbamm!! und Graben neben ber Strafe nach Trobnit!! Brb. Beim fauern Zeit Eb. G. Reben bem Grabirwerf bei Salze!! Bullenwiese!! Pretin am Reffelteich!! M. Langen-webbingen!! Gillze zwischen Gillborf und Dobenborf Bns. Bg. Chauffeegraben norblich von Schermen K.! Graben in Bibbetleben K.! R. Nachtweibe E. !! R. Graben ber Magbeburger Chauffee M. S.

49. N. amphibium (L.) R. Br. Gumpfe, Graben, feuchte

Stellen, gemein.

b) auriculatum F. Hartm. D. Friedrich-Bilbelme-Gar-

ten F. Hartmann!

50. N. austriagum Crtz. Elbwiesen in vereinzelten Grup-pen, baber mohl burch hochwasser eingeführt. Brb. hopplate bei Grüneberg Eb. 1856. G. Grünewalbe am Damm nach Ranies Eb. 1854 !! M. Rothehorn-Biefen, Rratau gegenüber E. 1855 !! Rotheborn-Spite E.! \*)

51. N. silvestre (L.) R. Br. Feuchte, überichwemmte Stel-

len, gemein.

52. N. palustre (Leyss.) D. C. An ähnlichen Stellen nicht fo bäufig. S. Sooltanal Eb. vor bem Busch; Grünewalbe zwischen bem Damm und ber Elbe; vor Ranbau S. Dt. Bieberit Bns. Bg. K.

53. N. pyrenaicum (L.) R. Br. Elbwiefen, felten. bei Saalhorn Eb. G. Zwifchen Grunewalbe und ber Alten Fahre S. D. Gublich von ber Berliner Chauffee \*\*) in ber Nahe ber Lagois-

\*) Unter "Berliner Chauffee" ift hiereimmer nur bie Strede berfelben gwiichen bem Charlotten-Thor und bem Richter'ichen Gafthof verftanben.

<sup>\*)</sup> Diefe Bfiange murbe auch außerhalb ber Flora, am Schlogberge bei beim-ftebt 1856 vom Gymnafiaften M. Klapproth! gefammelt und mir von E. mitgetbeilt.

ichen Ziegelei!! bier von F. Hartmann icon vor 30 Jahren aufgefunben; Arakauer Anger, einzeln!! Diefe Pflanze erreicht bier ibrei

nörblichften Stanbort.

49., 51., 52. und wahrscheinlich auch 50. bilben auf ben Eswiesen zahlreiche Bastarbsormen, welche noch nicht hinreichend außeklärt sind. Unterschieden ist bisher nur 49×51. N. amphibium × silvestre (N. anceps Rohb.) S. Kapitelbusch; an der Elbe vor Nandau S.! M. Am Wege nach Pechau!! an der Elbe zwischen ber Friedrichstadt und dem Herrnkrug!!

#### 24. Barbaraea R. Br.

54. B. vulgaris R. Br. Wiesen, feuchte Stellen, gertreut S. Wolfstehlenbusch; hinter bem Kapitelbusch S. Tobtenhäger bei Grilnewalbe!! M. Rothehorn Bus. R. Schmudsborf E.

b) arcuata (Opiz) Rehb. (als Art). S. Rapitelbufch; Elb-

in fel Eb. D. Elbufer am 3minger!!

. 55. B. stricta Andrzj. Weidengebiliche, feuchte Stellen, im n. häusiger als vorige. S. Vor dem Busch!! Grünewalde & Kreuzhorst!! M. Elbuser fildlich vom Herrnfrug!! Biederitzer Busch an der Ofiseite!! Bg. Deichwall!! Elbuser in Blumenthal K. K. Aue E. St. Bode-Ufer Scht.

#### 25. Turritis Dillen.

56. T. glabra L. Bälber, unbebaute Stellen, zerstreut. 3. Eb. S. Zwischen Frohse und Salze Eb. Kapitelbusch; Streitheite bei Gommern; Bretziner Kirchhof S. M. Heyrothsberge T. &g. Birkensteig K. R. Am Wege nach Rammstedt!! D. Emmersberg Scht. Friedrikenbusch bei Neindorf F. Reinecke.

# 26. Arabis L.

57. A. Gerardi (Bess.) Koch. Baldwiesen, nur im Elthal, zerstreut. S. Pflanzgarten im Bufch S. am Nachtigallenfteig bei Grunewalbe Eb.! E.! M. Bieberiter Buich, vereinzelt!!

58. A. hirsúta (L.) Scop. Wiesen, Wälber, Abhänge, gerstreut. S. Bei Döben S. Reue Mühle bei Gommern Bns. Bg. Bei ber Külzauer Mühle!! R. Moorwiese vor dem Hagen E.! R. Bei Krohnens Ruh M.S. D. Brandsleber Holz Scht.

A. arenosa (L.) Scop. M. Elbufer bei ber alten Reuftabt 1857 vereinzelt T.! Rotheburn 1858 Bas.; wohl nur von jufalig

angeschwemmtem Samen herrührenb.

#### 27. Gardamine L.

59. C. parviflora L. Ueberschwemmte, im Sommer troden werdende Stellen, an Külfen, nur im Elbthal, zerstreut. S. Griines walde an der Amtmannslache vor dem Querweg S. Krenzhorst in den Beggräben beim Forsthause E.!! Dt. An einem Kult zwischen der Berliner Chaussee und dem Biederitzer Busch E.!! Bg. Nordöstslich vom Kirchwasser K.

60. C. impatiens L. Laubwälber bes Elbthals, zerftreut, aber fehr gesellig. S. Grünewalbe bei ber Amtmannslache Eb.! Ranies Eb. Kreughorst. M. Bieberiger Bujch, besonbers an ber

Oftseite!! R. Oberhagen, einzeln; Geelenhau E.

61. C. hirsuta L. Grufige, feuchte Stellen, Laubwälber, fehr zerftreut. S. Grilnewalbe, öftlich vom Bege nach ber Alten Fahre Eb.! Bg. Deichwall, Sibseite, westl. vom Blumenthalschen Bege E.!!

62. C. pratensis L. Raffe Biefen, gemein.

63. C. amara L. Walbsumpfe, an Bachen, zerstreut. Brb. Zwischen Walternienburg und ber Polei-Mühle S. Göbnit Eb. S. Beibenbruch bei Plötzty; lettes Erlenbruch vor Dornburg S. Bg. Saugraben unterhalb ber Schermenschen Mühle!! Moltenbruch K. Moorwiese am Hagen E.! Unterholzer Berg E. Erlenbruch nörblich von Bathen!! D. An ber Bobe Scht.

#### † Hésperis L.

† H. matronalis L. Baufige Zierpflanze aus Gubbeutschland, verwilbert G. Auf bem Friedhof S.

#### 28. Sisýmbrium L.

64. S. officinale (L.) Scop. Begrander, Baune, Schuttftels

len, gemein.

65. S. Loeselii L. Auf und an Mauern, Begrändern, zersftreut. M. Mauern ber Festungswerke ber Stadt und Citadelle häusig, besonders zahlreich am Ulrichsthor!! Begränder an der Mittel-Clbe bei der Citadelle!! Bg. Auf der Stadtmauer beim Oberthor Dk.!! D. Krottorf Scht. St. Scht. Brn. Am Schloß Garcke und an der Stadtmauer Sp.

66. S. Sophia L. Schuttstellen, an Begen, gemein.

67. S. strictissimum I. Beibengebiliche in ber Rabe ber Eibe, fehr felten. M. Spitze bes großen Berbers, Juni 1858 von H. Engel entbedt!! Erreicht hier feine nörbliche Grenze.

68. S. Thalianum (L.) Gaud. Magere Meder, trodne Bal-

ber, gemein.

#### 29. Alliária Adans.

69. A. officinalis Andrzj. Gebüsche, Laubwälber, icht häufig. 3. B. S. Busch; Grünewalbe S. Kreuzhorst!! M. Friederich-Wilhelmsgarten!! Bieberiger Busch!! Bg. L. R. Rammstebt!! R. M. S. D. Hakel: Domburg!!

#### 30. Erysimum L.

70. E. cheiranthoides L. Ufer, Baune, Gebiliche, fehr baufig, 3. B. C. Buich S. M. Elbufer auf bem Rothenhorn!! D.

Amtsgarten; St. Bobe-Ufer Scht.

71. E. hieraciifolium L. Ufergebüsche, Maueru, zerstreut. Brb. Zwischen Kämerit und Poleimühle Dr. Mohs! S. Buschaus; Glinde Eb. Alter Kirchhof S. M. Auf einer Gartenmauer in der Kutscherftraße F. Hartmann! Elbufer bei der Rothehorn-Spitze E.! Bei der Eisenbahnbrilde über die Mittel-Elbe E.!! Berderspitze E.!! Elbufer süblich vom Herrnfrug!!

#### 31. Brássica L.

\* B. oleracea L. In Gemüsegarten fultivirt, in febr vielm Abarten.

B. Rapa L.

\* a) annua Koch. Sier "Sommerfaat".

\* b) oleifera D. C. hier "Winterfaat", beibe in großem Maaßstabe kultivirt.

\* c) esculenta Koch. In Garten und auf Aedern kultivirt. † d) campostris L. (als Art). Aeder, Schutthaufen, jehr

häufig verwilbert.

\* B. Napus L.

\* a) annua Koch.

\* b) oleifera D. C., beibe in großem Dafftabe gebaut.

\* c) Napobrassica L. Selten tultivirt.

72. B. nigra (L.) Koch. Weibengebiliche, Wiesen, zerstreut Brb. Zwischen Alt-Tochheim und Klein-Rosenburg!! S. Kapitelbusch S. M. Rothehorn Bns.! Werberspite E.!! Subenburger Wiesen S. D. Anbersleben siblich von ben Arbeiterhäusern; zwischen St. und Förberstebt Scht. Auch gebaut und verwilbert.

#### 32. Sinápis Tourn.

73. S. arvensis L. Meder gemein.

† S. alba L. Gehr häufig gebaut, theils ber Samen wegen, theils als Ginfaffung ber Aeder, um bas Bieb abzuhalten. Bolig

verwilbert 3. B. Brb. bei Klein-Rosenburg S. G. An ber Gisenbahn nörblich von Frohje S.

#### † Erucastrum Presl.

† E. Pollichii Sch. u. Sp. Aderränder, Abhänge. M. Am Wiesenberg bei Nieder-Dobeleben E.! von Bns. 1856 aufgesunden. Jebenfalls mit fremben Samen eingeführt, 1857 wieder verschwunden. Bahrenborf 1858 Eb. St. Bei hedlingen am neuen Bege nach Gänsesurt 1858 zahlreich Eb.!!

#### † Diplotáxis D. C.

† D. muralis (L.) D. C. Aeder, Begränber, auf F. S. Eidenborf Eb. Belsleben an ben Begen nach Bahrenborf, Süllborf und Dobenborf häufig S. M. Zwischen Dobenborf und Ofterwebbingen Bns.!! Bahrenborf Eb.! St. Bei Börnide S. Zwar an mehreren Stellen zahlreich und bis jett beständig, aber doch ohne Zweisel nur mit frembem Samen eingeführt.

#### 33. Alyssum L.

74. A. montanum L. Dürre, sonnige Higel, Kiefernwälber, besonders in D, zerstreut. Brb. Auf ber Anhöhe süblich von Tocheheim!! S. Destlich von Pretzin S. Bei der Bindmühle von Dannigkow Eb. M. Klusheide Bns.!! Mieferngehölz nörblich von Gerwilch E.! Bg. Bei der Schemenschen Mühle Bns.!! westlich von Litben, nörblich von der Eisenbahn K.

75. A. calýcinum L. Abhänge, Aeder, Begränber, zerstreut. B. An ber Chaussee nach Tochheim Dr. Mohs.! S. hummelsberg; Frohlesche Berge; Eisenbahngraben süblich von Besterhilfen S. Aeder bei Calbte!! Dt. Engelsberg; Jungfernberg S. Bei Langenweddingen nach Sülldorf hin!! Bg. Bei ber Schermenschen Mühle K.!!

#### 34. Bertéroa D. C.

76. B. incana (L.) D. C. Begranber, Sanbfelber, gemein.

#### 35. Draba L.

77. D. muralis L. Grafige Stellen, fehr felten. Bg. An ber Subfeite bes Deichwalls westlich vom Blumenthalschen Wege, sehr zahlreich K.!!. Ursprilinglich sicher burch hochwasser bahin gestommen, und zwar wohl zunächst von Dessau.

#### 36. Eróphila D. C.

78, E. verna (L.) E. Mey. Sanbfelber, Abbange, gemein.

#### † Cochleária L.

† C. Armorácia L. Als Gemusepstanze hier und ba gebam und an Graben, Usern, Zäunen verwilbert. Brb. Chprina Eb. S. Ronbel Eb. Hummelsberg S. B. An ber Chausse nach Kolbig!! D. Theilungen und Schiffgraben; St. Bobe-Ufer Scht.

#### 37. Camelina Crtz.

79. C. microcarpa Andrzj. Aeder, häufig, 3. B. S. Frehseiche Berge Eb. am Hummelsberg; zwischen Salze und Felgeleben S. M. An ber Berliner Chausse!!

80. C. sativa (L.) Crtz. Leinader, gerftreut.

a) integrifolia. R. E.!! Bathen E.!! (in ungeheurer Menge jenfeit ber Grenze bei ber Lüberiger Baffermühle E.!!)

b) dentata (Willd.) Pers. (als Art). 3. Zwijchen Rieberund Hohen-Lepte S. Brb. Nörblich von Göbnitz Bas.!! Bg. Löbefühn K. R. E.!! Bathen; Mahlpfinhl E.!! (Bei ber Lüderiten Waffermühle E.!!)

#### 38. Thlaspi Dill,

81. T. arvense L. Lehmader in F und M, gemein.

#### 39. Teesdálea R. Br.

82. T. nudicaulis (L.) R. Br. Kiefernwälber, Sanbfelber, faft nur D, zerstreut. Z. Aeder beim Friedrichsholz!! Jütrichau! E. Zwischen Pretin und Dornburg; Gommersche Forst; Plötst S. Rambau am Kirchhof Eb. M. Klusheibe Bns. Heyrothsberge T. Zwischen Biederit und Gerwisch!! Bg. Schermensche Mühle!! Gufen!! R. Beim Dibnerberg E.! Rammstebt!! R. Reuenhofe!! Bei ber Warte; Erbte M. S.

#### † Ibéris L.

† I. amara L. Bierpflanze aus Gubbeutschland, verwilbert: Egeln, ber Mauer bes Umtsgartens gegenüber S.

#### 40. Biscutella L.

83. B. laevigata L. Kiefernwälber, Sanbfelber, nur D, selten, aber gesellig. Brb. Tochheim Eb. Rörblich von Göbnig!! S. Plötth E.! zwischen Plötth und Pretin Eb!! Zwischen Pretin und Dornburg Eb.!! M. Beim Forsthaus Alte Klus Bns.!! Erreicht hier bie Grenze ihrer Verbreitung nach Nordost.

#### 41. Lepídium L.

84. L. Draba L. Aeder, Schuttstellen, Wegränder, selten und öfter unbeständig. Deist wohl nur mit frember Saat eingesührt. S. In ben Anlagen beim Soolbade Elmen Eb.!! Unter ben Beiben nörblich von Frohse S. M. Sternschanze 1857 B.! Dobensborf Eb. Sülldorf bei ber Kirchenmühle 1853 sehr zahlreich F. Hartmann!!

+ L. sativum L. Als Gemijepflanze zuweilen gebaut und an Begrändern, auf Nedern verwilbert: G. Am Stadtgraben S. R.; Bathen; Mahlpfuhl E.!! an ben brei letten Orten unter Lein fehr

zahlreich.

85. L. campestre (L.) R. Br. Lehmäder, selten; an Wegränbern, Schutstellen u. j. w., zuweilen vereinzelt. S. Plötty hinter bem Kesselteich S. M. Hohlweg bei Lemsdorf S. Rothehorn-Biesen, einzeln 1857 E.!! Klus Bns.! Mödern Eb. B. Nach Samswegen zu H. Engel!! Bg. An ber Gisenbahn beim Saugraben einmal K.

86. L. ruderale L. An Wegen, Bannen, Schuttstellen, be-

fonbers um Dl., gemein.

#### 42. Capsella Vent.

87. C. Bursa pastoris (L.) Mnch. An Wegen auf fulti-

virtem Boben, febr gemein.

88. C. procumbens (L.) Fr. An Salinen, auf salzhaltigen Triften, meift sehr gesellig. S. An ber Sübosseite bes Grabierwerts zu Gr. Salze in ungeheurer Menge Eb.!! M. Sillborf, Silizewiesen nach Dobenborf bin, vereinzelt Bas. St. hecklingen, besonders um die Postbrilde und nach Gänsesurt bin Scht.; zwischen St. und Brn. Garcke.

### 43. Corónopus Haller.

89. C. Ruellii All. An Zäunen, auf Lehmwegen, Straßenspstafter ber Stäbte, F und A sehr häufig, D selten. Brb. Bei Kolphus!! S. Ronbel Eb. Salze S. Weg beim Forsthause Kreuzshorft!! M. Auf Lehmwegen ber Felbmart auf bem linken Elbufer höchft gemein!! Süllborf!! B. Beim Posthause!! Bg. Kolonie K. R. Weg nach dem Detzel unterhalb bes Trenbelbergs M.S.! St. Eb. Brn. Sp. Kalbe Eb.

#### 44. Néslea Desv.

90. N. panniculata (L.) Desv. Aeder, Begränber, zerstreut. S. Gnabau Sp. Bor Dornburg S. Rreughorst!! M. Langenweb-

bingen am Beg nach Sullborf!! Gr. Bartberg bei Schnarsleben!! Bg. Schermeniche Mühle; nörblich vom Bahnhof K. R. Loitiche E. nörblich von Bathen E.!! Kalbe Sp.

#### 45. Rapistrum Boerh.

91. R. perenne (L.) All. Aeder, nur F, zerstreut. S. An ben Frohseschen Bergen!! Sohlsche Berge S. M. Wiesenberg bei Nieber-Dobeleben S. Dahlen-Warsleben E.! St. Hedlingen!! Brn. Sp. Erreicht hier die Grenze seiner Berbreitung nach Nordosten.

#### 46. Raphanistrum Tourn.

92. R. arvense (All.) Wallr. Meder, gemein.

### \* Ráphanus Tonrn.

\* R. sativus L. als Gemufepflanze gebaut.

# 6. Familie. Cistaceae Dun.

#### 47. Heliánthemum Tourn.

93. H. Chamaecistus Mill. Sonnige Higel, trockne Laubwälber, zerstreut. Brb. Anhöhe sliblich von Tochheim!! M. Irrieben; jenseit Gerwisch S. Bg. Bürgerholz westlich von ben Chausser Kienen K. jenseit bes Forstbauses S. R. Beim Forsthaus Henrichshorst E.!! Rammstebter Forst!! N. Warenberg!! nach ber Watte hin M.S. D. Brandsleber Holz S.!

## 7. Familie. Violaceae D. C.

#### 48. Viola Tourn.

94. V. palustris L. Simpfe, Moorwiesen, zerstreut. 3. 3åtricau!! Brb. Zwischen Polei-Mible und Babez S. S. Diesseit Pregin; Schloßbruch bei Gommern Eb. diesseit Dornburg S. P.
Bei Richters Gasthof nach Woltersborf bin T. Bg. Hungriger Bolf!!
Schermensches Erlenbruch K. Springberg K.! R. Moorwiese vor bem Pagen E. R. Moosbruch M.S.! Schwarzer Pfuhl bei Bülftringen M.S.

95. V. hirta L. Grafige, trodne Stellen, Laubwälder, Gebusch, zerstreut. Brb. Monplaisir Eb. S. Frohseiche Berge Eb. Am Damm neben ber Freiheit S. M. Thalmuble bei Süllborf Eb. Berliner Chausse T.! Bieberiher Busch S. Bg. Deichwall Dk.! An ber Chausse nach Schermen Dk. R. Sübliches Ende bes Unter-

bolger Berges E.!! Rammftebt!! R. Sagen M. S. Wellenberge bei Donnftebt T.! D. Batel: Bog S.

96. V. odorata L. Bie vorige. C. Buid; Rapitelbuid: Grunewalbe S. D. Beftliches Glacis ber Sternschange T.!! Bg. K. R. Unterholger Berg E.!! R. Bellenberge bei Donnftebt M. S.!

97. V. silvestris Lmk. Schattige Balber, häufig. 3. B. C. Bufch; Grunewalbe S. !! Dl. Bieberiter Bufch Bns. R. Althal-

bensleber Ziegelei; Bellenberge bei Donnftebt M. S.! b) Riviniana Robb. (als Art). An benfelben Stellen, wie bie Sauptart, 3. B. G. Damm neben ber Freiheit: Damm nach Ranies S. D. Satel S.

c) arenaria D. C. (ale Art). Connige Bugel, felten. G.

Frobieiche Berge; Coblice Berge S.

98. V. canina L. Laub- und Rabelmalber, Bebiliche, gemein. 99. V. persicifolia Schk. (erweitert). Rur in M, in ben Formen:

a) elatior Fr. (ale Art). Schattige Laubwalber und Bebuiche, gerftreut. G. Buid!! Dt. Bieberiger Buid!! Brn. Große

Aue Sp.!

b) stagnina Kit. (ale Art). Dicht gu feuchte Biefen, baufiger. G. Biefen amifden Bufd, und Rabitelbufd!! D. Unmeit Lagois Ziegelei füblich ber Berliner Chauffee!! öftlich vom Bieberiter Bufch an ber Chle!! Berentrug T.! Bg. Blumenthaler Wiefen: am Deichwall öftlich vom Barterbaufe K.! R. Biefen am Fuße bes Unterholzer Berges E.!! (Die von Scht. angeführten Stanborte D. Oberbruch bei Horborf und Meierweiben bei Sabmersleben und St. Zwifden Guften und Rathmanneborf geboren mabriceinlich ju b) stagnina, ber baufigeren Form).

100. V. mirabilis L. Bergige Laubwalber, febr gerftreut. R. Bellenberge bei Donnftebt M. S.! D. Satel an ber Domburg!!

101. V. tricolor L. Meder, fanbige Balber, Abhange, gemein. 98 × 99. V. canina x persicifolia. Entsprechend ber letteren Stammpflange in 2 Formen:

a) V. canina X persicifolia elatior. (V. nemoralis Kutz.) Bon Kutzing vor 20 Jahren D. im Bieberiter Buid beob-

achtet; in neuerer Beit nicht gefunben.

b) V. canina X persicifolia stagnina. (V. stricta Hornem.) Dt. Unweit ber Lagoisichen Ziegelei füblich ber Berliner Chauffee mit ben Stammarten 1856!!

# 8. Familie. Resedaceae D. C.

#### 49. Reséda L.

102. R. lutea L. Begränder, sonnige Hügel, fast nur in F, bort aber nicht selten. S. Zenser, Frohseiche Berge S. Beiendorf Eb. M. Dobendorf am Bege nach Frohse!! Langenweddingen am Bege nach Sülldorf!! Klingeberg bei Sülldorf E.!! Bahrendorf Eb. Ewgelsberg S. zwischen Bucau und Fermersleben an der Chausse!! zwischen Bucau und Hermersleben an der Chausse!! Zwischen Biegelei K.! (später wieder verschwunden). B. Bei der Kuhleschen Riegelei K.! (später wieder verschwunden). R. An den Abhängen nördlich der Ziegelei E.!! R. Am Chaussell. R. L. dwischen bei Gr. Ammensleben M. S.! St. Zwischen Börnick und Hecklingen S. Gänsesurt an der Eisenbahn!! Rathmannsdorf Sp. Brn. Anhöhen des Saalthals Sp.!

103. R. lutéola L. Wegränder, Abhänge, an Zäunen, icht zerstreut. Brb. Saalbamm bei Al. Rojenburg S.!! S. Grünewalde; Kirchhof in Salze S. M. Festungswerke vor bem Subenburger That E.!! R. Schmucksborf E. R. Bei Hundisburg; in Dönnstedt M. S.! St. Unter-Börnicke bei ben Kohlenschaften Eb. an ber Kohlenbahn

bieffeit Banfefurt !! Brn. Eb.

# 9. Familie. Droseraceae D. C.

#### 50. Drósera L.

104. D. rotundifolia L. Torffümpfe, moorige Stellen, bes sonders D, zerstreut. 3. Butterdamm!! Brb. Bei ber Polei-Mühlt S.!! S. Schloßbruch bei Gommern Eb.! Am Kesselteich bei Presin S.!! W. Bei Richters Gasthof in einem kleinen Sumpf T.!! Bz. Springberg K.! N. Wintersbusch M.S.! Moosbruch M.S.; Erble M.S.; Schwarze Pfuhl M.S.!

#### 51. Parnássia Tourn.

105. P. palustris L. Feuchte Biesen, ziemlich häufig. Brb. Bolei-Mühle S. S. Bullenwiese bei Frohse; Zens. S. Döben; Gommern im Schlofbruch Eb. M. Siltzewiesen bei Ofterwebbingen! und auswärts bei Bahrenborf Eb. Pfuhl-Mühle bei Gerwisch Bg. hungriger Wolf S. Beim Bahnhof K. R. Behlitz zwisch Angern und bem Buctum S. N. Woosbruch M. S. D. Bruch F. Renecke. Bei Eggenstebt S.; Nienhagen Scht. St. hecklinger Moor Scht.

# 10. Familie. Polygalaceae Juss.

#### 52. Polygala L.

106. P. vulgaris L. Trodne Balber und Wiesen, häufig, 3. B. S. Frohseiche Berge Eb. bei Döben; zwischen Plögth und bem Pilm S. M. An ber Berliner Chaussee Bus. R. Am Wege nach Rammflebt!!

107. P. comosa Schk. Trodne Hügel, Walbränber, zerstreut. S. Frohsesche Berge Eb.!! M. An ber Eisenbahn zw. Dobenborf und Ofterwebbingen T.! D. Am Brandsleber Holz S. Brn. Eb.

# 11. Familie. Silenaceae D. C.

#### 53. Gypsóphila L.

108. G. muralis L. Aeder, auf Sands und Lehmboben, zersstreut. S. Frohsesche Berge Eb. M. Pechau Bns. Rothehorn, eins zeln E.!! Bg. K. R. Nach Angern zu E.!! Schmucksborf E. R. Bestlich von Neuenhose!! schwarze Psuhl; zwischen bem Nonnensspring und Dönnstedt M. S.! D. Westlich von den Espen bei Horsborf; Emmersberg Scht.

## 54. Túnica Scop.

109. T. prolifera (L.) A. Br. Begränber, sanbige hügel, selten. Bg. Bestlich von ber Chausse vor bem Zerbster Thor K. R. Unterholzer Berg E.! Rammstebter Kirchhof E.! Kalbe: Bei Gripehne an ber Eisenbahn nach Gnadau hin Eb.

#### 55. Dianthus L.

110. D. Armeria L. Wälber, Abhänge, besonbers A, zersfreut. Brb. Zwischen Gr. Rosenburg und Alt-Tochheim Eb. S. Grintewalbe; zwischen Gommern und Rahlenberge S.; W. Am Bieberitger Busch, Sübseite T.!! R. Unterholzer Berg E.! Zwischen R. und Angern am Wege vor bem Scheibgraben rechts E.! R. Warrenberg M.S. D. Brandsleber Holz; hatel Scht.

111. D. Carthusianorum L. Trodne Balber, fonnige Bil-

gel, gemein.

112. D. deltoides L. Wie vorige, weniger bäufig, 3. B. Grünewalbe; Elbbamm nach Ranies; zwijchen Plötzky und Pilm; zwischen Elbenau und Randau S. M. Friedrich-Wilhelmsgarten; Leipziger Chausse nach bem Schwan zu Eb. Rothehorn Bns.

113. D. superbus L. Laubwälder, trodne Biefen, febr gerstreut. R. Unterhagen, vereinzelt E.! zwischen Angern und bem Budtum E.! R. Sagen M. S.! D. Sakel: Bog Eb. Egeln: Zwischen Tarthun und Unseburg Seht.

#### 56. Vaccária Medikus.

114. V. segetalis (Neck) Gke. Lehmäder, nur F, zerstreut. S. Döben; Mühlinger, Zenser Berge; zwischen Felgeleben und Salze; Beinborfer Berge S. D. Sannefohr Scht. Brn. Garcke.

#### 57. Saponária L.

115. S. officinalis L. Weibengebüsche, nur A, zerstreut. Brb. S. Zwischen Göbnitz und Dornburg! S. Wolfstehlenbusch; Kapitelbusch S. M. Rothehorn-Spite!! Un ber Elbe süblich vom Berrntrug!! Auch als Zierpflanze (mitunter mit gefüllter Blume) und an Zäunen verwilbert, so Bg. hinter bem Kirchhof K.

#### 58. Cucúbalus Tourn.

116. C. baceifer L. Gebülche, besonders in der Nähe der Elbe. Brb. Am Damm nordwestlich von Tochheim Eb.!! Swid Eb. Kapitelbusch! Manies an der Elbe Eb. M. Werder T.! im sogenannten Juderbusch (Glacis der Friedrichstadt links vom Sindstein-Thor) Bus.!! B. heinrichsberg K. Bg. Nordöstlich vom Kirdwasser K.! D. Meierweiden bei Hadmersleben Scht. Zwischen Rathmannsdorf, Hohen-Erzleben und Neundorf verbreitet Scht.

#### 59. Siléne L.

117. S. Otites (L.) Sm. Dürre, sandige Higel, Kiefernwälder gerftreut. 3. Butterberg!! S. Zenser Berge S. Hummelsberg Eb. Froblesche Berge!! Sohliche und Westerhilfensche Berge S. Ptöttp!! Prezinter Kirchhof Eb. M. Engelsberg; Wicsenberg bei Nieder-Dobeleben S. Gr. Wartberg bei Schnarsleben!! Klusheibe!! bei Richters Gasthof!! Kienen nörblich von Gerwisch!! Bg. Nörblich ber Berg-Milble K. N. Kienen bei der Eisenbahnstation!! N. Jübischer Bergrädnisplat!!

118. S. inflata L. Biefen, Beg- und Aderranber, Landwälber, nicht selten. Brb. Tochheim Eb. S. Miblinger und Zenser Berge S. Frohseiche Berge; an ber Gisenbahn zwischen Felgeleben und Enabau Eb. M. Engelsberg S. Bg. Schermensche Mible K.

R. Dberhagen!! R. Moosbruch; Erbte M. S.

. + S. pendula L. Bierpflanze aus Gub. Europa, verwilbert. E. Friebhof S. B. Bei ber Stärtefabrit 1858 einzeln!!

119. S. nutans L. Bälber, Balbränber, Bigel, sehr zerstreut. 3. Friedrichsholz!! S. Eisenbahngraben nach Besterhilsen Eb. Bg. Güttersche Berge K. R. Rammftedt Bus. R. Moorwiese bei Guppstingen S.

#### 60. Viscária Rivin.

120. V. vulgaris Roehl. Trodne Laubwälber, Abhänge, sehr zerstreut. 3. Friedrichsholz!! Bg. Wulshagen K. R. Oberhagen!! Rammfiedt!! N. M. S.

#### 61. Coronária L.

121. C. flos cucúli (L.) A. Br. Feuchte Biefen, gemein. † C. tomentosa L. Hort. Ups. Zierpflanze aus Süb-Europa, verwilbert. S. Friedhof S.

#### 62. Melándrium Roehl.

122. M. album (Mill.) Gke. Wege und Ackerränder, gemein. 123. M. rubrum (Weigel) Gke. Schattige Laubwälder, zerftreut. B. Epprena; Iriger Busch Eb. Kosenburger Busch; Saalsfähre bei Werkleiz S.!! Ronnei!! S. Vor dem Buchhause; Kapitelbusch S. M. Gr. Werder, einzeln Eb. R. Park von Rammstebt!! R. Dönnstebt S. Biesen in Hagen M. S.! Egelsche Forst S. Brn. Saaluser, Weblitz gegenüber!!

124. M. noctiflorum (L.) Fr. Lehmäder, besonbers F, nicht häufig. M. Balle Bus. Am Wege von ber Subenburg nach Lemsborf G. Hartmann!! Zwischen Ulrichs- und Kröden-Thor T.! B.

Meder nach Camswegen bin!! Brn. Sp.!

### 63. Agrostemma L.

125. A. Githago L. Meder, gemein.

# 12. Familie. Alsinaceae D. C.

#### 64. Sagina L.

126. S. procumbens L. Ueberichwemmte, feuchte Stellen,

Aderfurchen, gemein.

127. S. apetala L. Bie vorige, selten. E. An ber Galgenfuhle vor bem Magbeburger Thor; Emmeringen Scht. Branbsleber Bolg bei ber Ziegelei S.!

128. S. nodosa (L.) Bartl. Ueberichwemmte Stellen, Moors wiesen, gerstreut. Brb. Babeger Teich Eb. Dornburg S. Dl. Reftungs-

werte Bns. Bfuhlmuble bei Gerwisch S. Bg. hungriger Bolf E. Breite Bleet Scht. St. hedlinger Moor Seht.

#### 65. Spérgula L.

129. S. arvensis L. Sanbfelber, Kiefernwälber, gemein. 130. S. Morisonii Boreau. Dürre Higel, Kiefernichonungen, zerstreut. S. Frohsesche Berge; Ranbau Eb. Berg hinter Plögty; Gommersche Forst; zwischen Pretin und Dornburg S. Bg. Westlicher Theil bes Burgerholzes K.! R. Rammstebter Forst!!

#### 66. Spergulária Presl.

131. S. campestris (L.) Aschs. Wegränder, Triften, Higel, nicht selten. S. Frohsesche Berge S. Sandiges Elbufer Eb. biesseit Pretiin S. Gommern Eb. M. Krakauer Anger Bns. Bg. hinter dem Bahnhof K. D. Brandsleber Holz über Neindorf Scht. Zwischen St. und Löberburg Scht.

132. S. marina (L.) Gke. Auf Salzboben, besonbers an feuchten Stellen, häufig. S. Am Soolgraben S. Am Grabirwert bei Gr. Salze!! Sillborf im Dorf und öftlich von bemfelben!! D. Sillzen; Krottorf: Rothe Lache Scht. St.!! Hecklingen Scht.

133. S. media (L.) Gke. Wie vorige, seltener. S. Am Grabirwert bei Gr. Salze!! M. Destlich von Sillborf E.!! St. Deiche E.! Hedlingen Scht.

#### 67. Alsine Wahlenb.

134. A. viscosa Schreb. Lehmig sandige Aeder, fehr gerstreut. S. Sohliche Berge S. M. Wiesenberg bei Nieber-Dobeleben; Gerwisch S. Bg. Deftlicher Theil ber Feldmark unter bem has gen K.! Zibbekleben K. Zwischen St. und hedlingen; Schneitlingen Scht.

#### 68. Moehringia L.

135. M. trinérvia (L.) Clairv. Laubwalber, ziemlich baufig, 3. B. 3. Butterbamm!! S. Griinewalbe S. M. Bieberiter Bujch!! Gerrnfrug!!

#### 69. Arenária L.

136. A. serpyllifolia L. Aeder, Begranber, trodte Balber, gemein.

#### 70. Holósteum L.

137. H. umbellatum L. Abhange, trodne Aeder, Baiber gemein.

#### 71. Stellaria L.

138. S. media (L.) Vill. In Begen, auf Biefen, Nedern,

in Balbern, febr gemein.

139. S. Holdstea L. Schattige Laubwälder, zerstreut. 3. friedrichsholz!! Brb. Zwischen Walternienburg und Polei-Mühle S. S. Wolfstehlenbusch S. Bg. K. R. Unterholzer Berg!! Namm-sebt!! Erlenbruch nörblich von Bäthen!! R. M. S. D. Brands-leber Holz Eb. Hafel!! Egeliche Forst S.

140. S. glauca With. Raffe Biefen, Sümpse, zerstreut. 3. 3wischen Luso und Siltrichau!! Brb. Grüneberger Busch S. Babez Eb. S. Grünewalbe S. Prehin Lb. M. Süblich ber Berliner Chanssee 7. B. Zwischen Samswegen und Lindhorst!! Bg. K. R.

Rammstebt Bas. D. Alicendorf an ben Meierweiben Sch. 141. S. graminea L. Biefen, Balbranber, gemein.

142. S. uliginosa Murr. Quellen, Gräben, Sumpfwiesen, besonders D, zerstreut. 3. Am Wege nach Tröbnig!! Brb. 3wischen ber Polei-Mühle und Kämerig; zwischen Göbnitz und Dornburg S. S. 3wischen Prezin und Dornburg S. Keffelteich bei Prezin!! Gommern im Schloß- und Mühlenbruch Eb. W. 3wischen Samswesgen und Lindhorst!! Bg. Zibbekleben K.! R. Unterhagen E.

#### 72. Malachium Fr.

143. M. aquaticum (L.) Fr. An Graben, in feuchten Balbem und Gebuichen, gemein.

#### 73. Cerástium L.

144. C. glomeratum Thuill. Feuchte, grafige Walbstellen, zestreut S. S. Elbenau am stillen Basser Eb.; turz diesseit Dornburg am Ausgang des Waldes!! Dt. Biederitzer Busch im süböstichen Theile häusig auf den Wegen!!

145. C. semidecandrum L. Trodne Balbftellen, Aeder,

Abhänge, gemein.

146. C. triviale Lk. Grafige Stellen, Beg- und Balbran-

147. C. arvense L. Trodne Grasplate, Balbranber, gemein.

# 13. Familie. Elatinaceae Cambessèdes.

#### 74. Elátine L.

148. E. Alsinastrum L. Ueberfcwemmte, fpater troden

werbenbe Stellen, felten. S. An einer Lache bei Elbenau am Elpfum Eb.!

# 14. Familie. Linaceae D. C.

#### 75. Linum L.

149. L. catharticum L. Wiesen, seuchte Stellen, häusig. Brb. Babez Eb. S. Bullenwiese bei Frohse S. Frohsesche Berge; am Grabirwerk bei Gr. Salze; Döben Eb. M. Sillborf Eb. Wiesenberg bei Rieber-Dobeleben S. Bg. K. N. Althalbensleben M.S. St. Eb.

† L. perenne L. Bierpflanze aus Gubbeutichland. Bermil-

bert: S. Friedhof S. St. Un Gartengaunen Bus.!

\* L. usitatissimum L. Nicht sessaut. Unträuter: Camelina sativa Crtz., stellenweise Lepidium sativum L., Cuscuta Epilinum Weihe, Lolium arvense Schrad.

#### 76. Radíola Dillen.

150. R. linoides Gmel. Feuchte, sandige Stellen, Graben, Sumpfrander, zerstreut. Brb. Zwischen Kamerit und Babez S. Swischen Bretzin und Dornburg S. Schlofbruch bei Gommern Eb.! Bg. Hungriger Boss S. Süblich von der Eisenbahn und öftlich vom Bege nach Parchau K. Destlich vom Brehmer Berg Ok.! R. Zwischen bem Bucktum und Benbborf E.! N. Schwarzer Pfuhl E, M. S.! D. Brandsleber Holz bei der Ziegelei S.

# 15. Familie. Malvaceae R. Br.

#### 77. Malva L.

151. M. Alcea L. Gebiliche, sonnige Hügel, zerstreut. Brt. Zwischen Ronnei und Tochheim S. S. Reben ber alten Fähre S. Kapitelbusch; Randau am Damm nach ber Kreuzhorst Eb. W. Jübicher Begrädnisplat S. Bg. Zwischen Detershagen und Löbekühn K. R. Unterholzer Berg E. !! Scheibgraben zwischen R. und Angern E. R. Warenberg!! Althalbensleber Burgwall M. S. D. Brudgrabeninsel westlich von ben Stegen Scht.; Hatel Tt- und Befrand S. Egeln: Unseburg Scht. St. Gänsesurter Busch Eb.

152. M. silvestris L. Begranber, Baune, Dorfer, febr baufig.

153. M. neglecta Wallr. Bie vorige, gemein.

154. M. rotundifolia L. An Felbwegen, Baunen, befondert giemlich baufig. B. Bei Rolphus!! G. Belsleben, Grunewalbe

S. Alte Fähre!! Blögth!! M. Bei ber Subenburg S. Bestlich von ber neuen Neustabt!! Dobenborf; Sillborf Eb. R. E. N. Grösningen Scht. St. Alt. Staßsurt!! Neundorf!! Rathmannsborf an ber Straße nach St. !! und nach Hohen-Errleben Garcke. Förbersstebt Eb. Brn.!!

#### 78. Althaea L.

155. A. officinalis L. An Gräben, Gebüschen, besonbers auf Salzboben, zerstreut. Brb. Zwischen Gr. Rosenburg und Alt-Tochbeim Eb. am Babezer Teich!! S. Bullenwiese Eb. Döben S. Busch an ber Röthe!! Salbke an ber Sülze!! Dt. Rörblich von Gerwisch an einem Felbgraben in ber Richtung nach Körbelit Bns. IR wischen B. und Samswegen S. D. Bon Krottorf nach Horbort und bem Schisgraben hin Scht. St. Am Wege nach Abendorf E.! Reundorfer Moor Scht. Rathmannsborf Eb.

# 79. Lavatéra L.

156. L. thuring faca L. Wegränder, Gebüsche saft nur F, zerstreut. B. An der Saalfähre bei Werkleiz (seit Scholler)!! S. Grünewalde links vom Wege nach Elbenau spärlich Eb.!! D. Krotetorf über der dritten Steinkuhle und bei der Salzquelle Scht. Hatel, besonders Oste und Nordostrand S. Egeln; Unsedung am Wege nach dem Kohlenschacht Scht. Kochstedt Eb. St. Am Gänsesurter Busch S.!! Löderburg Scht. Hedlingen Sp. Am Wege von St. nach Agenedorf E.! zwischen Kathmannsdorf und Hohen-Errsteben Eb. Neundorf am kahlen Graseweg!! Brn. Weinberge!! beim Parforce-Hause Sp. Diese Pflanze erreicht hier ihre Nordgrenze.

# 16. Familie. Tiliaceae Juss.

## 80. Tília. L.

† T. platyphyllos Scop. In Bergwälbern z. B. bes harzes einheimisch, hier wohl nur an Wegen u. j. w. angepflanzt.

157. T. ulmifolia Scop. Wälber, nicht seiten. Eine große Anzahl schöner alter Bäume findet man R. Kolbiter Heide öftlich von Planken (Kolbiter Linden)!! Außerdem häufig an Wegen, in Dörfern u. s. w. angepflanzt.

# 17. Familie. Hypericaceae D. C. 81. Hypericum L.

158. H. perforatum L. Balber, Gebuiche gemein.

159. H. quadrangulum L. Feuchte, icatige Laubwälter, febr zerftreut. 3. Friedrichsholz!! R. Unterhagen!! D. Brandsleber Holz Eb.

160. H. tetrápterum Fr. An Gräben, Bächen, nicht selten Brb. Boleimühle; Babez Eb. S. Bullenwiese; Westerhüsen; zwischen Blöth und Bretin; zwischen Bretin und Dornburg S. W. Sams-

wegen Bns. Bg. Burgerholz Beibhau K.

161. H. humifusum L. Sandige, feuchte Stellen, Aeder, zwiftreut. Bg. Am Bulfhagen K. R. Bertingen E. N. Benit; an ber Mthaldensleber Ziegelei M. S. D. Emmersberg Eb. Brands-leber Holz bei ber Ziegelei S.; am Bedersberg und über Neindom Scht.

162. H. montanum L. Laubwälber, zerstreut. Bg. Nachtweibe K. R. Rammstebt!! R. Hagen; Zernit; Gehölz vor Hundisburg M. S.! D. Brandsleber Holz unter ben Birken S.! Hakt:

Dberlinben, Bog S.

163. H. hirsutum L. Schattige Laubwälber, faft nur A, zerstreut. Brb. Rosenburger Busch!! Werkleiz bei ber Saalführe!! Tochheimer Busch!! S. Grünewalbe!! Kreuzhorst S. M. Bieberiger Busch!! Königsborn T.! R. Rammstebt; Budtum E.

# 18. Familie. Aceraceae D. C.

## 82. Acer L.

164. A. Pseudoplatunus L. Bergmalber, felten.' D. Du fel!! Saufiger in Balbern, an Begen gepflangt.

\* A. platanoides L. 3m Gebiet nicht einheimisch. Bunfig

an Strafen u. f. w. gepflangt.

165. A. campestre L. Wälber, besonders im Elbthal, zerstreut. Brb. Tochheimer Busch (hier baumartig)!! S. Busch; Grunt-walde S. M. Bieberiter Busch Eb. B. herrnholz bei Glindenberg S. Bg. K. N. Wellenberge M. S.

\* A. tataricum L. Bierbaum aus Gilboft-Europa, gepflaut

3. B. G. beim Buichhaufe S.

# Familie Hippocastanaceae D. C.

#### \* Aésculus L.

\* A. Hippocastanum L. Bierbaum aus Rord-Indien, an Wegen u. f. w. febr häufig angepflangt.

# Familie Ampélides H. B. K.

## \* Ampelopsis Michaux.

\* A. quinquefolia (L.) R. u. Sch. Bierstrauch aus Norbamerita, an Mauern, Lauben u. f. w. baufig angepflangt. fcones Eremplar 3. An ber Gubfeite ber Stadtmauer !!

#### \* Vitis L.

\* V. vinifera L. 3m Gebiet meift nur an Baufern, und nur ber Trauben wegen angepflangt; besonbers viel bei Brn.

# 19. Familie. Geraniaceae D. C.

## 83. Geránium L.

166, G. pratense L. Trodnere Biefen, Gebuiche, nur M, gerftreut. Brb. Coprena Eb. Rofenburg S. Un ber Gaalfabre bei Bertleig!! G. Buid; am Elbbamm bei Glinbe binter bem Rabitelbuich S. D. Rotheborn - Biefen !! N. Rachthut M. S. D. Bruch F. Reinecke. Brn. Rleine Aue Sp. Gaalwiefen, Beblit gegenüber!! Ralbe S.

167. G. palustre L. Feuchte Bebiliche, an Graben, zerftreut. Brb. Polei-Mible S. M. Rlappermuble bei Konigsborn Bns. Lo-

burg Eb. Bg. Birfenfteig!! R. Unterbagen S. Bathen!!

168. G. sanguineum L. Erodne Laubwalber, febr gerftreut. 3. Friedrichsholg Eb. R. Oberbagen!! R. Benit M. S. D. Salel S. 169. G. pusillum L. An Wegen, Baunen u. f. m., gemein.

170. G. dissectum L. Lehmader, meift nur Fr, gerftrent. B. Kolphus Bns.! bei Borwert Zeit S. S. Beim Bufchaufe S. D. Rrottorf; Borborf Scht. beim Brandsleber Bolg S.

171. G. columbinum L. Sonnige Abbange, Begranber, febr gerftreut. M. Klingeberg bei Gillborf T.! Bg. Bei ber Stabt Berlin K. Bibbetleben K.! D. Am Branbeleber Bolg bei Reu-Branbsleben S.

172. G. molle L. Gebüsche, Wegränder, Gartenland, häusg, & Br. Walternienburg; Friedrikenberg Eb. S. Friedhof S. M. Glacis beim Ulrichsthor!! N. M. S.

173. G. Robertianum L. Gebiliche, ichattige Begranten,

gemein.

## 84. Eródium L'Héritier.

174. E. cicutarium (L.) L'Héritier. Sanbige Accer, Begränder u. s. w., gemein.

# 20. Familie. Balsaminaceae A. Rich.

#### 85. Impátiens L.

175. I. noli tangere L. Schattige Balber, besonders at Duellen, zerstreut. Brb. Rosenburger Busch; Poleimühle Eb. S. Scharleber Holz zwischen Pretzin und Dornburg S.!! Pilm S. N. Bieberitzer Busch!! Bg. Bürgerholz: Heibau K.!! R. Kapellberg E.!! Unterholzer Berg!! Unterhagen E. Erlenbruch nörblich von Batfen!! R. Nonnenspring; Schwarzer Pfuhl M. S. (Etwas außerhalb ber Grenze bei Kalvörbe am Bege nach Belsbors!!)

# † Balsámina D. C.

† B. hortensis D. C. Säufige Zierpflanze aus Oftinbien, verwilbert S. Friedhof S.

# 21. Familie. Oxalidaceae D. C.

# 86. Oxalis L.

176. O. Acetosella L. Laubwälder, besonders an Sumpfrändern, zerstreut. Brb. Zwischen der Polei-Mühle und Kämerig S. Bg. Springberg K. R. Unterhagen E. Sichenwald bei Mahlpiphs T.! N. Bellenberge bei Dönnstedt S. D. Brandsleber Holz S. + O. stricta L. Ursprünglich aus Nordamerika eingewandert

3m Gartenlande überall gemein.

# 22. Familie. Rutaceae Juss.

#### 87. Dictamnus L.

177. D. albus L. Laubwälber, besonbers auf Ralt, felten. A.

Kolbiger Beibe Bns.! Bei ber Althalbensleber Biegelei E. D. Satel bei ber Dombura!!

# Familie Xanthoxylaceae Ad. Juss. \* Ptélea I.

\* P. trifoliata L. Bierftrauch aus Norbamerita, baufig gepflangt.

# 23. Namilie. Celastraceae R. Br.

# 88. Euónymus Tourn.

178. E. europaea L. Laubwalber, Gebiliche, nicht felten. G. Bolfsteblenbuid; Grunewalbe S. B. Berrnbolz S. Ba. K. Rammftebt !! Much nicht felten angepflangt.

\* E. verrucosa Scop. Zierstrauch aus Oftbeutschlanb. \* E. latifolia Scop. Zierstrauch aus Sibbeutschlanb.

# 24. Familie. Rhamnaceae R. Br.

# 89. Rhamnus L.

179. R. cathartica L. Gebufde, baufig, g. B. C. Bufd; Grilnemalbe S. 23. herrnbolg S. Bg. K. Bu Beden Bftere angepflangt.

90. Frángula Tourn.

180. F. vulgaris Rehb. Gebuiche, nicht felten, 3. B. Brb. Balternienburg S. G. Streitheite bei Gommern; amiichen Pretin und Dornburg S. Bg. K. R. Geelenhau S. Rammftebt!!

# Kamilie Terebinthaceae D. C.

#### \* Rhus Tourn.

\* R. Cotinus L. Bierftrauch aus Gub- Europa, angepflangt, 3. B. M. Friebrich-Bilbelsgarten.

\* R. typhina L. Bierbaum aus Norbamerifa; angepflangt, 3. B. G. Friedhof. M. Friedrich-Wilhelmegarten.

# 25. Familie. Papilionatae L. + Olex L.

† U. europaeus L. Bierstrauch aus Nordwest Deutschland. Angepflanzt und völlig verwildert R. Auf dem Abhang nördlich ber Biegelei E.!!

#### 91. Sarothamnus Wimm.

181. S. scoparius (L.) Koch. Kiefernwälber, zerstreut. Brt. Zwischen Tochheim und Polei-Müble S. M. Bei Richters Gasthof Eb. Bg. Biethpuhl am Part T.! R. Begräbnigberg; hinter bem Hagen E. R. Zwischen Planken und Kolbit S. St. Tannenbusch bei hohmerrleben E.

#### 92. Genista L.

182. G. pilosa L. Trodne Wälber, bürre Higel, besonders D, zerstrent. S. Frohseiche Berge; zwischen Prezin und Dornburg; zwischen Prezin und Breigin unter Kiefern S. bei der Dannigkower Windmilble Eb. zw. Randau und der Kreuzhorst S. M. Bei Richters Gasthof Eb. Gerwisch S. B. Hongriger Wolf S. R. Bei der Eisenbahnstation!! Kesperbusch!! Resperbusch!! Resperbusch!!

183. G. tinctoria L. Trodne Wiesen, Balbränder, nicht selben. 3. Friedrichsholz!! Brb. Badez Eb. S. Grünewalde nach Elbenau hin S. Dl. Bg. K. R. Oberhagen!! Rammfledt!! N. Schweinering im Oberholz M. S.! Papenberg M. S. D. Brandsleber Holz Eb. Hafel S.

184. G. germanica L. Trodne Landwälber, zerstreut. Bg. Bürgerholz!! Grabaner Busch K. R. Oberhagen E. Rammstebi!! R. Hagen S. Schweinering M. S. D. Brandsleber Holz; Hatel S.

# + Cytisus L.

\* C. Laburnum L. Bierbaum aus Gubbeutschland. † C. nigricans L. Bierftrauch aus bem öftlichen Gebiet, ver-

+ C. nigricans L. Zierstrauch aus bem öftlichen Gebiet, verwilbert R. Am Althalbensleber Burgwall M. S.

† C. capitatus Jog. Bierstrauch aus Oftbeutschland. Gehr häufig angepflanzt; verwilbert R. Im Budtum E.!

\* C. elongatus W. K. Bierftrauch aus Gilboft-Europa.

## \* Lupinus L.

\* L. luteus L. Baufig auf Sandboben gebaut, befonbere D.

\* L. angustifolins L. Geltener ale vorige gebaut.

\* L. albus L. Geltener gebaut.

#### 93. Onónis L.

185. O. spinosa L. Beg- und Balbranber, Abhange, gemein. 186. O. repens L. Wie vorige, weniger haufig. B. S. Brb. Ronnei Eb. 2B. Samswegen!! Bg. Rulgauer Forft!! R. Althalbensleber Biegelei M. S.! D. Bor bem Emmersberge! am Safel: bei Sateborn S. St. Reundorf Eb.

# 94. Anthyllis L.

187. A. Vulneraria L. Begranber, Gebuiche, fonnige Silgel, zerftreut. G. Benfer, Frobseiche, Coblice Berge; Streitbeibe bei Gommern S. Dl. Wartberg bei Schnarsleben S. Chauffee nörblich von Gerwisch!! zwischen Bablit und ber Renen Mible Eb. Bg. Rulgauer Forft!!; öftlich ber Babben - Muble; westlich von ben Chauffee - Rienen K. R. Weg nach bem Sagen bei ber Gifenbabn!! D. Chauffeegraben amifchen Rroppenftebt und Beteborn S. St. Bedlingen Eb.

# 95. Medicágo L.

+ M. sativa L. Baufig gebaut und nicht felten verwilbert und eingebürgert. Wenn bie Lugerne aus frembem Camen gezogen wirb. fo finben fich im erften Jahre zuweilen barunter Ammi majus L. Centaurea solstitialis L., Helminthia echioides Gaertn.

+ M. media Pers. Biejen, Begranber, eingebürgert, gerftreut. 3. An ber Gifenbabn bei Frobje S. Dl. Sternichange!! Rotheborn-Biefen. !! Ralbe: Am Gaalbamm bei Britebne S.

188. M. falcata L. Wegranber, Abhange, gemein.

189. M. lupulina L. Biefen, Triften, Balbranber, gemein.

190. M. minima (L.) Lmk. Sonnige Abbange, febr gerftreut. Brb. Friedritenberg an ber Terraffe S.!! G. Mühlinger Berge; ant Belsleber Beg S.; Kirchhof in Bretin S.! Dt. Reftungswerte por bem Subenburger Thor bis 1855 Bns. !! feitbem ausgerottet. D. Galgentuble Scht. St. Alt-Staffurt unter bem Rirchhofe Scht. bei Gröna Sp.

+ M. denticulata Willd. Auf einem Aderftud G. Am Summelsberge von S.! einmal in Menge gefunden, ipater nie wieber; jebenfalls mit frembem Samen eingeschleppt.

## 96. Melilótus Tourn.

191. M. dentata (W. K.) Pers. Salzwiesen, befonbers an Braben, ziemlich verbreitet. G. Gr. Calge am Grabierwert Eb. !! Dl. An ber Gulge unterhalb Gullborf!! Bei Altenwebbingen; an ber Alinte; an ber Schrobe S. D. Schiffgrabenbruch und am trummen

Graben Scht. Ct. Scht.; Rathmannsborf Sp. !!

192. M. macrorrhiza (W. K. erweitert) Pers. Biefen, Gebuiche, nicht häufig. B. Rosenburger Buich nach Gr. Rosenburg bin S.!! G. An ber Rothe; Rapitelbufch Eb. Bg. K. D. Schiffgrabenbrud; Teide im Gröninger Welbe Scht. St. Bobenieberung Scht. Rathmannsborf Sp.

193. M. officinalis (L.) Desr. Begränder, fonnige Sügel,

gemein.

194. M. alba Desr. Bie vorige, weniger baufig. Brb. 3miichen Ronnei und Tochheim Eb. G. Bufd; Elbbamm nach Ranies S. M. Rotheborn Bns. Bg. 3. B. RillaguerMible!! D. Durchfic ber Braunichweiger Gifenbahn; rechtes Bobe-Ufer amifchen Borbori und Rrottorf Scht.

#### 97. Trifólium Tourn.

195. T. pratense L. Biesen, Begränder, gemein. 196. T. alpestre L. Trodne Wiesen und Wälber, besonders Laubholg, gerftreut. G. Frobjefche Berge S. D. Rlusbeibe S. Bg. Butteriche Berge K. R. Geelenhau S. Rammftebt!! R. Biefen am Bannegraben M. S. D. Brandeleber Bolg T. ! Batel S.

+ T. incarnatum L. Stammt aus Gub-Guropa. Aderranber, verwilbert; friiber wohl gebaut. R. Am Benit M. S.! an ber

Chauffee nach Magbeburg M. S.!

197. T. arvense L. Meder, Triften, gemein.

198. T. striatum L. Grafige Wegrander, Damme, Stellen, wo Ziegelerbe ausgegraben ift, zerftreut. Brb. Zwischen Balternienburg und Gobnit S. G. Friebhof S. Tobtenhager Eb. an ber Chauffee nach ber Alten Fahre E.! DR. Am Rlusbamm Eb.! bei ber Lagoisichen Biegelei filblich von ber Berliner Chauffee E.! bei ber letten Biegelei norblich von ber Chauffee T.!! Bg. In ber Chauffee nörblich von Schermen Dk.!! vor bem Berbfter Thor K.! nörblich von ber Bergmühle K. bei ber Biegelei am Grabauer Buich S.

199. T. medium L. Laubwalber, nicht felten. C. Rapitels buid Eb. Grinemalbe rechts vom Rachtigallenfteig; am Damm von Elbenau nach Ranbau S. D. Bieberiger Buich!! Bg. Burgerbel; bei ber großen Buche!! R. Resperbufch!! Rammftebt!! D. Brande

leber Solg Eb. Satel S.

200. T. rubens L. Bergige Laubwälber, felten. D. Branbe-

leber Solg T.! Batel Oberlinben, Bof S.

201. T. fragiferum L. Muf Biejen, besonbers falgbaltigen, baufig. G. Gr. Calze beim Grabiermert!! Doben; Bullenwiese Eb.

M. Gulzewiejen unterhalb Gullborf!! Bg. Doltenbruch K. R. Racht-

weide E. R. Behrends Biefe; am Barenberg M. S.

202. T. montanum L. Sonnige Sügel, trodne Biefen, zerstreut. S. Mühlinger, Hummels, Frohjesche, Besterbüseniche Berge S. M. Schnarsleben am Fuchsberg!! Bg. K. R. Hagen!! Kesperbusch!! Bathen!! R. Warenberg!! D. hatel Eb. St. Rain bei hedlingen!! Reundorf am tahlen Grafeweg!!

203. T. repens L. Biefen, Triften, gemein.

204. T. hýbridum L. Biesen, wohl nur A, bort aber bessonders auf Elbwiesen ziemlich gemein, z. B. Brb. Zwischen ber Stabt und der Fähre!! S. Buich!! M. Am Elbufer nach bem herrnfrug!! Biederitzer Buich!! Rothehorn!! nach Pechau zu!! B. Rach Farsleben zu!! Bg. K. R. M. S. D. Eisenbahngraben; Karpsenteich Secht.

205. T. agrarium L. Biefen, Laubwalber, Berftreut. Bg. K. R. Rammflebt Bns. D. Safel; Brandsleber Solg neben bem Bache S.

206. T. procumbens L. Biefen, Begränder, gemein.

207. T. filiforme L. Wie vorige, ziemlich häufig, z. B. S. Friedhof; Damm nach Glinde S. M. An der Berliner Chaussee!! Bg. Bahnhof!!

#### 98. Lotus L.

208. L. corniculata L. Biefen, Bege und Balbranber, gemein.

b) tenuifolia Renb. (als Art). Salzwiesen. S. Gr. Salze

beim Grabirmert !!

209. L. uliginosa Schk. Raffe Wiefen, Sumpfränder, Berftreut. Brb. Poleimühle; Kämerit; Babez; Göbnit; Dornburg Eb. S. Plöth und Pretin; zwischen Plöth und Gommern S. M. hinster ben heprothsbergen Eb. Bg. Marientränke; Springberg K. R. Bor bem Pulverthurme M.S. D. Alt-Brandsleben Eb.

# 99. Tetragonólobus Scop.

210. T. siliquosus (L.) Reh. Gute, besonders salzhaltige Wiesen, Gräben, ziemlich verbreitet. 3. Rosenbaum! Brb. Saurer Zeit S.; Badez Eb.!! S. Döben; zwischen Gnadau und Felgeleben; Zens; Eggersdorf S.; Bullenwiese!! M. Festungswerke beim Turnplat der Volksschufe T. Ulrichs-Hestungswerke beim Gymnasials Turnplatz E.!! Chaussegraden nörblich von Ebendorf M. S. Chaussegräben nörblich von Gerwisch Bns.!! W. Hördlich von Wose!! Ag. An der Chaussee nörblich von Schemen K.! R. Unterhagen E. Egeln: Vorne Eb. St. hecklingen; Reundorf Scht. Nordöstlich von Rathmannsdorf, einzeln E.!

#### \* Colútea L.

\* C. arborescens L. Häufiger Zierstrauch aus Subbeutschlanb.

#### \* Robinia L.

\* R. Pseudacácia L. Zierbaum aus Nordamerita, überall angepflanzt.

## \* Caragána Lmk.

\* C. arborescens Lmk. Zierstrauch aus Gubost-Europa.

# 100. Astrágalus L.

211. A. exscapus L. Sonnige Higel, selten. Rur F. (S. Früher bei Beiendorf Eb.) M. (Früher bei Lemsdorf Bns.) Am Beinberge bei Schnarsleben Bns.!! 1857 hier ausgerottet. St. Hecklingen Garcke. (Auch hier wohl jetzt verschwunden.)

212. A. Cicer L. Grafige Stellen, Wegranber, Higel, felten. B. Jübifcher Begrabnifplat E. !! D. Horborf zwischen bem Bruch

und ben Espen Scht. St. Ganfefurter Buich Scht.

213. A. glycyphyllus L. Laubwälber, zerstreut. Brb. Zwischen Ronnei und Tochheim; an ber Saale bei Gr. Rosenburg Eb. S. Kapitelbusch S. Grünewalbe Eb. M. Am Biederiger Busch, Sübseitet!! Bg. Grabauer Busch an ben Gütterschen Bergen K. R. Nörblich von ber Ziegelei!! Oberhagen!! Nammstebt!! N. Schweinering;

Benit M.S. D. Brandsleber Bolg Eb. Satel!!

214. A. hypoglottis L. Sonnige hügel, Wegränder, besonders F und D, zerstreut. S. Mühlinger Berge S. Hummelsberg Eb.! Frohseiche Berge Eb.!! Westerhüseniche Berge S. M. Biesenberg bei Nieder-Dobeleben S. Felsenberg bei Dahlen-Warsleben E.! an einem Damm, der von der Berliner Chausse nach bem Bieberitzer Busch führt T.!! Grabauer Forst am Stegliber Weg Dk.! R. Seelenhau S. D. Espen bei Hordorf Soht. St. Soht.

#### 101. Coronilla L.

215. C. varia L. Begründer, Laubwälder, ziemlich häufig. 3. Friedrichsholz!! Luso!! Brb. Friedriftenberg Eb. S. Zwischen Prehin und Dornburg!! S. Eisenbahngräben Eb. M. Sternschanze!! Rotheborn!! Chaussegrüben bei der Subenburg Eb. zwischen Langenwebbingen und Blumenberg an der Eisenbahn Scht. B. Chaussen nach Rolbig! Bg. Bürgerholz östlich vom Forsthaus K. R. Unterbolzer Berg!! N.Rammssed!! N. Jübischer Begrübnisplay M. S. Brn. Kaltberge!!

# 102. Ornithopus L.

216. O. perpusillus L. Riefernwälber, fanbige Meder, gerftreut. Brb. 3wifden Balternienburg und Bolei - Mible S.!! G. 3mijden Blöth und Gommern S. Dl. Bei Rorbelit T.! Bg. Dabel! Bibbetleben K. Zwischen Refen und Gutter S. Rienen beim Sühnerberg E. Angern E.! Zwischen Bertingen und Ringforth E. 3mifchen Robbel und Scharen E.!

# † Onobrýchis Tourn.

+ O. viciaefolia Scop. Im Gebiet nicht einheimisch; baufig in R auf Medern gebaut. Bermilbert g. B. 29. !!

## 103. Vícia L.

217. V. dumetorum L. Laubwälber, Gebüsche, felten. Brb. Elbbamm nordwestlich von Tochheim Eb.!! D. Brandsleber Bolg Scht. Satel beim vorbern Schmerlenteich!! Egeliche Forft S.

218. V. sepium L. Laubwalber, Gebuide, gemein.

\* V. sativa L. Baufig auf Medern gebaut.

219. V. angustifolia Rth. Trodne grafige Stellen, Balber, häufig, 3. B. S. Friedhof; Grunewalbe S. M. Buderbufch Bns. Bg. K. R. Bei ber Gifenbahnstation !!

220. V. lathyroides L. Trodne Grasplate, Abhange, ger-S. Friedhof; hummelsberg; Glinde im Treugenbufch Eb. Grünewalbe unweit ber Elbe S. Pretiner Rirchhof Eb. M. Rotheborn; Buderbufch Bas. Wiefenrand am Brelin bei Rrafau!! Bg. Schermeniche Müble K.! Deichwall K. R. Resperbufd!! D. Emmereberg Scht.

#### 104. Cracca Rivin.

221. C. major Godr. u Gr. Biefen, Begranber, gemein. 222. C. tenuifolia (Roth) Godr. u. Gr. Gebuiche, auf 206hangen, jehr zerftreut. S. Frohfeiche Berge Eb. Brandsleber Bolg Eb. St. An einem Rain unweit bes Beges von Bedlingen nach Neundorf!! Brn. Kaltberge links von ber Chauffee nach Ralbe Eb.!!

† C. villosa (Roth) Godr. u. Gr. Unter ber Caat. 2B. Auf Medern westlich ber Stadt im Juni 1857!! ficher mit frember Saat

eingeschleppt; burfte fich vielleicht einburgern.

#### 105. Ervum L.

223. E. pisiforme (L.) Peterm. Abhange, unter Gebuich, felten. R. Unterholger Berg E.!

224. E. silvaticum (L.) Peterm. Laubwälber, felten. De

tel amifden bem erften und britten Bifcopeifchlage Scht.

225. E. cassubicum (L.) Peterm. Trodne Laub- und Nabelwälber, sehr zerstreut. 3. Friedrichsholz Eb. R. Seelenhau & Kiefernschonung westlich von der Eisenbahnstation!! Resperbusch!! A. Benig M. S.! Butterwinkel bei Neuenhose E.!! Hagen M. S.!

226. E. hirsutum L. Meder, Biefeuranber, gemein.

227. E. tetraspermum L. Biefen, Grasplate, baufig, 3. B.
S. Friebhof S. M. An ber Elbe nörblich ber Friedrichsstadt!! Bg K.

† E. monanthum L. Auf Aedern, besonbers als Mengfruct gebaut und hier und ba verwilbert. S. Zwischen Dornburg und Gommern Bns! zwischen Plotth und b. Finn S., in bieser Gegend überhaupt verbreitet. D. Günthersborf vor den Meierweiben Scht.

### \* Lens Tourn.

\* L. esculenta Mnch. Auf Aeckern gebaut.

## \* Pisum L.

\* P. sativum L. Auf Medern gebaut.

# 106. Láthyrus L.

228. L. Nissolia L. Grafige Wege und Balbranber, selten Rur A. S. Bestseite bes Kapitelbusches Eb.! Dt. Glacis ber Friedrichtet zwischen Charlotten- und Krafauer Thor!! Wiesenrand am Brelin nörblich von Krafau!! Am Wege nach Zipkeleben 1857 Bas.!

229. L. tuberosus L. Auf Aedern baufig.

230. L. pratensis L. Biefen, Gebuiche, gemein

\* L. sativus L. Seltnere Futterpflange. D. Bei ber Gubenburg und bei Gerwisch auf Medern gebaut.

231. L. silvester L. Balber, selten. D. Brandeleber Gol;

Satel zwijden bem erften und britten Bijchopeifchlage Scht.

b) platyphyllus Retz. (als Art). Gebifche, felten. Brb. Cibbamm nörblich von Tochheim T.! Bertleiz bei ber Saalfabre S.!!

232. L. paluster L. Biejen, an Graben, besonders A zerstreut. Brb. Babezer Teich!! S. Bei Grilnewalde nach Randau bin; Kreuzhorst beim Forsthause S. Wiesen zwischen Kablenberge und b. Klus Bns. B. Nach Samswegen zu!! D. Schiffgraben; öftlich von Ginthersborf Scht. Egeln Bobewiesen bei Tarthun, Wolmirsteben Unseburg Scht. St. Wiesen am Gansegurter Busch, Hecklingen, St. Scht.

233. L. vernus (L.) Bernh. Laubwälber, felten. Bg. Burgerholz bei ber großen Buche K. D. hatel fehr häufig!!

234. L. niger (L.) Wimm. Trodne Laubwälber, fehr zerfreut

R. Rammftebt!! R. Bellenberge bei Donnftebt Eb. D. Branbs.

leber Bolg S. Schermte im Sauerholg Eb. Batel!!

235. L. montanus Bernh. Laub- und Nabelmalber, gerftreut. 3. Friedrichsholg!! Brb. Bwijden Ramerit und Babes S. Bg. Grabauer Buich K. R. Dberhagen S. Resperbuich!! Rammftebt!! R. Benit !! Butterwinfel !! Bellenberge bei Donnftebt Eb. D. Branbsleber Bolg S. Batel !!

b) tenuifolius Roth. (als Art). Bg. Grabauer Buich K.!

#### \* Phaséolus L.

\* P. multiflorus Willd. Gebaut.

\* P. vulgaris L. Baufig gebaut.

# 26. Familie. Amygdalaceae Juss.

# \* Amygdalus L.

\* A. nana L. Bierftrauch aus Gilb-Europa.

#### \* Pérsica Tourn.

\* P. vulgaris Mill. Bier und ba an Spalieren gezogen.

# 107. Prunus L.

\* P. Armeniaca L. Baufig in Garten. 236. P. spinosa L. Balbranber, Abbange, febr baufig, 3. B. M. Am Bieberiter Buid! R. Am Unterhofger Berg!!

\* P. insiticia L. hier und ba in Garten. \* P. doméstica L. Ueberall in Garten.

237. P. avium L. Balber, febr felten. R. E. Ueberall in Gärten.

\* P. Cerasus L. In Garten, an Chauffeen, überall gepflangt. 238. P. Padus L. Feuchte, ichattige Balber, felten. Brb. Gruneberger Buich S. G. Kreughorft S. D. Diblenboladen bei Rrottorf Scht. In Unlagen baufig angepflangt.

\* P. Mahaleb L. Bierftrauch aus Gubbeutichland, in Anla-

gen nicht felten.

# 27. Familie. Rosaceae Juss.

## † Spiraea L.

+ S. opulifolia L. Bierftrauch aus Norbamerita, verwilbert D. Gublich vom herrnfrug!!

\* S. salicifolia L. Zierstrauch aus Gubost-Europa, in Unlagen überall.

## 108. Ulmaria Gilibert. erweitert.

239. U. pentapétala Gilibert. Feuchte Wiesen und Be-

buide, febr baufig.

240. U. Filipendula (L.) A. Br. Trodne Laubwälber, Biefen, Abhänge, Begränder, zerstreut. S. Frohseiche und Sohlide Berge; Bolfskehlenbusch; Wiesen bei Nandau S. Damm nach Ranies Eh. M. Schnarsleben; Damm zwischen Krakau und Prester & An ber Chaussee bei Richters Gasthof!! Zwischen B. und Samewegen!! Bg. Grabauer Busch K.

#### 109. Geum L.

241. G. urbanum L. Schattige Laubmalber, Gebuiche, ge-

242. G. rivale L. Sumpfränder, Moorwiesen, feuchte Gebische, sehr zerstreut. 3. Zwischen Luso und Bütrichau!! Bg. Moltenbruch K. R. Unterholzer Berg E. Unterhagen; Torfwiesen vor dem Hagen S. Rammstedt!! R. Moodbruch M. S. Erbke; Süpplingen 8.

# 110. Rubus L. \*)

243. R. fruticosus L. Balber, häufig.

244. R. thyrsoideus Wimm. Balber, felten. D. Satel

245. R. caesius L. Balbranber, Meder, gemein.

246. R. Idaous L. Balber, gerftreut. Brb. Balternienburg 5. S. Plotther Biegelei S. Bg. Burgerholz; Gilfener Forft S.

247. R. saxatilis L. Bergmalber, felten. D. hatel am Rod-febter Bege und fonft Scht.

# III. Fragária L.

248. F. vesca L. Grafige Stellen, trodne Balber, febr baufig. 249. F. collina Ehrh. Grafige Stellen, fonnige Bügel, febr gerftreut. S. Frohleiche Berge; neben bem Bolistehlenbuich S.

† F. elatior Ehrh. Im Gebiet wilb noch nicht gefunden; wohl nur verwilbert G. Ranbau neben bem Schlofigarten S.

<sup>\*)</sup> Die ftrauchigen Rubi biefes Gebiets find noch nicht genauer unterfuct worden.

#### 112. Comarum L.

250. C. palustre L. Moorwiesen, Torsslimpse, besonders D, zerstreut. Z. Butterdamm!! S. Kesselteich bei Pretin!! zwischen Pretin und Dornburg S. W. Nördlich von Camswegen!! Bg. jenseit Niegripp; Hungriger Wolf; Resen S. N. Moosbruch; Erbte M. S.

#### 113. Potentilla L.

\* P. fruticosa L. Saufiger Bierftrauch.

251. P. supina L. Ueberschwemmte, feuchte Stellen, Dorfsstraßen, zerstrent. S. Friedhof; Wiese vor Frohse; an der Elbe bei Grünewalbe S. M. Rothehorn S. Bg. Niegripp E. Am Scharstauer See Ok.! am Blumenthalichen Bege K. R. E.!! D. An der Hihrerwiese und am linken Bobe-Ufer unweit der Diible Scht.

252. P. Anserina L Begrander, Triften, gemein.

† P. recta L. In Bergwälbern Mittelbeutschlands einheimisch; zuweilen als Zierpstanze in Garten. Berwilbert S. Friedhof Eb.!! D. Nörblicher Rand bes Bahnhofs und Durchstich ber Braunschweisger Eisenbahn Scht.

253. P. argentea L. Sonnige Sügel, Begranber, gemein. 254. P. reptans L. Balber, Graben, Triften, febr haufig."

255. P. Tormentilla Sibth. Wie vorige, z. B. Brb. hinter Balternienburg S. S. Zwischen Pretin und Dornburg; zwischen Pfügty und Pilm S. M. Klusheibe Bus. Bg. K. D. hatel S.

256. P. verna L. Triften, sonnige Hügel, nicht selten, z. B. S. Tobtenhäger bei Grünewalbe S. Ueberfahrt nach Dornburg Eb. M. Hügel bei Schnarsleben!! Bg. Trift bei Detershagen!! R. Bei ber Eisenbahnstation!!

257. P. in cana Mnch. Bie vorige. G. Beiendorfer Berge S. Ueberfahrt nach Dornburg Eb. M. Sügel bei Schnareleben!! Bei

Richters Gafthof!! R. Rolbiger Beibe S.

258. P. opaca L. Sonnige Bügel, trodne Balber, gerftreut. S. Hummelsberg S. Frohfeiche Berge Eb.! M. Engelsberg S. Bg. Kilfauer Forft; Grabauer Forft Ziegelei K. Bürgerholz Dk.! R. Hagen S. N. Kolbiger Beibe S. D. Hatel S.

259. P. alba L. Trodne Laubwälber und Gebiliche, sehr zersftreut. 3. Friedrichsholz Rindfleisch!! Brb. Zwischen Walterniensburg und Poleimühle in der Rabe der Nuthe S. S. Frohseiche Berge S. Bg. Springberg K. Grabauer Forst-Ziegelei Dk.! D. Brands-leber Holz; Hatel auf der Sibseite Eb.

260. P. sterilis (L.) Aschs. Schattige Laubwälber, selten.

D. Batel im Domburgshau!!

### 114. Alchemilla Tourn.

261. A. vulgaris L. Balber, felten. D. Satel, befonbers

im Wafferthal baufig!!

262. A. arvensis (L.) Scop. Aeder, besonders nach der Ernt, ziemlich häufig. 3. Vor Eichholz!! Brb. Zeitz S. S. Pömmelte; Zadmünde; Frohse; Welsleben S. Bg. Zibbekleben K. Krähenberge Dk.! R. Am Hagen E.

#### 115. Rosa Tourn.

\* R. lutea Mill. Baufige Bierpflange.

263. R. canina L. Walbränder, Abhänge, Wege, gemein. 264. R. rubiginosa L. Balber, febr zerstreut. R. Sber

hagen S. D. Brandeleber Bolg Eb. St. Bedlingen Eb.

265. R. tomentosa Sm. Sie vorige. Brb. Zwijchen Gebnit und Dornburg S. C. Brandsleber Holz; Hafel: Boß S.

\* R. gallica L. Baufige Bierpflanze.

# \* R. contifolia L. Desgleichen.

E. !! entbedt. Babriceinlich auch innerhalb bes Bebiets.

266. A. Eupatoria L. Weg- und Walbränder, gemein.
A. odorata Mill. Außerhalb der Grenze etwa eine Meile nordwestlich von Kalvörde, nördlich von der Chre in der Nähe bes Grabenmeisters beim Dorse Mannhausen am 10. August 1857 von

116. Agrimónia Tourn.

## 117. Sanguisorba L.

267. S. officinalis L. Biesen, ziemlich häusig. Brb. 3wischen Ronnei und Walternienburg; Gödnitz S. S. Frohser Biesen Eb. Zwischen Pretzin und Dornburg S. Randan Eb. Kreuzhorst S. M. Rothehorn-Biesen!! Bei Gerwisch an der Potstrine!! Bg. Blumenthalsche Wiesen K. N. Moosbruch; Erbke M. S. D. Eggensstedt S.

#### 118. Potérium L.

268. P. Sanguisorba L. Sonnige Higel und Begrander, bier nur in F. S. Friedhof; Mühlinger, Zenser, Westerhüseniche Berge S. M. Dobenborf!! Klingeberg bei Sülldorf!! Wiesenberg bei Rieder-Dobeleben S. D. Brandsleber Holz Eb. Brn. Sp.

# 28. Familie. Pomariae Lindl.

# 119. Crataegus L.

269. C. oxyacantha L. Balber, Gebüsche, häufig, 3. B. S. Grünewalbe!!

270. C. monogyna Jacq. Bie vorige.

# 120. Pirus L.

271. P. communis L. Balber, febr gerftreut, 3. B. S. Ras pitelbuich; Elbinsel Eb. M. Bieberiter Busch!! R. Sagen E. In Garten überall.

272. P. Malus L. Balber, felten. R. Unterholger Berg E. In Garten in febr vielen Barietäten.

273. P. aucuparia (L.) Gaertn. Balber, zerstreut, z. B. Brb. 3wischen Balternienburg und Boleintühle S. S. Zwischen Pregin und Dornburg S. An Strafen öfters angepflanzt.

274. P. torminalis (L.) Ehrh. Bergwälber, felten. D. Ba-

tel an ber Domburg !! Bon mir bort nur ftrauchartig bemerkt.

# 29. Familie. Onagraceae Juss.

# 121. Epilóbium L.

275. E. angustifolium L. Sonnige hügel, trodne Balber, zerstreut. B. Süblich von Dornburg!! S. Grünewalde S. Scharsleber holz bei Dornburg S.!! Bg. K. R. Am Oberhagen E.!! zwisschen Birtholz und Tangerhütte E.! R. Erbke; hagen M.S. D. hatel S.

276. E. hirsútum L. ex p. Gräben, Bache, zerstreut. B. An ber Ruthe bei Kämerit!! S. Bullenwiese Eb. Gr. Mühlingen; Dornsburg S. M. Klappermühle bei Königsborn Bus. Bg. K. R. M. S. 277. E. parviflorum Sohreb. Wie vorige, sehr häufig.

278. E. montanum L. Schattige Balber, febr zerstreut. S. Grifinewalbe S. zwischen Pretgin und Dornburg!! Rablenberge Eb. Bg. K. R. Rammftebt!!

279. E. roseum Schrob. Gräben, hier und ba. Brb. Cpprena; Iriger Busch; Göbnitz Eb. S Frohser Bullenwiese Eb. Kinn S. M. Sillborf Bus.

280. E. totragonum L. An Graben zerftreut. Brb. 3miden Alt-Tochheim und Rlein-Rosenburg S!! amifchen Gobnit und Dornburg S. G. Am Graben, ber füboftlich aus bem Reffelteich bei

Bretin tommt !!

281. E. palustre L. Sumpfwiesen, zerstreut. Brb. Poleimühle; Gödnit Eb. Bullenwiese Eb. S. Plötht; Pretin; Dornburg S. M. Psuhlmühle bei Gerwisch!! B. Zwischen Samswegen und Lindhorst!! Bg. K.

#### † Oenothéra L.

† O. biennis L. Sanbselber, Wegränder, besonders am Elbsufer sehr häufig, 3 B. S. Tobtenhäger Eb. M. Süblich vom hermstrug!! Bg. K. R. Elsterburg bei hundisburg M. S.

† O. muricata L. Wie vorige, zerstreut. Brb. Zwischen Göbnitz und Dornburg S.!! S. Randau Eb. M. Rothehorn bei ber Cisenbahnbrilde und an ber Spitze Eb. In ber Nähe ber Cibe stüllich vom herrntrug!! zwischen Biederitz und Gerwisch in ber Nähe ber Cisenbahn S.!!

X O. biennis X muricata. Mit ben Eltern M. In ber

Nahe ber Elbe füblich bom Berrentrug!!

Die Arten bieser Gattung find erft feit bem Anfange bes 17ten Jahrhunderts aus Nordamerita in Guropa eingewandert.

#### 122. Circaea Tourn.

282. C. lutetiana L. Schattige Laubwälber und Gebüsch, zerstreut. Brb Rosenburger Busch Eb. Tochheimer Busch!! Grüneberg S. S. Grünewalbe S. zwischen Prezin und Dornburg Eb. M. Pechauer Busch T.!! Biederiger Busch!! Bg. Heibhau S. A. Unterhagen E.!! Unterholzer Berg!! N. Bacosenberg; Ronneuspring M.S.! D. Brandsseber Holz im Boigkstiegholze Scht. Hatel S. St. Gänsesurer Busch!!

C. alpina L. Rabe ber nörblichen Grenze bei Liberit in einem Erlenbruch unter bem Landsberg öftlich von ber Chauffee E."

# 123. Trapa L.

283. T. natans L. Stehenbe Gewäffer, besonders in ben ver laffenen Stromtheilen ber Elbe zerstreut. 3. Pfannenteich!! S. Elbenau S. M. Pechauer See Bns.!!

# 30. Familie. Halorrhagidaceae R. Br.

## 124. Myriophyllum Vaillant.

284. M. verticillatum L. Graben, stehenbe Gemaffer, zer-ftreut. Brb. Poleimuble S. S. Im Graben am Grabirmert; Sool-

kanal; Areuzhorst S. M. Bechauer See T.! Am Alusbamm 1855!! B. Jersleben S. Bg. Bei Detershagen 1856 K. D. Krottorf an ber obersten Wiberbreite und an ber Cisenbahn; alte Bobe bei Günthersborf Scht.

285. M. spicatum L. Stehenbe Gewässer, zerstreut. 3. Pfannenteich!! Brb. Gr. Rosenburg Eb. Babezer Teich!! S. Um Grabirwerk Eb. Röthe; Grilnewalde S. Elbenau Eb. M. Notheshorn in ber Mittel-Cibe!! D. Alte Bobe bei Glinthersborf Scht.

# 31. Familie. Hippuridaceae Lk.

# 125. Hippúris L.

286. H. vulgaris L. In und an stehenden Gemässern Gräben, Sümpsen, zerstreut. Brb. Babezer Teich!! S. hinter dem Pflanzgarten; zwischen Glinde und der Elbe S. M. Süblich von Prester!! B. Um Sumpf bei Samswegen an der Bestseite E.! Bg. Graben nördlich von Tiefer Bisch Dk.!! R. Ohre oberhalb der Stadt M.S.! D. Krottorf Scht. St. Auf dem Bruche Scht.

# 32. Familie. Callitrichaceae Lk.

# 126. Callitriche L.

287. C. stagnalis Scop. Stehende Gemäffer, zerstreut. S. Grünewalbe nach Elbenau bin am Bufterniß; Pretin Eb. 288. C. verna L. Besonders in stehenden Gemäffern, gemein.

# 33. Familie. Ceratophyllaceae Gray.

# 127. Ceratophyllum L.

289. C. submersum L. Stehenbe Gewässer, selten. In einem Graben bei Eggersborf Eb. M. Pechauer See Bns.
290. C. demersum L. Wie vorige, gemein.

# 34. Familie. Lythraceae Juss.

# 128. Lythrum L.

291. L. Salicaria L. An Graben und Bachen, gemein. 292. L. Hyssopifolia L. An Graben, auf überichwemmten, später troden werbenben Stellen, Adersurchen, zerstreut. Brb. Zwischen Kolphus und Zeit S. S. Zadmunde S. Randau; Kahlenberge; jenseit Pretin Eb. M. Rothehorn 1855 einzeln E.!! Bg. Bürgermark Dk.! R. Wehlit E. Wenddorf E.! D. Wulserstedt; am heiligen Hoch; Neu-Brandsleben am gelben Weg Scht.

# 129. Peplis L.

293. P. Portula L. An Sümpfen, Gräben, auf überschwemmten, später trochnenden Stellen, zerstreut. S. Grünewalde; Rablenberge Eb. Erlenbruch vor Pretzin; Elbufer bei Ranies S. M. Bor dem Biederitzer Busch T.1 zwischen dem Busch und Biederitz!! Bg. Süblich von der Eisenbahn und östlich vom Wege nach Parchau; heibhau K. N. Schwarze Pfuhl bei Bülstringen M.S.: O. Alte Bote bei Gintbersdorf; Brandsleber Holz bei der Ziegelei Scht.

# . Familie Philadelphaceae Don.

# \* Philadelphus L.

\* P. coronarius L. Häufiger Zierstrauch aus Gub-Europa

# 35. Familie. Cucurbitaceae Juss.

## \* Cucurbita L.

\* C. Pepo L. Säufig in Garten.

# \* Sicyos L.

\* S. angulata L. Zierstrauch aus Norbamerita, jur Betleibung von Lauben u. f. w.

#### \* Cúcumis L.

\* C. sativus L. Ueberall in Garten gebaut.

# 130. Bryónia L.

294. B. alba L. An Heden, Zünnen, zerstreut. S. Grünes walbe S. Pretin S.!! M. Subenburg S. Bg. K.! R. E. Mahlspfuhl!! Bielleicht nicht einheimisch, sonbern ursprünglich als Zierspflanze gezogen.

# 36. Familie. Portulacaceae Juss.

## + Portuláca Tourn.

† P. oleracea L. Stammt aus Sub-Europa. Im Gebiet nur als Gartenunkraut. M. Subenburg S. Bei Richters Gasthof!! \* P. sativa Haw. Häufig in Gemusegurten gebaut.

## 131. Móntia Micheli.

295. M. fontana L. (minor Gmel.) Canbige, feuchte Meder,

felten. Bg. Springberg K. ! zwischen Refen und Gutter S.

296. M. rivularis Gmel. In Quellen und kleinen Bachen bisher nur auf D bes rechten Clbusers, bort aber ziemlich verbreitet. 3. Am Wege nach Tröbnit Rosenbaum!! Brb. Zwischen Babez und Poleimühle S.!! zwischen Göbnitz und Dornburg Bus.!! S. Im Graben sübostlich vom Kesselteich bei Prehin Bus.!!

# 37. Familie. Paronychiaceae St. Hilaire. 132. Corrigiola L.

297. C. litoralis L. Fenchte, sandige Flususer, Sandwege, zerstreut. Brb. Badez S. !! Kämerity!! S. Elbuser bei Grünewalde; zwischen Pretin und Dornburg S. M. Rothehorn-Spitze E.!! alte Klus Bns. Bg. Elbuser bei der Rogätzer Fährstelle; Krähenberge K. R. Weg nach dem hagen E.!! Zibbricksche Tannen E.! N. Bor d. Zernitz M. S. jchwarze Psuhl M. S.!

#### 133. Herniária Tourn.

298. H. glabra L. Sanbfelber, gemein.

# 134. Illécebrum Tourn.

299. I. verticillatum L. Feuchter, mooriger Canb, sehr selten. N. Schwarze Pfuhl E., M. S.!

# 38. Familie. Scleranthaceae Lk.

#### 135. Scleranthus L.

300. S. perennis L. Wegränder, Brachader, trodne Balber, jehr häufig.

301. S. annuus L. Bie vorige.

# 39. Familie. Crassulaceae D. C.

302. S. maximum Sutt. Trodne Balber, Grasplätze, Higel, zerstreut. S. Friedhof S. an ber Eisenbahn nach Besterhusen Eb. Bg. K. R. Oberhagen!! Rammstedt!! R. Butterwinkel M. S. Bernig!! jübischer Begrabnigplaty!! Sagen; Bellenberge M. S. Brn. Eb.

303. S. purpurascens Koch. Gebuiche, bisher nur in ber Rabe ber Elbe, zerstreut. Brb. Zwischen Walternienburg und Boleimuble T.! Gruneberger Forst S. S. Beim Schießhaus; hinter

Bretin Eb. D. Rotheborn E.!!

\* S. album L. In Gebirgen Mittelbeutschlands einheimisch, bier nur auf Mauern angepflanzt. S. Westerhüsen, Kirchhofsmauer E.!! Dornburg, Mauer bes Schlofigartens Eb.!! D. Horborf, umweit bes Bfarrbaules Scht.

304. S. acre L. Mauern, trodne Balber, Bugel, Grasplate,

gemein.

305. S. boloniense Loisl. Wie vorige, weniger häufig, & B. S. Friedhof; Busch S. M. Elbufer nörblich vom Herrnfrug

Bus. R. Bactofenberg M S.

306. S. reflexum L. Sonnige Higel, trockne, grafige Stellen, Kiefernwälber, zerstreut. Brb. Friedrikenberg! S. Zenjer Berge S. Keiekenberge Eb. Frohjesche Berge!! Grünewalbe am Damm nach Ranies Eb.!! Plöthy; Gommern S. zwischen Pretzin und Domburg S.!! M. In ber Nähe ber Elbe sublich vom herrnkrug!! heprothysberge Eb. Bg. Westlich von ben Chausses-Kienen!! Güttersche Berge K. R. Beg nach bem Hagen; Bertingen E.

# \* Sempervívum L.

\* S. tectorum L. Auf Dachern häufig gepflanzt. Ginbeimisch an Felsen Subbeutschlands.

# 40. Familie. Grossulariaceae D. C.

## 137. Ribes L.

† R. Grossularia I. Ueberall in Garten. Wohl nur verwilbert S. Zwijchen Bretin und Dornburg Eb.

307. R. alpinum L. Bergmalber, felten. R. Bellenberge bei Donnftebt Eb. Sonft nur in Unlagen angepflangt.

308. R. nigrum L. Erlenbriicher, febr gerftreut. B. 3wifden Balternienburg und Poleimuble S. Bg. K. Richt baufig in Garten.

309. R. rubrum L. Schattige, feuchte Balbranber, febr gerftreut. G. Buid; zwijchen Pretin und Dornburg S. D. Tannen bei ber Althalbensleber Biegelei M. S.! In Garten überall.

\* R. aureum Pursh. Zierstrauch aus Norbamerifa.

\* R. sanguineum Pursh. Desgleichen.

# 41. Familie. Saxifragaceae Vent.

# 138. Saxífraga L.

310. S. tridactylitis L. Mauern, Meder, Riefernichonungen. zerstreut. S. Hummelsberg; Eisenbahngräben bei Westerhüfen S. Ueberfahrt nach Dornburg Eb. Dt. Nördliche Glacismauer ber Sternichange!! Bg. Bei ber Schermenichen Mühle!! bei ber rothen Mühle K. Brn. Garcke.

311. S. granulata L Connige Bilgel, trodne Balber. baufia. 2. B. G. Summeleberg!! Frobseiche, Rejetenberge; vor Befterbufen; amifchen Pretin und Dornburg S. Dt. Rluebeibe T.! Bg. K. R. Bactofenberg; Erbte; Sagen; Wellenberge M. S.

# 139. Chrysosplénium Tourn.

312. C. alternifolium L. Auf quelligem Boben, befonbers in Balbern, an ichattigen Graben, febr gerftreut. Bg. Burgerholg mifchen Beibhau und Canbforthelate; Moltenbruch K. R. Unterbolger Berg E. Moorwiese vor bem Sagen E.!

# 42. Familie. Umbelliserae Juss.

#### 140. Hydrocótyle Tourn.

313. H. vulgaris L. An Gumpfen, auf Moorwiesen, gerftreut. 3. Butterbamm!! Brb. Bwijden Balternienburg und Poleimuble S. gwifden Gobnit und Dornburg Eb. G. Finn S. gwiichen Plotto und Pretin S.!: D. Zwijchen ber Klus und Wahlit Bns. Bg. Beim Forfthaus Burgerholz K. Gufener Forft!! R. Rolbiter Beide!! D. Wulferftebt Scht.

#### 141. Sanícula Tourn.

314. S. europaea L. Schattige Laubwalber, febr gerftreut. R. Resperbuich E.!! R. Donnftedt in ben Bellenbergen M. S. D. Branbsleber Sola S. Satel !!

# 142. Eryngium Tourn.

315. E. campestre L. Begränder, Triften, Anger, an ber Etbe überall gemein, F fehr häufig. Berschleppt in D meilenweit lanbeinwärts z. B. Z. Bor bem Seibethor!! Bg. Bei Hohenseben J. Müller.

#### 143. Cicúta L.

316. C. virosa L. An Gräben, Silmpfen, auf Floßholz, ztritreut. Z. Butterbamm S. Brb. Zwijchen Walternienburg und Poteimühle; Babezer Teich!! zwischen Göbnitz und Dornburg S. S. Finn; zwischen Plötzky und Pretzin S. W. Samswegen Bas. Bg. An der Ihle bei der Bulfhagenmühle K. N. Moosbruch M. S.

# 144. Apium L.

317. A. graveolens L. An salzigen Gräben und Bäden, häufig. S. Gr. Salze am Grabirwert S. Sohlen; Beiendorf S. M. Bei Sülborf!! D. Soht. Zwischen St. und hecklingen Eb. Außerbem in Gemusegarten gebaut.

# \* Petroselinum Hoffm.

\* P. sativum Hoffm. Stammt aus Sub-Europa. In Burten überall.

## 145. Helosciádium Koch.

318. H. repens (Jacq.) Koch. Moorwiesen, selten. M. Sillborf bei ber Thalmühle früher Bns. Gerwlich zwischen ber Pfuhlmühle und ber Chaussee!!

#### 146. Falcária Rivin.

319. F. Rivini Host. Beg- und Aderrander, gemein.

#### † Ammi Tourn.

† A majus L. Stammt aus Sib-Europa. Zuweisen auf frisch angesäten Luzernefelbern. S. 1850 S.! M. Süllborf Eb., aber stets unbeständig.

# 147. Aegopódium L.

320. A. Podagraria L. Laubmalber, Gebuiche, gemein.

#### 148. Carum L.

321. C. Carvi L. Biefen, Wegranber, gemein.

# 149. Pimpinella L.

322. P. magna L. Laubwälber, Gebuiche, febr zerftreut. Brb. Sopplate bei Grüneberg S. Bg. Zwischen Detershagen und Löbe-tübn K. R. Rammftebt E.! Bathen!!

323. P. saxifraga L. Trodne Balber, Grasplate, Begran-

ber, gemein.

b) dissectifolia Wallr. In ber Nahe ber Eibe füblich vom Berrntrug!!

#### 150. Bérula Koch.

324. B. angustifolia (L.) Koch. Graben, Bache, nicht felsten, z. B. Z. Zwijchen Luso und Jütrichan!! Brb. Zwischen Göbnitz und Dornburg!! S. Buich Eb. Eggersborf; Frobse; Bullenwiese; Beienborf S. M. An ber Sternschanze beim Friedrich Bilhelmsgarten Bns. Bg. K. R. Rammstedt an ber Cisenbahn!! St. Gausesurter Busch!!

# 151. Sium L.

325. S. latifolium L. Graben, Sumpfe, gemein. \* S. Sisarum L. Stammt aus bem öftlichen Afien. Sier und ba gebaut

# 152. Bupleurum Tourn.

326. B. tenuissimum L. Salinen, salzhaltige, turzbegrafte Stellen. S. Soolfanal S. Gradirwert bei Gr. Salze Eb.!! vor Randau S. M. Sülldorf öftlich am Dorf E.! Krafauer Anger E.! D. Espenanger; fleine Sülzen; hinter bem Kohlenschacht vor bem Magbeburger Thor Scht. Hedlingen; St. Scht. Rathmannsborf Sp.!

327. B. falcatum L. Walbrunber, Gebuiche, meist F, fehr gerftreut. C. Cobiide Berge Eb. ! R. Kolbiter Beibe Bus.! D.

Brandsleber Bolg; Batel S. St. Soben-Errleber Buich E.!

328. B. rotundifolium L. Aeder, Gartenland, nur F, felten. S. Anlagen bei Gr. Salze Eb.! (vielleicht nicht einheimisch) Brn. Garcke.

#### 153. Oenanthe L.

329. O. fistulosa L. Gräben, zerstreut. 3. Butterbamm!! Brb. Cyprena; Friger Busch; Babezer Teich Eb. S. Ronbel; Busch; zwischen Felgeleben und Gnadau; Döben Eb. M. Kratau Bns. Chaussegräben nördlich von Gerwisch!! Pg. K. Güsen!! N. Freischift M. S. Zwischen D. und Günthersborf F. Reinecke. Eisenbahngräben bei Krottorf Scht.

330. O. aquatica (L.) Lmk. Gumpfe, Graben, 3. B. Brb. C. Buich!! Griinewalbe S. DR. Bor bem Subenburger Thor öftlich ber Sternichange!! Rratau Bns. Bg. K. D. Borborf in ber alten Bobe; Deierweiden bei Sabmereleben Scht.

## 154. Aethúsa L.

331. A. Cynapium L. An Baunen, im Gartenlanbe, gemein.

#### 155. Seseli L.

332. S. Hippomarathrum L. Steinige Abbange, nur & und zwar meift auf Ralt, febr gerftreut. D. Gullborf am Bege nach Ofterwebbingen E. !! und nach ber Thalmuble T. ! D. Emmeringen am Emmersberg und bor bem Brandeleber Bolg Scht. Brn. Ralfberge bei ber Chaussee nach Ralbe und über ben Beinbergen in großer Menge!! Erreicht bier feine nörbliche Grenge.

333. S. annuum L. Abbange, Triften, Laubwalber, gerftreut. S. hummelsberg; Frohfeiche, Beienborfer, Befterhufeniche Berge S. Dt. Klingeberg bei Gullborf Eb. Biefenberg bei Rieberbobeleben S. R. Oberhagen!! D. Branbeleber Bolg im Boigtholg Scht. Bedlinger Berge von ber Afdereleber Barte nach Reundorf und Ct. au: Boben-Errleben Scht.

b) pygmaeum. M. Bugel bei Schnareleben E.! St. Trif.

ten bei Rathmanneborf Sp.!

#### 156. Cnidium Cuss.

334. C. venosum (Hoffm.) Koch. Biefen, befonbere gwiiden Gebüschen, faft nur im Elbthal. Brb. Zwischen Balternienburg und Ramerit E.!! zwischen Tochheim und Poleimuble S. E. Buid!! Grunewalte; Randauer Wiefen; zwifden Plotty und Gommern; zwifden Pretin und Dornburg S. Dl. Bechau!! Bieberiber Buid Gubrand!! an ber Potftrine fublich von Gerwifd Bns. !!

#### 157. Sílaus Bess.

335. S. pratensis Bess. Biefen, Bebuiche, befonbers M. febr verbreitet, 3 B. Brb. Bei ber Fahrstelle!! G. Rapitelbufd!! Elbenau; Brebin Eb. Dt. Rotheborn-Biejen!! In ber Elbe fublid vom herrnfrug!! am Bieberiter Buid!! füblich von Berwifch!! 28. Rach Camswegen ju!! Mofe!! Bg. Norblich von Schermen, weftlich von ber Chauffee!! R. Unterhagen!! im Golg!! Bathen!! D. Schiffgraben; Bobenieberung von Sabmersleben bis St. Scht. 3. B. Ganfefurt!! Brn. Auen Sp.

#### + Levisticum Koch.

† L. officinale Koch. Stammt aus Gub-Europa. Im Gestiet wohl taum gebaut, aber verwildert Bruchwiesen oberhalb St. Scht.

#### 158. Selinum L.

336. S. Carvifolia L. Schattige Laubwälber, Wiesen, zersstreut. 3. Friedrichsholz!! S. Busch!! Wiesen vor Randau S. Bg. K. R. Oberhagen!! Nammstedt!! D. An der Braunschweiger Eisensbahn; Brandsleber Holz Scht. Egeln: Bodenniederung zwischen Tarsthun und Unsedurg Scht.

# 159. Angélica L.

337. A. silvestris L. Feuchte Wiesen und Gebiliche, häufig, 3. B. J. Ankuhn!! Brb. Tochheimer Busch!! Poleimühle; Dornburg Eb. S. Busch; Grünewalbe S. M. Beim Nichterschen Gasthof!! Bieberitzer Busch!! B. Barleber Busch Ahlenstiel! Bg. K. R. Unterhagen!! St. Gänsesurter Busch!!

# 160. Archangélica Hoffm.

338. A. sativa (Mill.) Aschs. An Gräben und Biefen, selten, Bobewiesen von Egeln bis St. Scht. Bei St. im Fabrikgarten E.1

#### 161. Peucédanum L.

339. P. officinale L. Biesen, Gebüsche, nur in A. Brb. Anger zwischen Kl. Wosenburg und Breitenhagen T. S. Kapitelsbufch!! M. An ber Berliner Chausse!! Am Sübrand bes Bieberiter Busches Bns.!! Bg. Körblich ber Dümke K. D. Horborf Scht. Egeln: Zwischen Tarthun und Unseburg Scht. Brn. Bei München-Riensburg Sp.

340. P. Cervaria (L.) Lapeyr. Laubwalber, Abhange, felten. S. Frobseiche Berge Eb.! früher auch auf ben Beienborfer Ber-

gen Eb. D. Ampfurt im Sauerholz Scht.

341. P. Orooselinum (L.) Mnch. Sonnige hilgel, trodne Balber, zerstreut. 3. Friedrichsholz!! Brb. Anhöhe silblich von Tochsheim!! S. Zenser Berge Eb. Frohsesche Berge; Pretiner Kirchhof; zwischen Pretin und Dornburg S. B. Silblich von Lindhorst!! Bg, Unter dem hagen K. westlich von den Chaussee-Kienen!! R. Obershagen!! R. Barenberg!! Kolbiger heide!!

#### 162. Thysselinum Rivin.

342. T. palustre (L.) Hoffm. Sumpfwiesen, zerstreut. Brb. Afderfon, Flora. 3. Abist. 4

Bwischen Balternienburg und ber Poleimühle; zwischen Poleimühle und Babez S. S. Zwischen Pretin und Dornburg S. Gommern im Schloßbruch Eb. B. Zwischen Samswegen und Lindborft!! Bg. An ber Chausse nach Schermen K.! D. Bruchgraben zwischen Bulferstebt und D. Scht.

#### \* Anéthum Tourn.

\* A. gravéolens L. In Gärten. Stammt aus Süd-Europa.

## 163. Pastináca Tourn.

343. P. sativa L. Biefen, gemein.

#### 164. Heracléum L.

344. H. Sphondylium L. Wiefen, Balber, gemein.

## 165. Laserpícium Tourn.

345. L. latifolium L. Bergwälber, felten. nur b) asperum Ortz. (als Art). D. Salel: Bog, Steinwegshau und vorberer Schmersenteich S.!

346. L. prutenicum L. Laubwälber, febr gerftreut. R. Rammfledt westlich vom Kirchwege F. Hartmann!! D. Satel Eb.

#### 166. Daucus Tourn.

347. D. Carota L. Beg- und Balbranber, Biefen, gemein.

#### 167. Caúcalis L.

348. C. daucoides L. Aeder, nur F, selten. S. Frohseiche Berge Eb.! Sohlsche Berge S. St. Nordöstlich von Rathmannsborf am Wege von St. nach Brn.!!

# 168. Tórilis Adans.

349. T. Anthriscus (L.) Gmel. Gebüsche, Baune, Beden, gemein.

#### 169. Scandix L.

350. S. pecten Véneris L. Aecker, nur F, nicht häufig. S. Am Ronbel Eb.! Beiendorfer Berge Eb. zwischen Salze und Felgeleben; Obben; vor Eggersborf S. D. Krottorf; Horborf Scht. St. Rathmannsborf E.! Brn. Sp.

#### 170. Anthriscus Hoffm.

351. A. silvestris (L.) Hoffm. Schattige Laubwälber, Gebüjde, gemein. † A. Cerefolium Hoffm. Stammt aus Gib-Europa. Saufig in Barten; verwilbert S. heden nach Frohse bin; Brunewalbe bei ber Oberförsterei S.

352. A. Scandix (Scop.) Aschs. An Beden und Baunen,

gemein.

# 171. Chaerophyllum L.

353. C. témulum L. Gebüsche, an Zäunen, gemein. 354. C. bulbosum L. Gebüsche, Wegränder, Wiesen A. meist sehr häufig, 3. B. Brb. Werkleiz bei ber Saassäker!! S. Busch!! W. Rothehorn!! Berberspite T.! Berliner Chaussee!! B. An ber Chaussee nach Kolbith!! Bg. K. R. Kapellberg!! Brn. gemein; hier werden unter bem Namen Päperläpä die Knollen ber wilden Pflanze gegessen.

# 172. Confum L.

355. C. maculatum L. Zäune, Gebüsche, nicht gerade selten. Brb. Zwischen Ronnei und Tochheim Eb. S. Busch; Grünewalbe S. Randau Eb. M. Rothehorn!! Werberspike T.1 W. Herrnholz bei Glindenberg S. R. Bäthen bei ber Eisenbahnstation!! D. An ben Scheunen; Krottors am Amte Scht. St. Athensleben; Löberburg; Reundorf; Hohen-Errleben Scht.

#### t Corlandrum L.

† C. sativum L. Stammt aus Gub-Europa. Im Gebiet nur gufällig ausgesamt. S. Eisenbahngraben bei Gnabau Eb. M. Am Zwinger E. Chausseegraben vor Rl. Ottersleben S.

# 43. Familie. Araliaceae Juss.

#### 173. Hédera L.

356. H. Helix L. Laubwälber, zerstreut. R. Donnstebt S. D. hatel!! bort aber unfruchtbar. An Mauern überall gepflanzt unb bann zuweilen blübenb.

# 44. Familie. Cornaceae D. C.

## 174. Cornus Tourn.

357. C. sanguinea L. Laubwälber, zerstreut, g. B. G. Buich S. Grinewalbe Eb. M. Rothehorn!! Bieberiter Buich Eb. R.

Rrobnens Rub M. S. Br. Saglufer, nörblich von München - Rienburg!! Richt felten angepflangt.

\* C. alba L. Zierstrauch aus Nordamerita, häufig in Anlagen. \* C. mas L. In Mittelbeutschland einheimisch; zur Zierde und ber Friichte wegen gebflangt.

# 45. Familie. Loranthaceae Don.

#### 175. Viscum L.

358. V. album L. Auf verschiebenen Baumen ichmarotenb. felten (indeg mohl mehrfach überfeben). Brb. Friedrifenberg (Bappeln) S. G. Buidallee (Babbeln); Grunemalbe (Obftbaume) S.

# 46. Familie. Caprifoliaceae Juss.

#### 176. Adoxa L.

359. A. Moschatellina L. Schattige, feuchte Bebuiche, gerftreut. Brb. Poleimuble, links vom Bege nach Tochbeim S. C. Bilm Eb. M. Klusheibe T.! B. S. Bg. Bulfbagen K.! Grabauer Buich S. R. Unterholzer Berg E. !! R. Ronnenspring; Donnflebt in ben Bellenbergen M. S.! D. Branboleber Bolg S. Egeliche Forft S .

## 177. Sambúcus Tourn.

360. S. nigra L. Feuchte Gebifche, zerftreut, z. B. Brb. Todbeim S. G. Pretin S. Sier und ba gepflangt.

## 178. Viburnum L.

361. V. Opulus L. Wie vorige, häufiger, 3. B. G. Bufch S. Grunewalbe Eb. D. Bechauer Buich Bns. Bg. K. R. Schwarze Bfubl M. S. St. Ganfefurter Buich!!

\* V. Lantana L. Bierftrauch aus Mittelbeutschlanb.

#### 179. Lonicéra L.

362. L. Periclymenum L. Laubwalber, feuchte Bebiliche, gerftreut. Bg. Schermeniche Mühle K. Burgerholg: Behmerlate S. R. Erlenbruch bei Bathen!! R. Buttermintel!! Comarge Bfubl S. D. Brandsleber Holz S. Sauerholz bei Schermte Eb.
363. L. Xylosteum L. Bergige Laubwälber, felten. Hinter

bem Sagen E. R. Wellenberge bei Donnftebt S.

# 47. Familie. Rubiaceae D. C.

#### 180. Sherárdia Dillen.

364. S. arvensis L. Aeder, F, febr gemein, 3. B. M. Bei Budau!! Schnarsleben!! Dobendorf!! D und A nicht häufig. Bg. Blumenthalfche Wiefen K.! Rujel J. Müller. R. Fuchsberg M. S.

## 181. Aspérula L.

365. A. tinctoria L. Sonnige Sügel, Geftrauch, felten. G.

Frohseiche Berge Eb.! D. Beim Brandsleber Solg S.!

366. A. cynánchica L. Sonnige Hügel, Walds und Wegsränder, nicht selten. 3. Butterberg!! S. Kaine bei Gnadau Eb. Mühlinger Berge; Hummelsberg S. Frohsesche Berge!! Sohlsche Berge S. zwischen Pretin und Dornburg S.!! M. Zwischen Langensweddingen und Sülldorf!! Engelsberg; Wiesenberg bei Nieder-Dobeselben S. Gr. Wartberg bei Schnarsleben!! Heyvothsberge Eb. Klusheide!! Bg. Gradauer Forst; Gütter K.! Bürgerholz Dk. R. Bet der Eisenbahnstation E. zwischen Kammstedt und Schride!! N. Warrenberg! O Am Hatel S.

367. A. glauca (L.) Bess. Connige Abhange, nur F, gerftreut. C. hummelsberg S. Frohseiche Berge!! Cohliche Berge S. M. Fuchsberg und Rumpelsberg bei Conarsleben!! St. In einem Rain bei hedlingen am Wege nach Neundorf!! Berge nach Bornide

Bu Scht. Brn. Beinberge Sp.!!

368. A. odorata L. Schattige Balber, felten. Bg. Barenlate im Burgerholz Dk.! R. Unterholzer Berg E.!! R. Planten M. S.! Dönnsteht S. Oberförsterei Bijchofswalde bei Errleben M. S. Brandsleber holz S.

#### 182. Gálium L.

369. G. Cruciata (L.) Scop. Wiesen, Gebiliche, Wegränder, A, meist gemein, z. B. S. Busch!! Grünewalbe S. M. Berliner Chaussee!! Bechau!! Herrntrug!! Bg. Deichwall!! R. Am Fuß bes Unterholzer Berges!! Brn. Sp. F sparsam, z. B. D. Hatel!! D gar nicht.

370. G. tricorne With. Aeder, nur F, selten. D. Am Brandsleber Holz S. St. Rathmannsborf Bns. !! Hedlingen!! Brn.

Altenburg!! Ralbe Eb.

371. G. Aparine L. Aeder, Gebuiche, gemein.

372. G. uliginosum L. Fenchte Biefen, nicht felten, 3. B. G. Bullenwiefe S.

373. G. parisiense L. 3m Gebiet nur bie Abart b) anglicum Huds. (als Art). Aeder, besonders unter Cfparfette, felten aber febr gesellig. Rur F. C. Frohseiche Berge Eb.! M. Klingeberg bei Gillborf Bns. !! Brn. Chauffee nach Ct !!

374. G. palustre L. Wiesen, Sumpse, gemein. 375. G. boreale L. Laubwälber, trocine Wiesen, nicht selten. S. Friedhof; Frobseiche Berge; Frobseiche Wiefen Eb Bolfsteblenbuid ; vor Randau S. M. Rotheborn-Biefen Eb. Damm am Gubranbe bes Bieberiger Bufdes!! füblich von Germifd!! 28. Fareleben!! Ba. 3mifden Löbefühn und Deterebagen Dk. ! R. Dberhagen E. Rammftebt!! Batben T.! D. Branbsteber Sola: an ber Korftermiefe; am Satel S.

376. G. verum L. Connige Sigel, gemein.

377. G. Mollugo L. Trodne Biefen, Begranber, Laubmal-

ber, gemein.

378. G. silvaticum L. Schattige Laubwalber, gerftreut. Bg. Bulfbagen S. Burgerholz bei ber großen Buche S.!! R. Unterbagen!! Dberhagen!! Rammftebt!! R. Buttermintel!! Donnftebt S. Bagen M. S. D. Brandsleber Bolg S. Batel!! Egeliche Forft S.

# 48. Familie. Valerianaceae D. C.

## 183. Valeriana L.

379. V. officinalis L. Feuchte Wiefen, Geftrauch, febr ban-

Seltener in trodnen Balbern, 3. B. 3. Friebrichsholg!!

380. V. dioeca L. Feuchte Biefen, gerftreut. Brb. 3mi-ichen Balternienburg und Boleimuble S. G. Bregin; Mühlenbruch bei Gommern Eb. M. Biefen amifchen Meng und Bablit Bns. Bg. Hungriger Bolf; Schermen S. Rothe Mühle; Springberg K. R. Moosbruch M. S. Süpplingen S. D. Eggenfiebt S.

## 184. Valerianella Tourn.

381. V. olitoria (L.) Mnch. Meder, gemein. Geltener in Mauerriten, 3. B. M. Bor bem Arodenthor in ben Festungsmauern!!

382. V. dentata (L.) Poll. Bie vorige, baufig, 3. B. B. Gobnit S. G. Frobseiche Berge; Eggereborf; zwischen Pretin und Dornburg S. M. Zwifden Diesborf und Rieber Dobeleben Bus. Bg. Deichwall K. Schartau Dk.! zwischen St. und Brn. S.!!

383. V. Auricula D. C. Bie vorige, aber feltener. G. Salze; Felgeleben; Welsleben; zwijchen Pretin und Dornburg S. Bg. Blumenthal K. St. Hohen-Errleben Scht. norböftlich von Rathmanneborf!!

# 49. Familie. Dipsacaceae D. C.

## 185. Dipsacus Tourn.

384. D. silvester Mill. Abhänge, Begränder, Triften, bessonders F und M häufig. Brb. Zwischen Zeit und Kolphus!! Ronnei!! S. Am Welsleber Graben, Kapitelbusch Eb. Grünewalde!! Ranies! Randau S. M. Bieberitzer Busch!! Rothenses. B. Nach Samswegen bin!! Bg. Deichwall K. R. Schlofigarten! Unterholzer Berg!! R. Althalbensleber Burgwall M. S. D. Am Brandsleber Hoff F. Reinecke.

385. D. laciniatus L. Graben; felten. B. Bei ber Startefabrit einzeln 1858!! an ben beiben Wegen nach Samswegen unb bazwichen verlaufenben Graben mit D. silvester Mill. in Menge;! Am 23. Juni 1857 von F. Hartmann, H. Engel und mir entbedt,

. Erreigt bier feine Grenze nach Rorbmeften.

\* D. fullonum L. (ex p.) Rur bei Burg gebaut.

386. D. pilosus L. Schattige, feuchte Gebülche und Laubwälber, besonders At. Brb. Rosenburger Busch; zwischen Ronne; und Tochheim; Walternienburg S. S. Pretin gegenüber auf dem Elbwarder S. M. Elbbeich beim Pechauer Busch T.1 Biederitzer Busch Eb. R. Schlofigarten E.11 Unterholzer Berg!! D. Krottors im Mihlenholz; Brandsleber Holz Scht.

#### 186. Knaútia L.

387. K. arvensis (L) Coult. Biefen, Balber, Begranber, gemein

#### 187. Succisa M. & K.

38. S. pratensis Mnch. Biesen, Walbränber, nicht selten, Brb. Kalternienburg S. S. Zwijden Pretin und Dornburg; zwisschen Potth und Pilm S. M. Bei Richters Gasthof!! süblich von Gerwisd Bns. Bg. Niegripp S. R. Bathen!! R. M. S. D. Hartel S. St. Gänjesurt S.

## 188. Scabiósa L.

389. S. Columbaria L. Balber, nicht häufig. S. Zwiichen Plogth und Gommern S. Bg. K N. Benity!! Kolbiter heibe!!

D. Branisleber Solz unter ben Riefern S. Satel Eb.

b) och roleuca L, (als Art). Sonnige hügel, Wegränder, Rie mit ber hauptart. Fund A ziemlich gemein, z. B. S. Frohjesche Berge!! M. hauptwall!! Sternschanze!! Schnarsleben!! Rothe-horn!! C. Krottorf; hakel am Silbrand Scht. St. hedlingen!!

Hohen · Errleber Busch E. Brn. Sp. D seltener. 3. Tröfnit Brunn. Brb. Babezer Teichhaus!! S. Gommern; Leitstau; Dornburg Eb.! Loburg Eb. M. Jenseit Gerwisch an ber Chausee!! B. Nach Farsleben zu!! Bg. Zibbekleben K.! R. Nörblich von

ber Biegelei!! Baubube!! Rammftebter Forft!!

390. S. suavsolens Desk. Sonnige Higgel, Kiefernwälber, D und F, häufig mit Sc. Columbaria b) ochrolenca, seltener mit ber Hauptart. Brb. Friedrikenberg!! Tochheim!! Gödnith Eb. S. Hummelsberg; Frohseiche Berge; Gommern; Pretin; Dornburg S. M. Gr. Wartberg bei Schnarsleben!! beim Richterschen Gasthos!! Klusheibe!! R. Kienen bei der Eisenbahnstation!! St. Kan über hecklingen unweit des Weges nach Neundors!! R. Warenberg!! Benith!! Kolbitzer heibe!!

# 50. Famisie. Compósitae Adans.

## 189. Eupatórium Tourn.

391. E. cannabinum L. An Gräben und Bächen, nicht selten. Brb. Ronnei; Poleimühle S. S. Bullenwiese; an de: Ehle bei der Neuen Mühle unweit Gommern S. M. Klappermülle bei Königsborn Bns. Psuhlmühle bei Gerwisch!! Bg. Moltenbuch K. R. Bor dem Hagen S. N. Maschensteig M. S. St. Gänesurter Busch!! Rathmannsborf S.

# 190. Tussilágo Tourn.

392. T. Fárfara L. An Gräben, auf Lehmboben, bevnberk häusig, z. B. Brb. Steiles Elbufer bei Tochheim!! S. Jullen-wiele; Eggersborf S. M. An ver Schrode zwischen dem Ulricks- und Kröckenthor T.1. Schnarsleben!! Langenweddingen!! B. Lolbig!! Bg. Pietypuhler Mergestuhlen K. R. E. N. Schweinering; Hagen M. S. Selten auf Torferbe in Torsplichen. 3. Zwischen Auso und Itrichau!! B. Zwischen Samswegen und Lindhorst!!

#### 191. Petasites Tourn.

393. P. officinalis Mnch. An Gräben, Bachen, feugte Biesen, zerstreut. 3. An ber Nuthe westlich von ber Stabt!! S. Egs gersborf Eb.! M. An ber Schrobe zwischen bem Ulrichs- u. Kröckensthor T.! (hier nur die weibliche Pflanze.) Süllborf bei ler Thalsmühle S. Bahrenborf Eb. N. An b. Beber bei ber Damn-Mühle; Dönnstebt M. S. Al. Santersleben S. D. Bobe; Kirschengarten bei Reinborf F. Reinecke. (hier nach Scht. auch weiblich). St. Gänsefutter Busch!

394. P. tomentosus (Ehrk.) D. C. Weibengebiliche, jandige und grasige Stellen in der Rähe der Elbe und Bode, zerstreut. S. Kapitelbuich Eb. Todtenhäger dei Grünewalde Eb.! an der Elbe vor Randau; Ranies S. M. Kothehorn!! große Werder Eb. Elbuser siblich vom herrnfrug!! Bg. Elbstrand der Blumenthal K. R. Schwudsdorf E. An der Bode von Unseburg dis Hohen-Errseben Scht. besonders St. am Fabrisgarten Sp.! Erreicht hier seine Grenze nach Südwesten.

#### 192. Aster L.

395. A. Linósyris (L.) Bernh. Lichte Gebüsche in Laubwälbern, selten. R. Oberhagen E.!! D. Sauerbolz bei Ampfurt Scht.

395a. A. Amellus L. Wie vorige, febr felten. D. Boigt-

holz im Brandeleber Solz Scht.

396. A. Tripolium L. Salzhaltige, feuchte Wiesen und Gräben, verbreitet. S. Gr. Salze am Gradirwert!! am Soolkanal S. M. Sülldorf an ber Sülze (hier auch mit weißem Strahl); auf einer Wiese süböflich von Prester T.! D. Bulserstedt; zwischen Krotstorf und ber Wiesenmühle Scht. St. Nach löberburg!! und Rathmannsdorf zu!! Decklingen Scht.

397. A. salicifolius Scholler. Beibengebiliche ber Flussthäler, zerstreut. Im Gebiet sicher einheimisch. S. Busch; Grilnes walbe S. M. Rothehornspitze Bns.!! Berberspitze!! B. Herrenholz bei Glindenberg S. Bg. Rogätzer Fährstelle K. Bobethal: Tarthun, Unseburg bis St. Scht. Diese Pflanze ift innerhalb bes Gebiets bei

Brb. querft entbedt worben.

† A. parviflorus Nees. Zierpflanze aus Nordamerita. Bils berwildert und eingebürgert. B. Glindenberg im herrenholz E.!

## + Stenactis Cass.

† S. annua (L.) Nees. Stammt aus Norbamerita. Böllig eingebürgert: Brb. An ber Terrasse bes ehemaligen Schlosses Friedrikenberg!! S. Gnabau an ber Eisenbahn S.

## 192 a. Erígeron L.

† E. canadensis L. Seit Anfang bes 17ten Jahrhunberts aus Nordamerika eingewandert. Auf sandigen Aedern, an Begran-

bern, gemein.

398. E. acer L. Sonnige Hügel, Begränber, häufig, 3. B. S. Frohser Berge; Eisenbahngraben S. Chausse nach ber alten Fähre Eb. M. Sternschanze!! Sübrand bes Bieberitzer Busches Bns. Bg. K. N. Parförbe!!

#### 193. Bellis L.

399. B. perennis L. Biefen, Grasplätze, gemein. In Garten mit fogenannten gefüllten Blumen.

## 194. Solidágo L.

400. S. Virga aure a.L. Trodne Balber, zerstreut. 3. Friedrichsholz Eb. Bg. Bulfhagen K. R. Station; Hagen S. Rammsstebt!! N. Benity!! Althalbensleben M. S. D. Hakel: Oberlinden S. \* S. canadonsis L. Zierpflanze aus Rordamerika.

† S. longifolia Schrad. Zierpflanze, mahrscheinlich aus

Norbamerita. Bermilbert 23. Beim Babnhof S.!

## 195. Inula L.

401. I. germanica L. Abhänge, Gebüsche, Fehr selten. St. An bem subiden Graben bes tablen Grafeweges im Neundorfer

Relbe Roehl, Bns. !!

\* 402. I. salicina L. Wiesen, Gebiliche, zerstreut. Brb. Rosenburger Busch!! S. Wolfskehlenbusch; Kapitelbusch S. M. Sübrand des Biederiger Busches Bns. Bg. K. R. Angern E. D. Theilungen; hatel, besonders vorderer Schmerlenteich, Boß und Steinwegshau Scht. Brn. Große Aue Sp.

403. I. hirta L. Balber, fehr felten. St. Am Weftranbe bei

Tannenbuiches bei Soben-Errleben Eb.!

404. I. Conyza D. C. Abhänge, Gebiliche, sehr zerstreut. R. Unterholzer Berg E.!! D. Hatel: Domburgshau und vorderer Schmerlenteich S.

405. I. Britannica L. Biefen, besonbers in ber Rabe bet

Elbe, gemein.

#### 196. Pulicária Gaertn.

406. P. prostrata (Gil.) Aschs. Dorfstraßen, feuchte Triften in ber Nähe der Flüsse, häufig, 3. B. Brb. Kolphus!! Hährstelle!! S. Grünewalde S. M. An der Elbe süblich vom Herrnfrug!! nach Krafau hin!! Pechau!! vor Biederith!! Bg. Beim Bahnhof!! St. Rathmannsdorf Eb. Brn. Eb.

407. P. dysentérica (L.) Gaertn. Feuchte Gräben, zerstreut. S. M. Gräben bei Dobenborf Bns. oberhalb Süllborf an bei Sülze!! nörblich von Gerwisch mit Althaea!! B. Rach Samswegen hin!! Bg. K. N. Jenseit ber Ohre häufig!! Wedringen!! D. Krottorf am Amt Scht. St. Nathmannsborf am Amtsgarten!!

## † Galinsóga Ruiz u. Pavon.

† G. parvislora Cav. Stammt aus Sübamerika, seit Anfang bieses Jahrhunderts auf Aedern, an Wegen, in Gärten eingebürgert, besonders auf Sandboden. B. Domäne E.! Bg. Möser E.! Schermen!! Unter dem Hagen; Neuenzinn K. (In der Rähe des Gebietes, im Dorse Rielebock bei Genthin von F. Hartmann schen 1816 beobachtet.)

## 197. Bidens L.

408. B. tripartita L. An Gimpfen, Graben, gemein.

409. B. cernua L. Wie vorige, häufig.

b) radiata (Coreopsis Bidens L.) S. Zwischen Plöth und Prețin S.

c) minima L. (als Art). Brb. Babes S.

## 198. Filágo L.

410. F. germanica L. Aeder, Begränber, zerstreut. Brb. Kolphus!! S.; Frobse; Mühlinger und Frohsesche Berge S. M. Dobenbors!! Bechau Bus. Bg. K. R. Beim Forsthaus heinrichshorst!! Aeder nach Angern zu!! R. An ben Kienen bei ber Barte M. S.

411. F. arvensis L. Meder, häufig.

412. F. minima Fr. Canbige Neder, Schonungen, zerstreut. Brb. Babez!! S. Frohseiche Berge; Gommern; Dornburg'S. M. Engelsberg S. bei Richters Gasthof!! zwischen Bieberit und Gerwisch!! Bg. K. R. S. R. M. S.!

## 199. Gnaphálium Tourn.

413. G. silvatiaum L. Trodne Balber, zerftreut. S. Blötth; Pretin; Gommern; Dornburg S. Bg. K. R. Oberhagen!! zwijchen Rammftebt und Schride!! R. Benig M.S. Rolbiter heibe!! D. Brandsleber holz; Sauerholz bei Schermte; hatel Eb.

414. G. uliginosum L. Feuchte Triften, Cumpfranber, ge-

mein.

b) nudum Hoffm. (als Art). Cehr felten. M. Am Pechauer

Cee Bns.! in ben letten Jahren nicht wieber gefunden.

415. G. luteo-album L. Sumpfränder, feuchte Aeder, zersftreut. Brb. Zwischen Göbnit und Dornburg S. S. Schlofbruch bei Gommern Eb.! zwischen Pretin und Dornburg S. M. Königs-born T.! Bg. K. R. Steinort E.! Angern E.!

416. G. dioecum L. Trodne Walter und Hügel, häufig, 3. B. Brb. Friedrikenberg Eb. S. Sohliche Berge; zwischen Pretin und Dornburg S. M. Schnarsleben!! bei Richters Gasthof Eb. Bg. Sungriger Bolf!! R. Bei ber Gijenbahnstation!! Sagen!! R. Bein Detel; Erbte M. S. D. Brandsleber Golg bei ber Ziegelscheune &

## 200. Helichrysum Gaertn.

417. H. arenarium (L.) D. C. Trodne Bugel, Sanbfelba, Riefernwälber, febr baufig.

#### 201. Artemísia L.

† A. Absinthium L. Stammt aus Silb-Europa; in Dir fern u. s. w. verwilbert. S. Hummelsberg; Frohse S. Pretin S.!! Bg. Niegripp S. Detershagen K. beim Forsthaus Bürgerholg!! A. Rammstebt beim Forsthaus!! Mahlpfubl!! R. M. S.

418. A. rupestris L. Salzbaltige Triften, sehr selten, aber gesellig. Um St. und Hedlingen bis ins Brn. Moor Scht., besondert süblich von St. Bas.!! und häufig norböllich von Rathmannsborf am

Wege von St. nach Brn. Bns.!!

419. A. laciniata Willd. Bie vorige, aber viel feltener. St. Un ber Strafe nach Brn. norboftlich von Rathmanusborf Bna.!!

420. A. pontica L. Abhänge, Gebüsche, selten. M. An einem Balle nörblich von Gerwisch Bns.! seit 20 Jahren ausgerottet. S. In einem Graben nach Samswegen zu in ber Nähe von Dipsacus laciniatus 1858 T.!! St. Am süblichen Graben bes kahlen Graitweges im Neundorfer Felb (A. maritima bei Scht.) Roehl. Bns.!! Erreicht hier die Nordgrenze ihres Vorsommens.

† A. austriaca Jacq. In Suboft-Europa bis Böhmen ein heimijch. Bielleicht einmal burch Hochwasser berabgeschwemmt. An ber Ufermauer nörblich vom Jakobs-Förber seit 1853 von E. bemerkt!! Seit bem Branbe am 24. August 1857 verschwunden.

421. A. campestris L. Sonnige bugel, Aderranber, gemein 422. A. vulgaris L. Gebuiche, Baune, Begranber, gemein

#### 202. Achilléa L.

423. A. Ptarmica L. Wiesen, Graben, feuchte Gebiliche, 3tr. ftreut. Brb. An ber Saale bei Rosenburg; Tochheim; Poleimüble; Babez Eb. S. Bor bem Bulch; Elbwerber nach Ranies hin S. K. Große Werber Bns. beim Richterschen Gasthos!! Bg. Birtensteig K. M. S. D. Wusserbett Scht. Brandsleber Holz Eb. Hatel Scht. Egeln: Tarthun Scht.

424. A. Millefolium L. Sonnige Sügel, Beg- und Balbrander, gemein.

b) setacea W. K. (als Art). Sonnige Higel, selten. E. Mühlinger Berge Eb. Hummelsberg Bns.! Frohsesche Berge Eb. D. hinter ber Ziegelei Scht.

425. A. n'obilis L. Mauern, sonnige hügel, in F, fehr zersftreut. S. Gnabau an ber Eisenbahn nach Felgeleben hin Eb.! D. Emmersberg; Mauern in Gröningen Scht. Mauern in Kochstebt S. Brn. Stabtmauer Sp.! Erreicht hier ihre Grenze nach Norbosten.

## 203. Anthemis L.

426. A. tinctoria L. Begränder, sonnige Higel, Mauern, sehr zerstreut. Brb. Beim Babezer Teichhause!! zwischen Kämerit und Hoben-Lepte S. M. Rotheborn 1856!! Werberspite 1858 Bns.! Elbamm bei Rothensee Ahlenstiel! (An biesen brei Orten wohl nur angeschwemmt und nicht beständig.) D. Stabtmauer Scht. Hatel an der Domburg S. St. Stadtmauer Bns.!! Brn. Weinberge S. Steinbridge Sp.

427. A. arvensis L. Aeder, Begränder, nicht überall. S. Gifenbahngraben nach Gnabau; zwischen ben Frohseichen Bergen und Westerbijen S. M. Aeder beim Biederitger Busch Bns. Bg. K.

428. A. Cotula L. Dorfstraßen, Zäune, zerstreut. Z. Bor bem heibethor!! B. Walternienburg!! Gödnitg!! S. Am Stabtgrasben vor Salze!! zwischen Eggersborf und Gr. Mühlingen S. Plögth!! M. Schnarsleben!! B.!! Bg. Bor bem Magbeburger Thor!! Scharstau!! R. Dolle beim Posthause!!

## \* Anacyclus L.

\* A. officinarum Hayne. Rultivirt. Rur M. Auf ber Grauwadenformation !!

#### 204. Matricaria L.

429. M. Chamomilla L. Meder, fehr häufig.

## 205. Chrysanthemum L.

430. C. Leucanthemum L. Biesen, Balbranber, gemein. 431. C. Tanacetum Karsch. Begränber, Laubmälber, Tif-

ten, besonbers in ber Rabe ber Elbe, gemein.

432. C. corymbosum L. Bergige Laubwälber, sehr zersftreut. M. Bereinzelt angeschwennnt in ben Beiben am großen Bersber 1858 Eb. R. Wellenberge bei Dönnstebt M. S.! D. Brandssteber Holz S. Hatel, sehr häufig!!

† C. Parthenium (L.) Pers. Stammt aus Sub-Europa, früher als Arzneipflanze gebaut. Berwilbert S. Gnabau am Bahnhof 1855!! M. An ber Mittel-Elbe unweit ber Citabelle 1853!!

433. C. inodorum L. Begranber, Meder, febr baufig.

434. C. segetum L. Lehmige und sandig-fehmige Aeder, febr gerftreut. M. Elbufer auf bem Werber, vereinzelt 1855 T.! R. Bei

Sanbbeindorf E. R. Warenberg; Papenberg M. S. Bellenberge bei Dönnstebt M. S.! D. Zwijchen Alt-Brandsleben und Eggenstedt S. Reindorf Scht.

## 206. Árnica L.

435. A. montana L. Balbränber, etwas moorige Bieien, serftreut. R. Moosbruch M. S.! Erble M. S. Schwarze Psichl E.! D. Hohes hinterholz im Brandsleber Holz Scht.

## 207. Senécio L.

436. S. paluster (L) D. C. Moorwiesen, Torfstiche, zerstrent. 3. Zwischen Luso und Aitricau!! B. Zwischen Samswegen und Lindhorst!! Bg. Güttersches Molkenbruch K. Resen S.! R. Moorwiese am hagen, selten E. D. Krottorf; Horborf; Gr. Alsleben Sch. St. Scht.

437. S. vulgaris L. Aeder, Gartenland, febr gemein.

438. S. viscosus L. Wege, Waldrander, häufig.

439. S. silvatious L. Trodne Balber, zerftreut. Brb. 3mifchen Tochheim und Poleimuhle S. S. 3wifchen Pregin und Dornburg S.II M. 3wifchen Bieberit und Gerwifch Bas.II Bg. K.

440. S. erucaefolius L. Gebuiche, Wiesen, an Graben, zerstreut. S. Buich S. Döben Eb.! B. An ben Wegen nach Samswegen!! Bg. An ber Chausse nörblich von Schermen auf ber Besteite!! R. Unterholzer Berg S. D. Espen bei Horborf; im Schissgrabenbruch vor ben Stegen; Meierweiben bei Habmersleben Scht. Et. Zwischen Reundorf und Rathmannsborf!! an ber Straße nach Brn. norböstlich von Rathmannsborf!!

441. S. Jacobaea L. Sonnige Higel, Balber, fehr häufig. 442. S. aquatious Huds. Wiefen, nur A, bort aber wahrscheinlich verbreitet. S. Busch S. Wiefen nach Zadmünde zu; Frohle bei der Eisenbahnbrücke Eb. Grünewalde an der Chaussen nach Plögty!! Kreuzhorst Eb. M. Reben der Berliner Chausse!! An der Elbe siblich vom herrnfrug!! Bg. Gilfen östlich von der Eisenbahn!! R. Rördlich von Bäthen!! zwischen Tangerblitte und Birtholz E.!

443. S. Fuch sil Gmol. Laubwälber, zerstreut. 3. Friedrichsholz!! B. Rojenburger Busch S. S. Scharleber Holz bei Dornburg S.!! Bg. Bürgerholz K. R. Beim Oberhagen E.!! Unterhagen E.!! Ammustebt!! D. Brandsleber Holz am Königsberg Scht. hatel!! Egeln: Zwischen Tarthun und Unseburg Scht. St. Gansefurter Busch S.!:

444. S. sarracenicus L. In ber Rube ber Fliffe, beforbers in Beibengebuichen, gerftreut. Brb. Tochheimer Buich E. G.

Busch S. an ber Elbe jenseit Elbenau Eb. Grünewalbe am Damm nach Ranies Eb.!! M. Rothehorn-Spige!! B. Herrenholz bei Glinbentberg E.! O. Bobe-Insel unterhalb Horborf; Theilungen Scht. Brn. Dröbelsche Busch Sp.! Die Pstanze steht öster in Gesellschaft von Aster salicisolius Schollet.

445. S. paludosus L. Sumpfwiesen, Gebüsche, an Gräben, mur A, zerstreut Brb. An ber Nuthe bei Balternienburg Eb. S. Busch!! Kreuzhorst!! Bg. Heibhau im Bürgerholz K.1 Gusen!! D. spärlich an ben Bruch- und Eisenbahngraben Sche. St. hedlingen Eb.

#### \* Caléndula L.

\* C. officinalis L. Baufige Zierpflanze aus Gub-Europa.

## 208. Círsium Tourn.

446. C. lanceolatum (L.) Scop. Begrander, Triften, Dor-

fer, gemein.

447. C. eriophorum (L.) Scop. Sonnige Hügel, nur F, selten. D. Am Brandsleber Holz S.1 Erreicht hier seine Grenze nach Norbosten.

448. C. palustre (L.) Scop. Sumpfige Wiesen, häufig, 3. B. S. Bullenwiese; zwischen Plötzty und Pilm; zwischen Pretzin und Dornburg S. M. Psuhsmühle bei Gerwisch S. Bg. K. R. Weh-lit!! D. Zwischen Pesetenbors und Schermte Eb.

449. C. acaule (L.) All. Sonnige Sügel, trodne Biesen, zerstreut. Brb. Babez!! S. Döben; Gr. Mühlingen; Eggersborf! Frohseiche Berge S. M. Schnarsleben S. Krafauer Anger!! Bg.

Springberg K. R. Angern E.!

450. C. anglicum (Lmk.) Koch erweitert. Trocine, fruchtbare Wiesen, sehr zerstreut. Bg. Nörblich von Schermen an der Chaussee Dk.!! zwischen Löbekühn und Detershagen Dk.! R. Behlitz am Nande des Unterhagen Bus.!! im Holz!! zwischen Angern und dem Buckum S. D. Schiffgraben unterhald Bulferstedt; Pfarrwiese bei Alein-Oschersteben Scht. Egeln! zwischen Tarthun und dem Unseburger Hölzchen Scht. St. An der Bestieite des Gänsesurer Bulches Scht. Nathmannsborf Sp.! Erreicht hier sein nordöstlichstes Vortommen.

451. C. oleraceum (L.) Scop. Feuchte Wiesen und Gebuiche, ziemlich häufig. 3. Ankuhn!! Schloftgarten!! Brb. Poleimühle S. M. Subenburg; an ber Schrobe zwijchen Diesborf und Nieber-Dobeleben S. Bg. Schermen!! R. Unterhagen!! Schrickel! N. Webringen S. nach Bulftringen zu!! Förberstebt Eb. St. Ganse-

furter Buich S.!! Brn. Nienburg Eb. Kalbe S.

452. C. arvense (L.) Scop. Aeder gemein. 450 × 451. C. anglicum × oleraceum. St. Westseite bes Gansesurter Busches Scht.

## † Silybum Gaertn.

† Marianum (L.) Gaertn. Zierpflanze aus Gub-Europa. Ber wilbert S. Kirchhof zu Gr. Calze S. Frobje Eb. Bg. K.

#### 209. Cárduus L.

453. C. acanthoides L. Begranber, Abhange, F und A

454. C. crispus L. Gebufche, Baune, baufig.

455. C. nutans L. Sonnige Gugel, Begranber, febr baufig.

## 210. Onopordon Vaillant.

456. O. Acanthium L. Wegranber, Baune, fehr baufig.

## 211. Lappa Tourn.

457. L. officinalis All. Balber, Begranber, febr gerftreut.

D. Rothehorn!! Bieberiter Bufch!!

L. macrosperma Wallr. Laubwälber. (Nahe ber norbweftlichen Grenze bes Gebiets: Kalvörbe nörblich von ber Ohre beim Grabenmeister nordwestlich von Mannhausen!!) Bahrscheinlich auch im Gebiete.

458. L. glabra Lmk. (ex p.) Wegränder, Zäune, gemein. 459. L. tomentosa Lmk. Wegränder, Dorfstraßen, Waldsründer, jehr häufig.

#### 212. Carlina Tourn.

460. C. vulgaris L. Trodne Wälber und Higel, D und F nicht selten. S. Frohsesche, Sohliche, Besterhüsensche Berge S. M. Wiesenberg bei Nieber-Dobeleben S. Sillborf Eb. Bg. Springberg K. N. Lehmtuhle beim Galgenberg M. S. O. Brandsleber Polz; Hatel S. St. Hohen-Errleber Busch E. Brn. Eb.

#### 213. Serrátula L.

461. S. tinctoria L. Wiesen, Laubwälber, zerstreut. 3. Friedrichsholz!! S. Busch S. Frohser Wiesen Eb. Ranbauer Wiesen S. M. Am Bieberitzer Busch!! Bg. K. R. Bathen!! D. Hatel S.

#### 214. Jurinea Cass.

462. J. monoclonos (L.) Aschs. Durre, sanbige Sugel, febr gerstreut. Brb. Auf ber Anbibe füblich von Tochheim! Sugel,

nörblich von Göbnit S.!! (An beiben Stanborten schon im vorigen Jahrhunbert von Scholler gesunden.) S. Zwischen Plötzty und Pretin S. zwischen Plötzty und bem Bilm Eb.! R. Jüdischer Begräbnifplatzt! am Fuße bes Trenbelberges M. S.!

#### 215. Centauréa L.

463. C. Jacea L. Biefen, Begranber, gemein.

464. C. phrygia L. Schattige Laubwälber, felten. 3. Frie brichsholg!! R. Sagen; Bernit E., M. S.! D. Satel, Oberlinden S.

465. C. Cyanus L. Rornfelber, gemein.

466. C. Scabiosa L. Trodne, sonnige hügel und Wälber, in F und D zerstreut. S. Warts und Teuselsklichenberg bei Zens Eb. Hummelsberg; Frohseiche und Sohliche Berge S. M. Sillborf Eb. Engelsberg S. Bg. K. R. Wellenberge M. S.! Brn. Sp.

467. C. maculosa Lmk. Sonnige hügel, Wegränder, Mauern, häufig, 3. B. 3. Wall beim heibethor!! S. Gr. Salze auf Mauern; Frohjesche Berge; Wart- und Teufelsküchenberg bei Zens Eb. M. Chausse zwischen Fermersleben u. Salbke!! Dobenborf; Sillborf Bns. N. Bor bem Stendaler Thor!! D. Stadtmauer Scht. St. Stadtmauer Scht. Hohen-Ergleber Busch E. Brn. Kalkberge!!

468. O Calcitrapa L. Begranber, nur F, gerftreut. Brb. Beit!! Kolphus!! G. Bei Galge febr häufig!! D. Im Reufiabter Felbe!! Gullborf!! Chauffee gwijchen Fermersleben und Galbte!! St.

gemein!! Brn. ebenjo Sp.

† C. solstitialis L. Stammt aus Gub-Europa. Auf frisch angelegten Luzernestiicken zuweilen erscheinenb, boch nie beständig. Kalbe bei ber Eisenbahnstation Gritzehne 1856 Eb.

#### + Xeranthemum Tourn.

† X. annum L. Bierpflange aus bem füboftlichen Deutsch. tanb, verwilbert G. Friebhof S.

## 216. Lámpsana Tourn:

469. L. communis L. Gebüsche, Laubwälber, gemein.

## 217. Arnóseris Gaertn.

470. A. minima (L.) E. Meyer. Sandige Acder, zerstreut, 3. Eichholz!! Brb. Babez!! S. Nandau Eb. Pretin; Gommern; Dornburg S. M. Klus Eb. Bg. Zibbelleben K.! Gilfen Bns.!! R. E. R. Fuchsberg bei Neuenhofe!!

## 218. Cichórium Tourn.

471. C. Intubus L. Wegränber, gemein. Auch baufig bei D. gebaut.

#### 219. Thrincia Roth.

472. T. hirta Roth. Moorige, besonders salzhaltige Wielen und Triften, zerstreut. S. Kapitelbusch Eb. Am Gradirwerk bei Er. Salze!! am Soolkanal; Frohsesche Berge S. Frohser Wielen Eb. Grünewalde S. M. Dodendorf am Wege nach Osterweddingen!! Nothehorn Eb. Bg. Beim Hungrigen Wols!! Gusen bei der Eisenbahnstation!! N. Parförde!! vor d. Erde; am Wege nach dem Hagen M. S. O. Günthersdorf Scht. Brn. Aue Sp.

## 220. Leóntodon L.

473. L. auctumnalis L. Balber, Gebufde, baufig.

474. L. hastilis L. Trodne Biefen, Abbange, Balber, nicht selten, 3. B. Brb. Göbnit S. S. Grabirwert bei Gr. Salze; Zens; Frohseiche Berge; Ranban S. Bg. K. N. Bns.

#### 221. Picris L.

475. P. hieracioides L. Gebilfche, Gräben, Wegränder, nicht selten. Brb. Saalbamm bei Gr. Rosenburg nach Gritzehne zu Eb. Kapitelbusch Eb. S. Döben; Eggersdorf; Bullenwiese S. Neue Mihste bei Gommern Eb. M Sternschause!! Diesdorf S. Dobenborf!! Chausse nirblich von Gerwisch!! B. Am mittleren Wege nach Samswegen!! Bg. Birkensteig K. N. Am Wege nach dem Kömerschen Bierkeller!! D. Bruch am mittleren Graben Scht. Brandsteber Holz Eb. St. Scht. Brn. Weinberge S.!!

#### † Helminthia Juss.

† H. echioides (L.) Gaertn. Auf frisch angelegten Luzerneftiiden zuweilen erscheinenb, aber unbeständig. Stammt aus Gub-Europa. M. Elbbamm bei Rothensee Peck 1844! Zwischen D. und Gr. Alsleben Scht.

## 222. Tragopógon L.

476. T. major Joq. Sonnige Higel, Wegränder, gerstreut. S. Eisenbahngraben; Steinbrilche bei Alten Salze S. Damm bei ber Zwangsarbeitanstalt Eb. Westerhüsen!! M. Sillborf Bns. Bg. K. N. Sibischer Begräbnifplat; Warenberg M. S. D. An der Eisenbahn zwischen Rienhagen und Krottorf Scht. St. Hedlinger Kirchhof Eb. Brn. Weinberge S.

477. T. pratensis L. Biefen, gemein.

b) orientalis Joq. Wegrander, Wiesen, zerstreut. Brb. Wiese zwischen Gruneberg und Dornburg S. S. Frohselche Berge S. Dt. Sternschanze!! Chaussegraben nörblich von Gerwisch!! Bg. K.

#### 223. Scorzonéra L.

478. S. humilis L. Riefernwälber, fehr gerftreut. D. Riusbeibe Bns. Bg. Burgerholg füblich ber Eifenbahn, wo fie ben Krielichen Weg jum erften Mal treuzt Dk. !

479. S. hispanica L. Balber, Gebuiche, nur &, febr fel-

ten. St. Rathmannsborf Garcke.

480. S. purpurea L. Sonnige Hügel, trodne Balber, sehr zerstreut. S. Frohseiche Berge S. Bg. Grabauer Forst am Steg-liter Beg Dk.! R. haserberg bei Nammstedt E.! D. Emmersberg Scht. St. Scht.

## 224. Podospermum D. C.

481. P. laciniatum (L.) D. C. Steinige Higgl, Wegränder, nur F ziemlich verbreitet. S. Neben der Ahmannschen Holzstrede S. Gradirwert bei Gr. Salze Sübosseite!! Wall des Sooflanals S. W. Friedrich-Wilhelms-Garten T.! Langenweddingen!! in Sülsdorf!! lahler Wiesense bei Nieder-Dodeleben S. D. Süblicher Kirchhofsgraben Scht. St. Am Wege nach Löderburg!! Hecklingen!! Löderburg Scht. Brn. München-Nienburg Sp.! Kalbe Sp.

## 225. Hypochoeris L.

482. H. glabra L. Sanbige Aeder, oft mit Arnoseris minima E. Mey., zerstreut. 3. Bor Eichholz!! Brb. Babez!! S. Pretin; Gommern; Dornburg S. M. Bei Richters Gasthof!! B. Kolbit!! Bg. K. R.!! R. Neuenhose!!

483. H. radicata L. Grafige Abhange, Balber, häufig.

## 226. Achyróphorus Scop

484. A. maculatus (L.) Scop. Abhange, trodne Wiesen. sehr gerftreut. Bg. Abhang bei ben Chausse-Rienen Dk. !! D. Emmereberg selten Eb. St. Ochsenberg bei hedlingen einzeln Soht.

#### 227. Taráxacum Juss.

485. T. officinale Wigg. Biefen, Balbranber, Bege, bochft gemein.

#### 228. Chondrilla Tourn.

486. C. juncea L. Sanbige Higel, Balber, zerstreut. Brt. Friedrikenberg E. Gödnitz S. S. Frohseiche Berge; Plötty bis Dornburg S. M. Gerwisch!! B. Lindhorst!! Bg. Kirchhof K. K. Englischer Berg E.!! R. Bor dem Stendaler Thor!! D. Emmersberg Scht.

#### 229. Lactúca L.

\* L. sativa L. lleberall in Gemifegarten.

487. L. Scariola L. Wegränder, Abhänge, Mauern, zerstreut. S. Eisenbahngraben nach Besterhüsen zu S. M. Sillborf Bns. Bertiner Chaussee!! Heprothsberge Eb. Bg. Weg nach Blumenthal K. R. Unterholzer Berg S. D. Krottorf an ber Eisenbahn; mittlerer Bruchgraben Scht. Brn. Am Fuse ber Kalfberge!!

488. L. saligna L. Wegrunder, Ufer, Graben, felten. Et. Am Bege nach Neundorf Garcke. Br. An ber Bobe bei München-

Nienburg Sp.! Erreicht bier ihre nörbliche Grenge.

489. L. quercina L. Schattige Laubwälber, sehr zerstreut. Brb. Rosenburger Busch am Ausgange nach Gr. Rosenburg Eb.! D. Hatel an der Domburg S. Egeln: zwischen Tarthun und Unseburg Scht. St. Gänsesurter Busch S.!! Rathmannsdorf im Park E.! Erreicht hier ihre Nordgrenze.

490. L. muralis (L.) Less. Schattige Laubwälber, gerstreut. 3. Friedrichsholz!! S. Westlich von Dornburg S. Bg. Bürgerholz:

Behmer Late K.! R. Rammftebt S. D. Satel Eb.

#### 230. Sonchus L.

491. S. oleraceus L. Gartenland, Baune, Begranber, ge-

492. S. asper Vill. Wiesen, Aeder, Wegranber, häufig.

493, S. arvensis L. Wiesen, Graben, seuchte Aeder, gemein. 494. S. paluster L. An Bachen, Graben, selten. D. Espen bei Horborf schwindend Scht. St. Gansesurter Busch Scht. Graben bes Parks bei Rathmannsborf Bns.!!

## 231. Crepis L.

495. C. foetida L. Begranber, fleinige Bilgel, nur F, fel-

ten. Brn. In ben Beinbergen an einer Stelle viel Bus. !!

496. C. praemorsa (L.) Tausch. Bergwälber, felten. D. Gatel, besonders Steinweg im Binnigschen Privatholz und Mittelhan unweit bes Kochstebter Beges Scht.

497. C. biennis L. Beg- und Balbranber, Biefen, banfig,

3. B. J. Luso!! S. Döben; Zens; Kirchhof zu Gr. Salze; Kapitelbusch; Bullenwiese S. M. Sternschange!! Dobenbors!! An ber Berliner Chaussee!! B. Chaussee nach Kolbits!! Bg. K. R. E. !! R.
Gr. Ammensseben!!

498. C. virens Vill. Biesen, grafige Begränder, gerstreut. S. Soolfanal S. Grunewalbe am Damm nach Ranies!! Biesen vor

Ranbau S. Bg. K.

499. C. paludosa (L.) Mnch. Feuchte Wiesen, Walbbache und Sümpse, zerstreut. 3. Butterdamm!! zwischen Luso und Jütrichau!! Brb. Poleimühle Eb. zwischen Gödnitz und Dornburg S. S. Zwischen Pretzin und Dornburg S. Bg. Bürgerholz beim Forstphause K. R. unterhagen S. Rammstedt!! Erlenbruch bei Bäthen!! St. Hecklingen Scht.

500. C. succisaefolia (All.) Tausch. Balbwiefen, felten.

Ct. Ganjefurt; Bedlingen Scht.

## 232. Hieracium Tourn.

501. H. Pilosella L. Trodne Bugel, Bulber, Biefen, ge-

502. H. Auricula L. Feuchte Biefen, gerftreut. 3. Biltrischau!! S. Grünewalbe S. M. Un ber Gijenbahn zwijchen ber Berliner Chaussee und bem Bieberiter Busch!! Bg. Zwischen Löbekühn und Detershagen K. Burgerholz S. R. Beim schwarzen Bfuhl M. S.!

503. H. praealtum Vill. Trodne Sugel, felten. Brn. Bein-

berge Garcke.

b) fallax D. C. (als Art). Brb. Stadtmauer nach ber Elbe

hin S.!

c) hirsutum Koch. D. Glacis ber Sternschange!! St. Ratbstalfbitte Bns.!!

504. H. murorum L. Bälber, zerstreut. S. Bor Dornburg S. Neue Mühle Eb. Bg. K. Rammstedt S. N. Dönnstedt Eb. D. Brandsleber Holz Eb.

505. H. vulgatum Fr. Balber, Mauern, gerftreut. M.

Festungemauern S.

506. H. boreale Fr. Wälber, zerstreut. Brb. Zwischen Walsternienburg und Poleimühle S. S. Grünewalbe S. R. Rammstebt!! D. Brandsleber Holz; Hakel Eb.

507. H. rigidum Hartm. Balber, Gebuiche, febr gerftreut. 3. Friedrichsholg!; G. Scharleber Golg bei Dornburg!! Bru. Bein-

Berge !!

b) tridentatum Fr. M. Glacis ber Sternichange T. 1 508. H. umbellatum L. Begrunber, Gebuiche, haufig, 3. B.

Brb. Zwischen Walternienburg u. Poleimilble S. R. Frohsesche Berge; Ranbau S. M. Beim herrntrug!! Bg. Birkensteig K.

501 x 503. Pilosella x praealtum. Dt. Glacis ber Stem-

fcange!! St. Bei ber Rathstalthutte Bns.!

## 51. Familie. Ambrosiaceae Lk.

#### 233. Xánthium Tourn.

509. A. strumarium L. Zäune, Dorfftragen, zerstreut. Brt. Zwischen Ronnei und Walternienburg!! S. Grünewalbe!! Dr. Gerwisch bei ber Kirche!! Bg. Schartau!! R.!! N. Freischütz M.S.

St. Banfefurt und an ber Bobe abwarts bis St. Scht.

510. X. itálicum Moretti. Beibengebiliche, Wegränder, Dämme, in der Nähe der Elbe nicht selten. Brb. Tochheim E. zwischen Konnei und Walternienburg!! nörblich von Gödnig S. S. Bor dem Busch!! Grünewalde!! Elbufer bei Frohse S. M. Unterhald Salbte Prof. A. Braun. Rothehorn-Spite!! siblich vom Herrnfrug!! Bg. K.! R. Schmucksdorf E. Steinort!!

† X. spinosum L. Stammt aus Gub. Europa. Mit frember Bolle eingeführt, aber unbeständig. Bg. Gartengaune im Beften

ber Stabt K.

509 x 510. X. strumarium x italicum. R. Steinort!!

## 52. Familie. Campanulaceae Juss.

## 234. Jasióne L.

511. J. montana L. Trodite Bilgel, Balber, gemein.

## 235. Phyteuma L.

512. P. orbiculare L. Trodne Biefen, felten. St. Bed.

lingen Scht.

513. P. spicatum L. Schattige Laubwälber, sehr zerstrent. Bg. Wulfhagen S. R. Erlenbruch nörblich von Bäthen E.!! R. Wellenberge bei Dönnstebt M. S. D. Brandsleber Holz; Sauerholz bei Schermke Eb. Hakel S.

b) nigrum Schmidt (ale Art). Balbwiefen, felten. R

Sagen M. S. ! Donnftebt S.

## 236. Campánula L.

514. C. rotundifolia L. Trodne Balber, fehr häufig.

515. C. bononiensis L. Gebuiche, Balbranber, fehr felten.

D. Branbeleber Bolg Scht.

516. C. rapunculoides L. Gebüsche, Higel, Wegründer, zerstreut. S. Frohseiche Berge S. M. Dobenborf B. Kalkbrüche bei Sillborf!! R. Unterholzer Berg!! N. Benity M. S. Egeliche Forst S. St. An einem Rain bei hecklingen am Wege nach Neundorf!! tahler Graseweg bei Neundorf!!

517. C. Trachelium L. Schattige Laubwälber, Gebiliche, zerstreut. Brb. Rosenburger Busch S. Tochheimer Busch!! S. Friedshof; Busch S. M. Pechauer Busch Brs. Biederitzer Busch!! Bg. K. R. Oberhagen!! Rammstedt!! Erlentuch nörblich von Läthen!! R. Benitz M. S. Wellenberge bei Dönnstedt M. S.! D. Brandsleber Polz Eb. Hatel S. Egelsche Forst S.

518. C. patula L. Wiesen, Balbränder, nicht selten, z. B.

518. C. patula L. Biefen, Balbranber, nicht felten, 3. B. J. Friedrichsholz Eb. Elbwiefen Eb. M. Rothehorn-Biefen!! R.

Benity M. S. D. Sorborf; Brandeleber Solg Scht.

519. C. persicifolia L. Trodne Wälber, Higel, sehr zerestreut. 3. Friedrichsholz!! Brb. Tochheim Eb. S. Frohseiche Berge, selten S. Bg. Gittersche Berge, selten K. R. Rammfiedt S. R. Benity M. S. Rolbiger heibe!! D. Brandsleber holz Eb. haetel S.

. 520. C. glomerata L. Gebüsche, trodne Higel, zerstreut. 3. Friedrichsholz!! Brb. Badezer Teichaus!! S. Frohsesche Berge; Grünewalde S. W. Schnarsleben S. Alingeberg bei Sillborf!! R. Oberhagen E.!! Nammsted!! N. Warenberg; Hagen M. S.! Altshaseber Burgwall M. S.! Egeln: zwischen Tarthun und Unseburg Scht. St. An einem Rain über Pecklingen am Wege nach Reundors!!

## † Speculária Heister.

† S. Speculum (L.) D. C. fil. Zierpflanze aus Mittelbeutschland. Berwilbert S. Friedhof S.

# 53. Familie. Siphonandrae Klotzsch.

## 237. Vaccinium L.

521. V. Myrtillus L. Trodne, schattige Balber, zerstreut, S. Schlofbruch bei Gommern Eb. M. Alusheibe S. Bg Zwischen Mabel und Forsthaus Grabow K. R. Schwarzer Psuhl S. Bornftrug M. S. D. Brandsleber Holz nach Bedenborf zu S.

522. V. uliginosum L. Feuchte Balber, fehr felten. An

ber weftlichen Grenze bes Gebiets bei Gr. Bartensleben unweit Belmftebt A. Muller.

523. V. Vitis Idaea L. Rabelmalber, fehr felten. D. Brands

leber Bolg am Bedersberg Scht.

524. V. Oxycoccus L.1 Torffilmpfe, selten. 3. Butterdamm Rosenbaum!! Bg Springberg K.! N. Moosbruch M. S. Schwarze Pfuhl E.! An ber westlichen Grenze bei Gr. Bartensleben A. Müller.

## 54. Familie. Ericaceae Klotzsch.

## 238. Callúna Salisburg.

525. C. vulgaris (L.) Salisburg. Trodne Balber und Bagel, gemein.

#### 239. Erica L.

526. E. Tetrálix L. Moorboben an Simpfen, sehr zerstreut. Bg. Springberg K.! R. Zwijchen Birtholz und Tangerhütte E.! (Außerhalb ber Grenze am Fuße bes Landsbergs nach Schernebed hin E.!) R. Schwarze Pfuhl E.!

# 55. Familie. Hypopityaceae Klotzsch. 240. Pírola L.

527. P. rotundifolia L. Schattige Balber, felten. R. Res-

perbuich E.1

528. P. chlorantha Sw. Wie vorige. R. Kesperbusch E.!!
529. P. minor L. Wie vorige, zerstreut. Brb. Friedrikenberg
Dr. Mohs! S. Streitheibe bei Gommern S. Bg. Bürgerholz nordwestlich vom Exercierplat S. R. Kesperbusch!! R. Schweinering
im Oberholz M. S.!

530. P. uniflora L. An Balbfumpfen, felten. Dt. Beim

Forfthaus Alte Rlus E.!

## 241. Ramíschia Opiz.

531. R. secunda (L.) Gke. Schattige Wälber, sehr zerstreut. Bg. Bürgerholz nordwestlich vom Exercierplatz S. R. Bei ber Eisenbahnstation E. O. Brandsleber Holz S.

## 242. Monótropa L.

532. M. Hypopitys L. Schattige Balber, gerftreut. S. Reue Mible bei Sommern S. Bg. Grabauer Forst gwijchen Mabel und

bem Forsthause K. R. Rammstebt S. R. Zernit M. S.!] Egeln: Hölzchen bei Unjeburg Scht.

# 56. Familie. Aquifoliaceae D. C. 243. Ilex L.

533. I. Aquifolium L. Balber, fehr selten. Rur an ber weftlichen Grenze bes Gebiets bei Gr. Bartensleben A. Muller! (Bon E. mitgetheilt).

## 57. Familie. Oleaceae Lindl.

## 244. Ligustrum Tourn.

534. L. vulgare L. Balber, nicht häufig. S. Bolfskehlenbuich; Kapitelbuich S. D. hatel S. Säufig zu Beden angepflanzt.

## \* Syringa L.

- \* S. vulgaris L. Baufiger Bierftrauch aus Borberafien.
- \* S. chinensis L. Desgleichen.
- \* S. persica L. Desgleichen.

## 245. Fráxinus Tourn.

535. F. excélsior L. Balber, felten. S. Bujch!! Bg. Burgerholz K. Saufig angepflanzt.

## 58. Familie. Asclepiadaceae R. Br.

## 246. Vincetóxicum Mnch.

536. V. album (Gil.) Aschs. Balber, Gebüsche, Abhänge, zerstreut. S. Bolfstehlenbusch; Kapitelbusch S. R. Unterholzer Berg!! Oberhagen E.! R. Kolbitger Beibe süblich von Planten!! Bellenberge bei Dönnstebt S. D. Domburg im Hatel!!

# Familie Apocynaceae R. Br.

#### + Vinca L.

† V. minor L. 3m Gebiete noch nicht wilb gefunden, fon-Dern nur häufige Bierpflange. Berwilbert G. Friebhof S.

## 59. Familie. Gentianaceae Juss.

## 247. Menyanthes L.

537. M. trifoliata L. Sümpse, an Gräben, zerstreut. 3. Butterbamm S. Brb. Zwischen Walternienburg und Poleimühle; zwischen Poleimühle und Babez S. Zwischen Gödnitz und Dornburg!! S. Bei der Pretziner Mühle S. W. Teich bei Samsnegen und bis Lindborst!! Bg. Nördlich von Schermen S. bei der Kraule-Mühle K. N. Moosbruch; Erbte; Krohnens Ruh; Dönnstedt M.S. D. Goldbach bei Neu-Brandsleben Scht.

#### 248. Gentiána L.

538. G. Pneumonanthe L. Moorwiesen, zerstreut. Brt. Babez!! M. Gublich von Gerwisch E.! Bg. Hungriger Bolf E.! R. Zwischen bem Buchum und Wendoorf E.! Bathen!! zwischen Birtbolz und Tangerhutte E.! Schernebeck E.! R. Erbte M. S.! D. Sanneföhr; im Brehme; Hadmersleben, öfilich von ben Meire weiden und zwischen biesen und ben Espen sulich ber Gunthersborfer Feldmark Scht.

539. G. campostris L. Trodne hügel, heibeboben, 3th. streut. M. Bartberg bei Schnarsleben E.1 R. heibberg bei Angern E.11 D. An ber süblichen Seite bes Brandsleber Holzes S.

540. G. germanica Willd. Connige Hilgel, nur F, sehr zerstreut. S. Frohsesche Berge S. M. Gr. Bartberg bei Schnardleben T.! D. Golbbachthal im Brandsleber Holz F. Reinecke! am Hatel S.

541. G. Amarella L. Trodne Biefen, fehr gerftreut. 3. Butterbamm S. R. Zwischen Angern und bem Budtum E.1

542. G. ciliata L. Sonnige Bugel, Gebuiche, nur F, felten. D. Brandsleber Bolg Bns. ! Datel, iparlich S.

## 249. Erythraea Renealm.

543. E. Contaurium (L.) Pors. Wiesen, Gebuiche, feucht Balber, häufig, 3. B. S. Frohjesche Berge; Grunewalbe S. Kreufborft Bns. D. Pechau Bns. Bg. Deichwall K. R. Benit; Badosfenberg; Schweinering; Althalbensleber Ziegelei M. S. D. Brandsteber Dolz Eb. Hatel S.

544. E. linariaefolia (Lmk.) Pers. Trodne, salzhaltige Biesen, selten. D. Schiffgrabenbruch zwischen bem mittleren und nörblichen Graben an ber hornhäuser Grenze Seht. St. hedlingen

Scht. norböftlich von Rathmannsborf Bne.1

545. E. pulchella (Sw.) Fr. Wiesen, Triften, gern auf Salzboben, zerstreut. Brb. Coppena; Iriger Busch Eb. S. Am Ronbel Eb. Salze!! Glinbe; Döben S. Bullenwiese Eb. M. Bei der Lorenzdrücke im Neuftäbeter Felb T. Silfzewiesen, östlich von Süllvors!! Bg. Zwischen bem Habberg und b. Dümke K. R. Wehlit beim englischen Berg!! Bäthen an der Silenbahn E.! N. Wiese bei den Franzosengärten M. S. St. Hedlingen Soht.

# 60. Familie. Convolvulaceae Juss.

## 250. Convólvulus L.

546. C. sepium L. Beden, Gebiliche, häufig. 547. C. arvensis L. Aeder, Begränber, fehr gemein.

## \* Pharbitis Choisy.

\* P. purpurea (Lmk.) Aschs. Säufige Zierpflanze zu Lauben u. f. w., aus bem tropifchen Amerika ftammenb.

## 251. Cuscuta Tourn.

548. C. europaea L. Auf Sträuchern und hoben frautartis Pflanzen, auch Vicia sativa L., häufig, z. B. S. Bujch!! Damm nach Ranies S. M. Rothehorn Bns. am Wege nach Pechau auf Vicia!! B. Nach Samswegen zu auf Vicia Bns.! Bg. K. R. Unsterholzer Berg!! N. Majchensteig; vor dem Detzel M. S.

549. C. Epithymum L. Anf niedrigen, frautartigen Bsianzen an trodnen hügeln, zerstreut. Brb. Friedrifenberg!! Kirchhof zu Klöb!! S. Sohliche Berge S. R. Dberhagen!! N. Zernit M. S.!

Brn. Raltberge Eb.

550. C. Epilinum Weihe. Nur auf Flachs. R. E.!!

## 61. Familie. Boraginaceae Juss.

## 252. Asperúgo Tourn.

551. A. procumbens L. Zäune, Begränber, Gebilche, zerftreut. S. Gr. Salze am Stabtgraben!! und Grabirwerk S. M.
Glacis ber Stabt und Friedrichstadt, besonbers häufig zwischen bem Subenburger u. Ulrichsthor!! Bg. Deichwärterhaus K.!! R. Schloßgarten!!

#### 253. Echinospermum L.

552. E. Lappula (L.) Lehm. Steinige Bilgel, an und auf

Mauern, besonders F häufig. S. Zenser Berge; Hummelsberg; Sohliche Berge; Bellenberge; Steinbrüche bei Alten Salze; Lehmmauern in Salze; Sohlen S. M. Lehmmauern in Sillborf!! Bahrenborf Eb. Bg. Stadtmauer beim Magbeburger Thor K. St. Mauern in Reundorf!! Egeln: Borne Eb. Brn. Beinberge!! bei Aberftebt T.1

## 254. Cynoglossum L.

553. C. officinale L. Begs und Walbränber, zerstreut. Brb. Tochheim; Friedrikenberg Eb. S. Döben; Damm nach Rasnies S. M. Bei der Friedrich Bilhelmsbrücke Eb. M. Klusbamm bei Pechau Bns. Sillborf Eb. Bg. Detershagen K. N. Galgensberg M. S. D. Brandsleber Holz S. St. Hohen-Erxleben Eb.

## \* Borago Tourn.

\* B. officinalis L. In Gemiljegarten gebaut.

#### 255. Anchúsa L.

554. A. officinalis L. Wegränder, Sanbselber, nicht selten, z. B. Brb. Beim Babezer Teichhause; Dornburg Eb. S. Wiefe zwischen Grünewalbe und ber Ziegelei; an ten Dämmen nach Glinde und Ranies S. M. Elbufer beim herrntrug Bus. Rothehorn; Eisenbahnbrücke beim Kommandantenwerder Eb. Bg. K. R. Galgenberg M.S. St. Löderburg Scht.

555. A. arvensis (L.) M. B. Aeder, febr häufig.

#### 256. Nónnea Medikus.

556. N. pulla (L.) D. C. Wegränder, Abhänge, nur F, bort aber nicht selten. S. Hummelsberg!! Frohseiche Berge!! an der Tijenbahn bei Westerhüsen S. M. Hestungswerte am Ulrichsthor beim Gymnasial-Turnplat E.l. Sternschanze!! Leipziger Chausse enach bem Schwan zu Eb. Dobendorf!! Bahrendorf Eb. Schnarsleben!! Robensleben; Mammendorf Eb. Egeln: Borne Eb. St.!! Brn. Sp. Kalbe: Brumbh Eb.

## 257. Sýmphytum L.

557. S. officinale L. An Sumpfen, Graben, febr baufig.

## 258. Échium Tourn.

558. E. vulgare L. Triften, Begranber, Meder, gemein, weißblübend R. Schweinering M. S.

#### 259. Pulmonária Tourn.

559. P. officinalis L. Schattige Laubwälber und Gebuiche, br zerstreut. Bg. Damm zwiichen bem Beibhau und ber Canberthslate im Bürgerholz K. R. Unterholzer Berg E.!! Unterhaen S. R. Bacofenberg M. S.! Ronnenspring M. S.! Hagen M. S. Bellenberge bei Dönnstedt T.! D. hatel!! Egeliche Forst S.

560. P. angustifolia L. Lichte Laubwälber, felten. D. Sa-

:1: Benede, Bog S.

## 260. Lithospermum Tourn.

261. L. officinale L. Sonnige hügel, Gebiliche, fehr zerreut. D. Brandsleber holz unter Birken S. hatel Scht. St. Am Banfefurter Busch S.!! Brn. Kaltberge links von der Chausse nach talbe!!

562. L. purpureo-coeruleum. L. Wie voriges. R. Am ibrblichen Enbe bes Unterholzer Berges unter Prunus spinosa E.!!

D. Hatel: Domburg!! Erreicht bier feine Norbgrenze.

563. L. arvense L. Aeder, gemein.

## 261. Myosótis L.

564. M .palustris (L.) With. Simpfe, Graben, gemein.

565. M. caespitosa Schultz. Feuchte Wiesen, Walbsumpfe, gerstreut. S. Bullenwiese; hinter bem Buschause Eb. Grünewalbe bei ber Amtmannslache; Birkenmoor zwischen Plögky und Gommern S. Kreuzhorst!! M. Zwischen ber Berliner Chaussee und ber Eisenbahn östlich ber Durchlaßbrücke!! Bg. Süblich von Detershagen K.t.

566. M. stricta Lk. Meder, fehr häufig.

567. M. versicolor (Pers.) Sm. Feuchte, grafige Stellen, Balbranber, nicht häufig. 3. Aderranber westlich von Iltrichau!! S. Elbbamm nach Ranies, besonbers wo die Chausse nach Gommern abgeht; zwischen Pretin und Dornburg S. Bg. Am Grabauer Busch K./

568. M. silvática (Ehrh.) Hoffm. Schattige Balber und Gebulche, sehr zerstreut. M. Gübser Damm E.! R. Oberhagen am. Junterweg E.!! St. Hagen M. S.! Wellenberge bei Dönnstebt S.!

569. M. hispida Schlechtendal sen. Grafige Stellen, Aetfer, zerstreut. S. Gr. Salze; Gräben an ber Königsstraße; Aeder
zwischen ben Frohseschen und Sohlichen und zwischen ben Frohseschen und Bellbergen S. M. Diesborf S. Bg. K.

570. M. intermedia Lk. Aderranber, ichattige Balber, febr

häufig. 571. M. sparsiflora Mikan. Schattige Balber, Gebufche,

besonders **A**, nicht selten. 3. Friedrichsholz Eb. S. Beim Bad Etmen!! Kapitelbusch Eb. Grünewalbe am Nachtigallensteig!! zwischen Bretzin und Dornburg; Kreuzhorst S. M. Westliches Glacis der Sternschanze!! Bogelgesang T.! Biederitzer Busch T.! Herrnfrug!! Bg. Deichwall K. R. Unterholzer Berg!! Kapelberg!! Kammsstedt im Park F. Hartmann!! St. Mühlendamm Scht.

## 62. Familie. Solanaceae Juss.

## \* Lycium L.

\* L. barbarum L. Zierstrauch aus Nord-Afrita, überall zu heden angepflanzt.

#### 262. Solánum L.

572. S. nigrum L. Zäune, Dorfftraßen, Schutthaufen, gemein. 573. S. villosum (L.) Lmk. Begränber, selten. D. Krot-

torf an ber Strafe nach Borborf Scht.

b) alatum Mnch. (als Art). Wegränder, Sanbfelber, häufiger als die Stammart. Brb. Zwischen Kämeritz und Poleimühle!! S. Frohsesche Berge; Plötzty S.! M. Dobendorf E. Nieder-Dobeleben S. Krakauer Anger!! Bg. Zwischen Niegripp und Külzau E. R. Am Wege nach dem Hagen bei der Eisenbahn E.!! Zielitz T. St. und Brnb. dis Altenburg, gemein!!

574. S. Dulcamara L. Feuchte Gebülche, gemein. \*S. tuberosum L. Ueberall gebaut, aus Gubamerita ftammenb.

## † Physalis L.

† P. Alkekengi L. Im Gebiet nicht einheimisch, sonbern an Baunen und Beinbergen verwilbert. S. hummelsberg S. Brn. Garcke.

## † Nicandra Adans.

† N. physaloides (L.) Gaertn. Stammt aus Subamerita. Früher bier und ba als Zierpflanze. Berwilbert S. Eb.

## 263. Hyoscýamus Tourn.

575. H. niger L. Dorfftragen, Baune, baufig.

## \* Nicotiána L.

\* N. Tabacum L. Stammt aus Norbamerita; wirb auf Sanbboben gebaut, besonbers zwischen M. und Bg. bei Gerwisch, Körbelit, Bormlit, Schermen, Detershagen, Schartau, Niegripp,

Sohenwarte und Lostau und zwischen W. und R. bei Samswegen und Deeseberg; R. Loitiche.

## + Datúra L.

† D. Strammonium L. Stammt aus Vorberassen. Seit Ende bes 16ten Jahrhunders in Europa eingewandert, jetzt an Zäusten und Dorsstraßen, häusig, z. B. B. Tochheim E. M. Biederit Ins. Bg. Gütter K. N. Beim Nömerschen Vierkeller; Schweinering W. S. D. Vor dem Hornhäuser Thor; Emmeringen; Krottorf hinser dem Amt; Kl. Oschersleben Scht. Egeln: Tarthun Scht. St. Bahnhos!! Brn. Altenburg!!

## 63. Familie. Scrophulariaceae R. Br.

#### 264. Verbascum L.

576. V. Thapsus L. Anböben, Grasplate, felten. G. Frieb-

of S.
577. V. thapsiforme Schrad. Sonnige Hügel, Sanbselber, rochne Wälber, nicht selten, z. B. Brb. Zwijchen Konnei und Tochseim Eb. zwischen Kämeritz und Hoben-Lepte S. S. Westerhissensche Berge S. Kanbau; Pregin; Gommern Eb. M. Bieberitz Bons. Bg. K. R. Eisenbahnstation E. R. Beim Römerschen Bierteller M. S.

D. Bulferftebt S.

578. V. phlomoides L. Begränder, Dämme, nicht häufig. S. Grünewalbe Eb.!! M. Bei ber Citadelle E. Prester am Elb-

eich!!

579. V. Lychnitis L. Balber, Wegränder, zerstreut. Brb. 3wischen Tochheim und Poleimühle; Dornburg S. Reue Mühle; Bommern Eb. Bg. K. Gisen!! R. Unterholzer Berg!! Rammtebt Bns. R. Oberholz M. S.

580. V. nigrum L. Wie voriges, häufiger, 3. B. S. Reue Mühle bei Gommern S. Bg. K. R. Eisenbahnstation E. R. Kol-

riter Beibe S. Ronnenspring M. S.1 Brn. Eb.

581. V. phoenicoum L. Kiefernwälber, sonnige Higel, zertreut. S. Frohseiche Berge; Pilm S. Bg. Pietpuhl beim Park K. Büften-Rogafen J. Müller. R. Bei ber Eisenbahnstation!! Obersagen E.1 Rammstebt!! R. Badosenberg M. S. Kolbiger heibe!!

582. V. Blattaria L. Dämme, Gebüsche, Wegränder, saft tur in ber Nähe ber Elbe, bort aber nicht selten. Brb. Zwischen Ronnei und Tochheim Eb. Saalbämme bei Gr. Rosenburg Eb. S. Busch!! Grünewalbe Eb.!! M. Rothehorn E.! Pechau!! B. Herrnsolz bei Glindenberg S. R. An der Ohre E.

577 × 581. V. thapsiforme × phoeniceum. Dieser bisher noch nicht bekannte Bastard wurde R. bei Rammstedt im Juni 1856 von E.! entbeckt.

580 × 581. V. nigrum × phoeniceum. (V. rubiginosum

W. K.) R. Bei ber Gifenbahnstation E.1

## 265. Scrophularia Tourn.

583. S. nodosa L. Gebüsche, Balber, Graben, nicht selten. 584. S. alata Gil. Graben, sehr zerstreut. S. Bor Dornburg S. M. Pfuhlmuhle bei Gerwisch S. Bg. Birkensteig K. R. Wiese vor bem hagen S. St. Ganfefurter Bujd!!

† S. vernalis L. Stammt aus Gilbeutichland. In Gartenland, an Zäunen, juweifen eingeschleppt. Brb. Friedrifenberg S."

D. Schnedenberg auf bem Berber 1855 E.1

#### 266. Gratíola L.

585. G. officinalis L. Wiesen, Gräben, meist A, zerstrut. Brb. Walternienburg S. S. Busch; Zachmünde Eb. Grünewalde & Kreuzhorst!! M. Bei ber Berliner Chausseeg! zwischen Pechau und dem Forsthaus Alte Klus!! Bg. Springberg; beim Schartaux See K. Deichwall Dk.1 R. E. N. Erbte; Bullengraben M. & D. Zwischen ben Espen und Deierweiden süblich von der Günthersborser Feldmart und Theilungen im Brehme; Kl. Dichersleben Scht. Egeln: zwischen Tarthun und Unseburg Scht. Zwischen St. und Becklingen Scht.

## 267. Digitalis Tourn.

586. D. ambigua Murr. Laubwälber, fehr zerstreut. 3. Frie brichshol3!! N. Kolbiger Beibe füblich von Plaufen!! Benig M. S. Bernig M. S.! D. Brandsleber Golz im Klaushagen Sche. Satel S.

#### 268. Antirrhínum L.

+ A. majus L. (ex p.) Bierpflanze aus Gilbbeutschland, rer

wilbert Brn. Um Schloß Sp.

587. A. Orontium L. Aeder, besonders auf Lehmboden, zerstreut. S. Salze; Westerhissen S. M. Sudenburg S. Bg. Detersphagen; Deichwall K. Wilften-Rogasen J. Müller. N. Bor bem Benit; Rosmarinbreite M. S.

## 269. Linária Tourn.

† L. Cymbalaria (L.) Mill. Zierpflanze aus Gubbeutichland, bie aber in vielen Gegenben Norbbeutschlands an aften Mauern eingebürgert ift. 3. Stadtmauer Dr. Mohs. D. Mauern bei ber Bombe" füblich von ber Schlenfe!! (hierher mahricheinlich von Dres.

en berabgeschwemmt).

588. L. Elatine (L.) Mill. Lehmäder, besonders &, ziemlich läusig. S. Buschäder; Gr. Salze beim Bad Elmen; bei der Bulsenweise Eb. M. Fermersleben S. Dobendorf nach Ofterweddingen u. E.!! Altenweddingen S. Felsenberg bei Dahlen-Warsleben F. Hartmann! Bg. Zwischen habberg und Dümte K.! N. Vor bem Benig M. S. St. Rathmannsborf!! Brn. Eb.

589. L. spuria (L.) Mill. Ralthaltige Meder, febr felten.

Brn. Garcke.

590. L. minor (L.). Desk. Aeder, Steinbrüche, Kaltberge, zerstreut. S. Gr. Salze; Felgeleben S. Frohsesche Berge Eb. Beiens dorf; Westerhüsen S. M. Dobenbors!! östlich von Ofterwebbingen T.! Süllbors E.!! Bg. Am Schartauer Weg bei b. Dümte K.! R. E.

Bathen E.!! Ct. Ganfefurt!! Rathmannsborf!! Brn. Eb.

591. L. arvensis (L.) Desk ex p. Sandig-lehmige Acker, zerstreut. Z. Vor Sichholz!! S. Acker an ber Eisenbahn nach Frohje Eb. Westerhüsen; Beienborf S. Dornburg Eb.! W. Samswegen E.! Bg. Löbekühn; Schermen K. N. Acker nach Angern hin E.!! N. Warenberg M.S. westlich von Neuenhose E.!! D. Zwischen Smmeringen und der Wasserrinne Scht. Brn. An der Chausse aach St.!!

592. L. vulgaris Mill. Begränber, Canbfelber, Balbranber,

gemein.

## † Collínsia Nuttal.

† C. bicolor Benth. Zierpflanze aus Nordamerita, vermilbert R. Am Gisteller auf bem Galgenberg M. S.!

## 270. Verónica L.

593. V. scutellata L. Sumpfwiesen, Grüben, zerstreut. Brb. Grüneberg; Dornburg S. Elbinsel Eb. S. Pilm; Plötty; Pregin S. Kreuzhorst!! M. An ber Berliner Chaussee!! Bg. Brehmer Wiese K. D. Rienhagen; Krottors, Habmersleben Scht.

594. V. Anagallis L. Graben, Bache, haufig.

595. V. Beccabunga L. Graben, Bache, Quellen, nicht felten, 3. B. S. Gr. Mühlingen; Graben ber Bullenwiese; Sohlen; Erlenbruch und Keffelteich bei Prețin!! vor Dornburg S. Bg. K. R. Station Bathen!! R. M. S.

596. V. Chamaedrys L. Balber, Gebuiche, gemein.

597. V. montana L. fil. Schattige Laubwälber, nur im Elbthal, selten, aber sehr gesellig. S. Grünewalbe am Nachtigallenfteig Eb. !! vor ber alten Fähre; Pfaffenhagen bei Pregin S.

598. V. officinalis L. Trodne Balber, nicht selten, z. B. Brb. Poleimühle S. S. Streitheibe bei Gommern; zwischen Prehin und Dornburg S. N. Kolbiger Beibe S. D. Brandsleber Holz Eb.

599. V. prostrata L. Trodne Wiesen, Higel, Walbränder, nicht selten. Brb. Friedrikenberg Eb. S. Frohser Berge zwischen Frohse und Westerhilsen; Damm nach Ranies; Pretiner Kirchhof S. M. Jungfernberg bei Hohen-Dobeleben; Schnarsleben!! Rotheborn-Wiesen!! Krakauer Anger!! Heprothsberge Eb. Bg. Detershagen!! R. In Rammstebt!! R. M. S. Brn. Eb.

600. V. latifolia L. Trodne Laubwälder, Geblische, grafige Stellen, zerftreut. S. Kapitelbusch Eb. Bg. Bierkeller K.! R. Dberhagen am Junkerweg E.!! R. Benit M. S. Althalbensleber Parl

H. Engel! Bellenberge M. S.! D. Batel an ber Domburg!!

b) minor Schrad. S. Am Damm nach Ranies S.! Glinde im Sagebuld Eb.

601. V. longifolia L. Heuchte Wiesen, Gebüsche, meist A, ziemlich häufig. S. Busch!! Grünewalbe S. Kreuzhorst!! M. Eleweiben süblich vom Herrntrug!! am Bieberiter Busch!! Bg. Deichwall Dk.! Birkensteig K.! R. Unterholzer Berg!! R. Benitz; Hagen; Erbte M. S.! D. Ost- und Sibseite ber Neierweiben Scht.

602. V. spicata L. Trodne Higel und Wälber, zerstreut. S. Hummelsberg; Frohseiche Berge S. zwischen Pretzin und Dornburg Eb. M. Klingeberg bei Sillborf Eb. Bg. Brehmer Berg Dk.! R. Oberhagen!! Rammstebt!! N. Jübischer Begräbnifplat!! Barenberg M.S. Benity!! Kolbiter Heibe!!

603. V. serpyllifolia L. Feuchte, grafige Stellen, febr

häufig.

604. V. arvensis L. Meder, Begranber, gemein.

605. V. verna L. Trodne Sügel, Sanbfelber, zerstreut. E. hummelsberg Eb. zwischen Frohse und Belsleben; hinter Plötte; Gommern S. M. Krakauer Anger; beim Richterschen Gasthof Eb. Bg. Schermensche Duble!! Burgerholz K.! R. hagen E. R. M. S.

606. V. triphyllos L. Meder, gemein.

607. V. praecox All. Lehmäder, zerstreut. S. Bwischen Salze und Felgeleben S. Döben Eb. Biere S. zwischen bem hummelsberg und ben Frohseschen Bergen Eb.!! M. Festungsmauer am Ulrichsthor 1853!! Brn. Garcke.

608. V. agrestis L. Meder, hier und ba, 3. B. M. Schnard.

leben!! 2B. Rach Camswegen bin!!

609. V. polita Fr. Aeder, Wegränder, besonders F, gemein, 3. B. M. Am Mostersteig bei Budau!! westlich von der Reuen Reuftadt!! bei Richters Gasthof!! B. Nach Samswegen bin!! St.!! Brn.!!

610. V. hederaefolia L. Meder, Bebuiche, gemein.

#### 271. Limosella L.

611. L. aquática L. Ufer, kahle Stellen an Teichrändern, zerstreut. Brb. Elbuser S. S. Elbuser bei Grünewalbe und Westerbüsen S. Elbenau am stillen Wasser; Kahlenberge Eb. M. An einem Kulk westlich von Prester!! Bg. Niegripp S. Detershagen K. R. Elbhäger in Schmucksdorf E. N. Schwarze Pfuhl M. S.! D. Horstorf; alte Bode bei Günthersdorf Scht. Brn. Große Aue Sp.

## 272. Melampýrum Tourn.

612. M. cristatum L. Trodne Wiesen, Laubwälber, zerstreut. S. Kapitelbusch; Grünewalbe; Kreuzhorst S. Bg. K. R. Oberhagen E.!! Rammstedt Bas. N. Backofenberg M. S. Benitz M. S.!! am Moosbruch M. S. D. Meierweiben Scht.

613. M. arvense L. Aeder, fehr Berftreut. G. Benfer Berge bei ber Muble S. M. Schnarsleben!! besonbers beim Gr. Bartberg

S. Bg. K.

614. M. nemorosum L. Schattige Wälber, zerstreut. 3. Friedrichsholz!! Brb. Westlich von Walternienburg S. S. Wolfstehlenbusch S. M. Bieberitzer Busch!! Bg. Wulshagen S. Bürgerbolz!! R. Oberhagen!! Rammstedt!! R. Moosbruch; Fuß bes Bacsosenberges M.S. Benitz!! Butterwinkel bei Neuenhose!! D. Brandsteber Holz; Sauerholz bei Schermke Eb. Hatel S.

615. M. pratense L. Balber, nicht felten. Brb. Zwischen Tochheim und Poleimuble S. S. Zwischen Pretin und Dornburg!! Bg. K. R. Hagen!! Rammftebt!! N. Benity!! D. Sauerholz bei

Schermte; Hatel Eb.

#### 273. Pediculáris Tourn.

616. P. silvática L. Moorwiesen, zerstreut. Brb. Zwischen Walternienburg und Poleimühle S. S. Erste Moorwiese zwischen Pretzin und Dornburg S. Schlößbruch bei Gommern Eb. Bg. Springberg K.! N. Erbte M. S. Schwarze Pfuhl S. D. Brands-leber Holz hinter ber Ziegelei Scht.

617. P. palustris L. Wie vorige, hanfiger. 3. Zwischen Luso und Jütrichau!! Brb. Poleimihle Eb. S. Zwischen Pretin und Dornburg S. Schlofbruch bei Gommern Eb. W. Samswegen nach Lindborft zu!! Bg. Niegripp S. Kothe Mible K. Resen S, Gusen!! N. Behrends Wiese; Erbte M. S. Silpplingen S. D. Breite Bleet Scht. St. hecklingen; Reundorf Scht.

## 274. Alectorólophus Haller.

618. A. minor (Ehrh.) W. u. Grab. Wiesen, nicht selten. 619. A. major (Ehrh.) Robb. Wie vorige, gemein.

## 275. Euphrásia Tourn.

620. E. officinalis L. Biefen, Triften, trodne Balber, gemein.

621. E. Odontites L. ex p. Biefen, feuchte Meder, febr

härfig.

622. E. lutea L. . Sonnige hügel, fehr zerstreut. R. Warenberg M. S.!! beim jubischen Begräbnifplat M. S.! Brn. Kaltberge bei ber Chausse nach Kalbe Eb.!!

#### 276. Orobanche L.

623. O. caryophyllacea Sm. Sonnige Sigel, auf Galium verum L. und Mollugo L. selten. S. Frohsesche Berge S.

624. O. rubens Wallr. Bie vorige, auf Medicago sativa L.

und falcata L. felten. M. Schnareleben E.!

625. O. Picridis F. Schultz? Auf Picris hieracioides L.

fehr felten. Bg. Löbefühn Dk.4

626. O. purpurea Jacq. Auf Achillea Millefolium L. selten. An ber westlichen Grenze bei Moorsleben in ber Gegend von Helmstebt W. Lettau! (Bon M. S. mitgetheist).

#### 277. Lathraea L.

627. L. Squamaria L. Feuchte Laubwälber, Gebiliche, sehr gerftreut. Bg. Damm zwischen Geibhan und Canbforthstake im Burgerholz Dk.! R. Unterholzer Berg E.!! Hagen S.

## 64. Familie. Labiatae Juss.

## + Elsholtzia Willd.

† E. Patrinii (Lepechin) Aschs. Stammt aus bem Innern Afiens. An Gartenzäunen und in Garten zuweilen verwilbert M. Barleben F. Hartmann.

#### 278. Mentha L.

628 M. aquatica L. Graben, an Gumpfen, häufig.

b) sativa (als Art). S. Friedhof S. Bohl nur verwisbert. 629. M. arvensis L. Feuchte Aeder, Wiesen, Graben, gemein.

b) gentilis L. (als Art). Brb. Zwischen Göbnit und Dorn-

burg S. G. Bullenwiese; zwischen Ploth und Pretin S.

630. M. Pulégium L' Biesen, feuchte Triften, besonders in der Nähe der Elbe, häufig und sehr gesellig. Nur A. Brb. Am rechten Elbuser bei der Fährstelle!! S. Grünewalde!! zwischen der alten Fähre und Plöthy!! Beim Elbenauer Kirchhof Eb. M. An der Elbe sülfich vom Herrnfrug!! Bg. Elbuser bei Niegripp S. und westlich von Wohrs Lanke K. R. E. Egeln: Bodeniederungen abwärts der Stadt, besonders bei Tarthun unweit der Brücke und Wolmirsleben Scht.

## 279. Lýcopus L.

631. L. europaeus L. Biefen, Gumpfe, gemein.

632. L. exaltatus L. fil. Feuchte Gebufche, fehr felten. S. 3m nordwestlichen Theil ber Kreughorst fehr felten, von Bns. und S. 1856! gefunden.

## 280. Sálvia L.

† S. officinalis L. Stammt aus Gilb-Europa. Sier und

ba in Garten, verwilbert G. Friedhof S.

633. S. pratensis L. Sonnige Higel, trodne Grasplätze und Wälber, nicht selten. Brb. Siblich von Tochheim Eb. S. Glinde an der Uebersahrt nach Dornburg Eb. Mithlinger Berge S. Hummelsberg!! Frohseiche Berge; Beiendorfer Berge Eb.!! M. Sillsborf Eb. Bg. Zwischen Piehpuhl und Forsthaus Grabow K. N. Althaldensleber Burgwall; Wellenberge bet Dönnstedt M. S. Kalbe: Indigen Brumby und Hoben-Errleben Eb.

634. S. silvestris L. Wegränder, sonnige higel, nur F, zerstreut. S. Milhlinger Berge S. hummelsberg Eb.! zwischen Frobse und Belsteben an ber Bullenwiese; zwischen Beiendorf und Sohlen S. zwischen Loburg und Leitfau, wohl nur verschleppt Eb. D. Hohlweg zwischen ber Station Dobendorf und ber Silzebriide Bns.! Nothehornpige 1858 augeschwemmt Eb. St. Rathskalthütte!! nach Körderstebt bin Eb. Br. Farforcebaus Sp. Aberstebt T.!

7 S. verticillata L. Im öftlichen Deutschland einheimisch. Im Gebiet nur eingeschleppt und an Wegrändern hier und da beständig. S. Frohse an der Eisenbahn Eb.! zwischen Loburg und Leitzfau Eb.! M. Chaussegraben in Barleben F. Hartmann! O. Unterhalb Rienhagen bei der Wiesenmilbse am Wege nach Krottorf Socht.

## 281. Origanum L.

635. O. vulgare L. Balber, Gebuiche, febr gerftreut. Bg. Bulfhagen S. R. Oberhagen E.!!

## 282. Thymus L.

636. T. Serpyllum L. Trodne Balber und Bugel, gemein.

## \* Saturéja L.

\* S. hortensis L. Aus Süb-Europa. In Gemüsegärten gebaut.

#### 283. Calamintha Mnch.

637. C. Acinos (L.) Clairv. Begranber, trodne Grasplate,

häufig, befonbers F und D.

638. C. Clinopodium Benth. Laubwälber, Gebüsche, zerstreut. 3. Friedrichsholz!! Brb. Tochheim S. S. Neue Muble bei Gommern S. Bg. Schermen!! Birtenfleig K. R. Oberhagen E.!! Rammftebt!! N. Butterwinkel!! Benity!! D. Brandsleber Holz Eb. Hatel S. Egeliche Forft S.

## † Hyssópus L.

† H. officinalis L. Stammt aus Subentichland. Zuweisten als Bierpflanze. Berwilbert S. Gnabau am Bahnhof!!

## 284. Népeta L.

639. N. Cataria L. Zäune, Wegränder, ursprünglich vielleicht nicht einheimisch. M. Alte Neustadt Bns. Alte Klus!! Bg. K. R. Bor bem Römerschen Bierkeller!! Planten M. S. D. Neu-Brandsleben Eb.

b) citriodora Becker. D. Rrottorf; Gröningen Scht.

#### 285. Glechóma L.

640. G. hederacea L. Balber, gemein.

#### 286. Lámium L.

641. L. amplexicaule L. Aeder, Baune, Begrander, febr baufig.

642. L. purpureum L. Wie voriges, febr gemein.

643. L. maculatum L. Gebüsche, Zänne nicht selten. 3. Schlofigarten!! Brb. Saalbiliche; Epprena; Fritzer Busch Eb. S. Busch S. am Damm nach Ranies Eb. M. Bogelgesang Bus Bg. Deichwall!! Bulfhagen K.! R. Kapellberg!! Rammstebt!!

644. L. album L. Baune, Dorfftragen, gemein.

#### 287. Galeóbdolon Huds.

645. G. luteum Huds. Laubmälber, fehr zerstreut. Bg. Bürgerholz zwischen bem Heibhau und ber Canbforthslate S. R. Unterhagen E. ! N. Schwarze Pjuhl M. S. Brn. Büsche im Saalthal Sp.

## 288. Galeopsis L.

646. G. Ladanum L. Aeder, nicht häufig. 3. Bor Eichsholz!! S. Frohsesche Berge S. jenseit Pretin; Neue Mühle; Gommern Eb. M. Nieber-Dobeleben S. Brb. Babez!! B. Kolbit!! Bg. Möser!! N. Fuchsberg bei Neuenhose!! St. Rathmannsbors!! Brn. Kalkberge!!

647. G. Tetrahit L. ex p. Meder, Baune, febr baufig.

b) bifida v. Boenninghausen (als Art). Balber. Bisher

nur Dt. Bieberiter Buid!! Jebenfalls mehrfach überfeben.

648. G. versicolor Curt. Aeder, Walbränder, zerstreut. Brb. Zwischen Walternienburg und ber Voleimühle 'S. S. Zwischen Kahlenberge und ber Neuen Mühle S. B. hinter ber Stärkesabrit E. Bg. An ber östlichen Seite bes Molkenbruchs K. R. Unterholzer Berg!! R. hagen M. S.! Zernit; Chaussegraben bei Bülstringen M. S.

## 289. Stachys L.

649. S. gormánica L. Steinige Aeder, hügel, Begränder, zerstreut. S. Zwijchen Frohje und ben Besterhüsenschen Bergen; Anger vor Besterhüsen S. M. Süllborf an ber Norbseite!! Bg. Am Schartauer See K. R. Oberholz; Althalbensleber Burgwall II. S. Brn. Anhöhen bes Saalthals Sp.

650. S. silvatica L. Schattige Laubwälber, nicht selten 3. B. B. Friedrichsholz!! Brb. Tochheimer Busch!! S. Busch; Grünes walbe S. M. Bieberiter Busch!! Bg. K. A. Rammstedt!! Erlen-

bruch bei Bathen!!

651. S. palustris L. Simpfe, Graben, baufig.

652. S. arvensis L. Lehmäder, zerstreut. M. Bechauer Felb E.! B. Kolbit öftlich von ber Cbaussell Bg. Am Fußsteig nach Schartau K. R. Aeder nach Angern zu E.!! R. Am Beg nach bem Detzel unterhalb bes Trenbelberges; zwischen bem Nonnenspring und Dönnsteht M. S.! D. Am Busch zwischen D. und Emmersberg; Ampfurt S. Brn. Garcke.

653 S. annua L. Ralthaltige Neder und Beinberge, nur T, febr gerftreut. G. Benfer Berge bei ber Milhle S.! Frohfeiche Berge

Eb. Beienborfer Berge Eb. Brn. Weinberge !!

654. S. rocta L. Sonnige, besonbers sandige Hügel, D und K, zerstreut. Brb. Kirchhof zu Flötz!! Gödnitz; Dornburg Eb. S. Frohseiche Berge!! Sohlsche Berge; Streitheide bei Gommern; Pretin S. M. Gr. Wartberg bei Schnarsleben S. Klusheide!! Bg. K. R. Seelenhau; Oberhagen E. Rammstedt!! R. Jildischer Begräbnifpplatz!! Warenberg!! Brn. Kaltberge!!

#### 290. Betónica L.

655. B. officinalis L. Trodne Wiesen und Wälber, zerstreut. 3. Friedrichsholz!! S. Frohlesche Berge; Kapitelbusch S. Bg. Bulshagen K. R. Unterholzer Berg!! Unterhagen S. Rammstebt!! Wiesen nörblich von Bathen!! N. Benitz!! Erbte M. S.

## 291. Marrubium L.

656. M. vulgare L. Begranber, Dorfftragen, sonnige Siigel, baufig.

#### 292. Ballóta L.

657. B. nigra L. Dorfftragen, Baune, gemein.

## 293. Leonúrus L.

658. C. Cardiaca L. Bie vorige, fehr häufig.

#### 294. Chaeturus Willd.

659. C. Marrubiastrum (L.) Rohb. Dorsstraßen, Weg- und Balbränder, besonders in der Nähe der Elbe häufig und gesellig. Brb. Ronnei!! S. Griinewalbe am Wege nach der alten Hähre Eb.!! Elbenau Eb. hinter dem Buschanie; Elbannn nach Randau Kreuzhorst!! M. Am süblichen Rande des Biederiger Busches!! W. Gliudenberger Hosz E.!! Bg. Elbufer bei Blumenthal K. R. E. D. Amtsgarten Scht.

#### 295. Scutellaria L.

660. S. galericulata L. Graben, Sumpfrander, nicht felten, z. B. 3. Nuthe!! Brb. Plötty; zwischen Pretin und Dornburg Eb. Poleimible; Badez Eb. S. Bujch; Grünewalde S. Kreuzhorft!! B. Samswegen E.! Bg. Pietpubler Forft T.! R. S. Erlenbruch bei Bathen!! N. Kolbither Beide!! Egeln S.

661. S. hastifolia L. Biesen, Balbranber, nur A, ziemlich verbreitet und gesellig. S. Buich S. Elbenau Eb.! Am Damm nach Ranies Eb. Kreuzhorst!! M. Sübrand bes Bieberiter Busches!! Prester!! Elbwiesen nörblich vom herrnfrug T.! B. Nach Samswegen bin!! Bg. Beim Deichwärterhause K.! D. Norbrand

ber Spitwiese binter bem Amtsgarten; Borborf und Gunthersborf an ben Espen und Meierweiben Sche. Egeln: amijchen Tarthun und Unfeburg Scht. St. Banfefurt; Bedlingen Scht.

## 296. Prunella L.

662. P. vulgaris L. ex p. Biefen, Balber, gemein. 663. P. grandiflora (L.) Jacq. Sonnige Sugel, febr gerftreut. S. Mühlinger, Frohseiche, Sohliche Berge S. M. Bartbera bei Schnarsleben S. St. Rain über Bedlingen am Wege nach Reundorf!! Brn. Beinberge Garcke.

## 297. Ajuga L.

664. A. reptans L. Wiefen, Laubmalber, gerftreut. Brb. Boleimüble; Babeg Eb. G. Grunewalbe am Bege nach ber alten Fabre und nach Ranies S. Bg. K. R. Bns. N. Benit M. S.

665. A. genevensis L. Trodne Balber, Sügel, nicht felten. G. Frobjefche Berge S. Reue Muble Eb. Bg. Schermeniche Ditble!! Deichwall S. R. Bor bem Sagen!! Rammftebt!! D. Benit M. S. D. Branbsleber Bolg; Batel S.

## 298. Teucrium L.

666. T. Botrys L. Connige Ralfberge, felten. D. Ranb bes

Satel beim Bafferthal S.!

667. T. Scordium L. Biefen, Graben, gerftreut. Brb. Babeg am Teich!! G. Reben ber Rothe S. jenfeit Badmunbe Eb. M. Alinke bei ber Subenburg S. 2B. T.! Bg. Graben ber nachtweibe D. Schiffgraben; Bordorf; Bunthersborf; Meierweiben bei Babmersleben Scht. Bobenieberung von Tarthun bis Et. Scht.

## 65. Familie. Verbenaceae Juss.

#### 299. Verbéna L.

668. V. officinalis L. Baune, Dorfftragen, febr baufig.

## 66. Familie. Lentibulariaceae Rich.

300. Pinguícula Tourn.

669. P. vulgaris L. Moorwiesen, febr gerftreut. Bg. Refen R. (Außerhalb ber norblichen Grenze amifchen Steglit und Gr. Schwarzlofen E.A R. Moor vor bem Geholz beim Bulverthurm

M. S.! Erbte E. O. Brandsleber holz S. Breites Bleet turz vor bem hateltsberger Plan F. Reinecke!

#### 301. Utricalaria L.

670. U. vulgaris L. Gräben, Sümpfe, zerstreut. Brb. Dornburg nach ber Elbe zu S. S. Röthegraben; Kreuzhorst S. M. Kübette bes äußern Festungsgrabens am Ulrichsthor E. Mittel-Elbe bei ber Eisenbahnbrücke Eb. Pechauer See S. Bg. Hungriger Bolf!! Güsen nordweftlich ber Eisenbahnstation!! R. Zwischen St. und Becklingen S.

671. U. minor L. Torffümpfe, febr felten. R. Schwarzer

Bfuhl Bas., E., M. S.!

## 67. Familie. Primulaceae Vent.

#### 302. Trientális L.

672. T. europaea L. Schattige Balber, fehr zerftrent. R. Schwarzer Pfuhl M. S.! D. Brandsleber Golg; Bedersberg nach Eggenstebt bin S.

## 303. Lysimáchia L.

673. L. thyrsiflora L. Sumpfe, Graben, nur D, febr gerftreut. S. Moor zwijchen Plogty und Pregin Eb.! Bg. K.

674. L. vulgaris L. Graben, feuchte Balber, febr baufig. 675. L. Nummularia L. Keuchte, grafige Stellen, Graben-

675. L. Nummularia L. Feuchte, grafige Stellen, Graber ränber, fehr häufig.

## 304. Anagallis L.

676. A. arvensis L.

a) phoenicea Lmk. (als Art). Aeder, gemein.

b) coeralea Schreb. (als Art). Lehmäcker, wohl nur F, bort aber nicht selten. S. Zwischen Kl. Milhlingen und Zens; Mühlinger Berge; Frohser Berge am Wege nach Dobenborf S. M. Dobenborf nach Ofterwebbingen zu!! nörblich von Süllvorf!! Bahrenborf Eb. Nieder-Dobeleben S. W. Am süblichen Wege nach Samswegen!! Bg. Stabtmauer an ber Sibseite K.! (wohl nur verschleeppt). D. Am Brandsleber Holz und Hatel Eb. Egeln: Zwischen Wolmirsleben und Altenwebbingen S. St. Gänsefunt an ber Sibseite Kriehen und Klenwebbingen S. St. Gänsefunt an ber Sisenbahn!! Hecklingen!! Nathmannsborf!! Brn. Eb.

#### 305. Centunculus L.

677. C. minimus L. Feuchte, fanbige Meder und über

chwemmte Stellen, sehr zerstreut. Bg. Schermensches Erlenbruch K.! Brabauer Busch Dk.! N. Im Hagen am Bullengraben; schwarzer Bsubl M. S.! D. Kloster Gröningen Scht. Brandsleber Holz am Beckersberge Scht. und bei ber Ziegelei S. Aecker bei Alt-Brandsseben S.

#### 306. Andrósaces Tourn.

A. elongatum L. M. Kommanbantenwerber bei ber Ziegesei von Bas.! vor 20 Jahren gesammelt Später von Peck einmal baselbst in Menge gesunden, allein stets unbeständig und wohl nur durch Hochwasser babin geführt.

678. A. septentrionale L. Rieferniconungen, febr felten, aber gefellig. Bg. Bwijchen ber Killzauer und Schermenichen

Milble K.!!

## 307. Primula L.

679. P. officinalis Jacq. Sonnige Higel, trockne Wiefen, Laubwälder, zerstreut. 3. Friedrichsholz Eb. Brb. Badez Eb. S. Frohlesche Berge; Welsseben; Mühlinger Verge Eb. Pretziner Kirchshof S. Reue Mühle bei Bommern T.! M. Biederitzer Ausch Eb. Sillsorf Eb. Bg. Külzauer Mühle!! R. Hagen S. Rammstebt!! R. Krohnens Ruh; Hagen M. S. Wellenberge bei Vönnstebt T.! D. Brandsleber Holz S. Hatel!!

## 308. Hottónia Boerh.

680. H. palustris L. Gräben, nicht selten. Brb. Babez S. S. Grinewalbe; Ranies Eb. zwischen Plötzty und Pilm S. Steinsbrüche zwischen Plötzty und Gommern; Gommern im Schlofbruch Eb. Pretin Eb. M. Rothehorn S. Bg. Süblich von Niegripp S. Eisenbahngräben bei Güjen!! R. Erlenbruch bei Bathen!! R. Weg nach dem Papenberg; Ohre M. S. D. Präsibentenloch Scht.

#### 309. Sámolus Tourn.

681. S. Valerandi L. Gräben, feuchte, moorige Stellen, bessonbers auf Salzboben, zerstreut. Brb. Zwischen bem Teichhause und Babez Eb.!! S. Graben ber Bullenwiese S. M. An ber Kübette bes äußern Festungsgrabens am Ulrichsthor E.! D. Schiffgraben; Krottorf Scht. St. Am Gänjesurter Busch Eb.:! Zwischen St. und Hedlingen Scht. Rathmannsborf E.!

#### 310. Glaux Tonrn.

682. G. maritima L. Salzwiesen, auf falzigem Boben, an Graben, fehr verbreitet. S. Gr. Salze am Grabirwert!! Sooftanal;

Rothe Mible; Sohlen S. M. Bei ber Lorenzbrude im Neuffähler Felb T. in und bei Süllborf fehr viel!! D. Schiffgrabenbruch; horborf; Krottorf Scht. St. Am Wege nach Löberburg!! zwischen St. und hedlingen Scht. süblich von St.!! Rathmannsborf!!

# 68. Familie. Plumbaginaceae Juss.

## 311. Arméria Willd.

683. A. elongata (Hoffm.) Boissier. Trodue Wälber und Graspläte, häufig.

# 69. Familie. Plantaginaceae Juss.

## 312. Plantágo L.

684. P. major L. Wegranber, Triften, Ufer, gemein.

685. P. media L. Wiejen, häufig.

686. P. lanceolata L. Triften, Biefen, gemein.

687. P. maritima L. Salzboben, Salztriften, verbreitet und gesellig. S. Gr. Salze am Grabirwerk!! am Soolkanal; Soblen & M. Sülzewiesen östlich von Süllborf!! D. Bulserstebt; Krottorf in ber rothen Lache vor der Wiesenmühle Scht. St. Nach Löberburg!! und hecklingen zu Scht. Moor süblich der Stadt!! Rathmannsborf Sp.

688. P. ramosa (Gil.) Aschs. Sanbfelber, Triften, nur in ber Nähe ber Elbe, bort aber gesellig. S. Grilnewalbe; Kreuzhorst S. M. Elbufer süblich vom Herrnfrug!! Bg. Elbufer an ber Blumen-

thaler Forft K. R. Schmudsborf E.

## 70. Familie. Amarantaceae Juss.

## 313. Albérsia Kth.

689. A. Blitum (L.) Kth. Strafenpflafter, Begranber, Baune, gemein.

## 314. Amarantus L.

690. A. retroflexus L. Wegranber, Zaune, zerstreut. Brn. Kolphus!! S. An ber Friedrichsstraße S. M. Subenburg S. Subborf an ber Norbseite!! Bogelgesang T. beim Richterschen Gasthof!! Bg. Niegripp E. Holzstrede in ber Kolonie K. Brn. Altenburg!!

† A. cruentus L. Bierpflanze aus China Berwilbert S. S. \* A. caudatus L. Buffge Bierpflanze aus Amerita.

## 315. Polycnémum L.

691. P. arvense L. Canbig lebmige Meder, mit Cicherbeit tur in D, febr gerftreut. Bg. Springberg K.! Lubereborf; unter em Sagen K R. Meder nach Angern gu E.!! R. Reuenhofe!! D. beiliger Doch (ob hierher geborig?) Scht.

692. P. majus A. Br. Durre Bugel, nur F, besonders auf talt. C. Frohseiche Berge Eb.! D. Klingeberg bei Gullborf

?. Hartmann. Erreicht bier feine nördliche Grenze.

## 71. Familie. Chenopodiaceae Vent.

## 316. Chenopódina Mog. Tand.

693. C. maritima (L.) Mog. Tand. Radter Galgboben, nicht. läufig, aber fehr gesellig. E. Grabirwert bei Gr. Calze!! Coolfa-tal; Rothe Duble; Cohlen S. M. Gulborf!! Et. Am Wege nach foberburg!! Moor fublich ber Stabt!! Bedlingen Sp.

## 317. Sálsola L.

694. S. Kali L. Canbfelber, burre Bugel, febr gerftrent. C. Befterbufen; Coblide Berge S. Plotty Eb.! D. An ber Cibe ieffeit bes Berrentrugs Eb. Germifc an ber Rorbmeftfeite T.! und ei ber Buderfabrit Bns. !! Bg. Schermeniche Muble K.

#### 318. Salicórnia Tourn.

695. S. herbacea L. Radter Calgboben mit Chenop. maitima Mog. Tand., meift gesellig. G. Calze am Grabirmert!! D. Bullborf!! Et. Bei ber Caline Leopolbshalle!! Bedlingen Sp.

## 319. Chenopódium Tourn.

696. C. hybridum L. Baune, Dorfftragen, häufig.

697. C. urbicum L. Bie voriges, zerftreut. G. Grintemalbe; elbenau S. alte Fährel! Dornburg S. M. Rothenfee Bns. Beim Forsthaus Bürgerholz K. N. Planten!! St. Rathmannsborf!! 698. C. murale L. Wie voriges, häufig.
699. C. album L. Wegränder, Neder, fehr gemein.

700. C. opulifolium Schrad. Schuttftellen, felten.

Beim Babnhof!!

701. C. glaucum L. Dorfftragen, Galgboben, nicht felten, B. S. Soolfanal S. DR. Gullborf; Ofterwebbingen Bas. an ber Schrobe in ber Reuftabt!! Bg. Riegripp E.

702. C rubrum L. Dorfftragen, feuchte Meder, Ufer, häufig.

703. C. Bonus Henricus (L.). Dorfftragen, baufig.

704. C. polyspermum L. Lehmige Aeder, Gartenland, Uier, nicht selten. Brb. Walternienburg F. S. Buschäder; Kies am Elfufer S. M. Prefter S. Richters Gasthof!! Bieberitzer Busch!! B. Glindenberger Holz E. Bg. K.

705. C. Vulvaria L. Strafenpflaster, Zäune, zerstrent. Brt. Balternienburg E. S. Salze; hummelsberg Eb. Frohse; Besterhiffen S. M. Prester; Krakau S. Bg. Eisenbahn am Schartauer

Beg K. St. Beim Bahnhof!!

#### † Blitum Tourn.

† B. virgatum L. Gemisepflanze aus Gilb. Europa. Berwilbert S. Grünewalbe hinter bem Forsthause S. Brn. Steinbrücke bei Altenburg 1851 Sp.!

#### \* Beta Tourn.

\* B. valgaris L. In mehreren Varietäten auf schwerem Boben sehr häufig kultivirt.

# \* Spinácia Tourn.

\* S. oleracea L. In Gemufegarten häufig gebaut.

#### 320. Obione Gaertn.

706. O. pedunculata (L.) Mog. Tand. Nackter Salzboben, nicht häufig, aber sehr gesellig. S. Am Gradirwerk bei Gr. Salze Eb.! Soolkanal; Sohlen; Beienborf S. M. Sillborf am öftlichen Enbe bes Dorfes!! St. Nach hecklingen zu Bns.! Leopolbshalle!!

# 321. Atriplex Tourn.

† A. hortense L. 218 Bemije friiher haufig gebaut. Ber-

wilbert G. Rolonieftragen S.

707. A. nitens Sohk. Begränber, Ufer, sehr zerstreut. Brt. Am Saalufer bei Berlleiz westlich von ber Hähre S.l! M. Berberspite!! Rothensee im Pfarrgarten Ahlenstiel! Bg. K.! An ber alten Elbe zwischen R. und Bertingen T. St. An ber Oftseite ber Stadt!! Brn. Beinberge Bns.!!

708. A patulum L. Beg- und Aderrander, gemein. 709. A. hastatum L. Begrander, Dorfftragen, baufig.

b) salinum Wallr. Galgboten, verbreitet. G. Grabirmert bei Gr. Galge!! Cooffanal S. M. Gillborf!!

719. A. roseum L. Dorfftragen, gerstreut. S. Salze Eb. Hummelsberg; Doben S. Grunemalbe; Elbenan Eb. Ranban S. D.

Bechau!! Gullborf Eb. 2B. Fareleben!! Bg. Riegripp E. R. Raterberg!! St. Alt-Staffurt!! Brn. Balbau!! Altenburg!!

# 72. Familie. Polygonaceae Juss.

#### 322. Rumex L.

711. R. maritimus L. Ufer. Moorwiesen, gerftreut. Brb. Beit S. S. Rothe: Coolfanal; an ber Elbe S. M. Teich vor Rratau Bns. Bg. Riegripp S. Blumenthaler Weg K.

b) paluster Sm. (ale Art). Wie bie Sauptart, feltener.

D. An ber Rlinte bei Lemsborf S. Rothehorn Herrmann!

712. R. conglomeratus Murr. Gebiliche, Gräben, häufig, 3. B. S. Ronbelgraben; Grinewalbe S. M. Sternschange!!

713. R. obtusifolius L. Wie voriger, febr baufig. 3. B. Brb. Ronnei S. G. Frobje; Ranbau; alte Kabre S.

714. R. crispus L. Feuchte Biefen, Graben, gemein. 715. R. Hydrolapathum Huds. Graben, Ufer, baufig, 3. B. Brb. Un ber Ruthe S. G. An ber Chle S. D. Bieberiter Buich Bus. an ber Potstrine bei Gerwisch!! Bg. K. D. Meierweiben Scht. 716. R. sanguineus L. Feuchte Bebuiche, gerftreut. C.

Buichhaus; Grunemalbe S.

717. R. Acetosa L. Wiefen, gemein.

718. R. Acetosella L. Trodne Biefen, Brachader, Begranber, gemein.

# 323. Polýgonum L.

719. P. Bistorta L. Moorwiesen, sehr zerstreut. N. Be-bringen S. Moosbruch M. S. Süpplingen S. D. Eggenstebt S. 720. P. amphibium L. Gräben, stehenbe Gemässer, sehr

bäufig 721. P. lapathifolium L. Feuchte Aecker, Wegranber, Dorf-

ftraften, febr baufig.

722. P. Persicaria L. Graben, Balbwege, nicht felten. 723. P. Hydropiper L. Graben, Dorfftragen, nicht felten.

724. P. mite Schrk. Reuchte Stellen, Begranber, Graben,

felten. C. Grunemalbe S.

725. P. minus Huds. Wie voriges, nicht häufig. Brb. Cyprena; Briber Bufch Eb. G. Grunewalbe S. Bg. Bei Riegripp T.! D. Amtsgarten am Gool; Bruchgrabeninfel Scht. Ct. Bobe-Ufer, befonbers im Fabritgarten; Ganfefurt Scht.

726. P. aviculare I. Bege, Strafenpflafter, bochft gemein. 727. P. Convolvulus L. Meder, Gebuiche, febr häufig.

728. P. dumetorum L. Gebische, zerstreut. Brb. Damm bei Walternienburg E. S. Grünewalbe Eb.!! Randau Bns. M. Bechau Bns. Richters Gasthof!! Bieberitzer Busch!! W. Herrnholz bei Glinbenberg S. Bg. K. R. Rammstebt!!

# \* Fagopýrum Tourn.

\* F. esculentum Mnch. hier und ba gebaut.

# 73. Familie. Thymelaeaceae Juss.

#### 324. Passerina L.

729. P. annua Wickstr. Aeder, nur F, fehr felten. G. Gibfeite ber Frohfeschen Berge!! 1854 von Eb. entbedt. Erreicht bie Rorbgrenze.

### 325. Daphne L.

730. D. Mezereum L. Schattige Laubwälber, febr zerftreut. R. Bellenberge bei Bonnftebt S. D. hakel baufig!!

# 74. Familie. Santalaceae R. Br.

#### 326. Thesium L.

731. T. linariaefolium Gil. Sonnige Hügel, Riefermwälber, zerstreut. Brb. Siblich von Tochheim Dr. Mohs! S. Zenfer Berge bei ber Mühle; Frohseiche Berge S. zwischen Pretzin und Dornburg Eb.! R. Oberhagen E.! R. Kolbiter heibe M. S.

732. T. alpinum L. Wie voriges, fehr zerstreut. Bg. Bugel meftlich von ben Chausseetienen K.! (feit 1856 ausgerottet). R. Der-

hagen E.! besonbers am Junterweg!!

# Familie Elaeagnaceae R. Br.

# \* Hippophae L.

\* H. rhamnoides L. Zierstrauch, junachst an ber Stiete einheimisch.

#### † Elaeagnus L.

† E. argentea Pursh. Bierftrauch aus Norbamerifa. Berwilbert M. Giblich vom herrnfrug, febr gabireich!!

\* E. hortensis M. B. Rur

a) angustifolia L. (als Art). Bierftrauch aus Gilboft-Europa.

# 75. Familie. Aristolochiaceae Juss.

#### 327. Aristolóchia Tourn.

733. A. Clematitis L. Baune, Beden, Gebifde, gerftreut. Bahricheinlich urfprünglich nicht einheimisch. Brb. Am Amtsgarten in Rl. Rofenburg Eb. G. Rapitelbuich Eb.! Damm nach Ranies S. D. Berber E.! Bieberiter Buich am füblichen Ranb!! Bg. K. D. Amtegarten Scht. Brn. Milnchen-Rienburg Eb.

# 76. Familie. Empetraceae Nutt.

### 328. Empetrum L.

734. E. nigrum L. Balber, febr felten. Rur an ber meftli. den Grenze bei Gr. Bartensleben A. Muller. (Bon E. mitgetheilt.)

# 77. Kamilie. Euphorbiaceae Kl. u. Garcke.

# 329. Tithymalus Scop.

735. T. helioscópius (L.) Scop. Gartenland, Aeder, Dorf.

ftragen, febr banfig.

736. T. platyphyllos (L.) Scop. Triften, grafige Stellen. febr gerftreut. G. Elbbamm bei ber alten Sabre S. Ranies Eb.! St. 3mifden Rennborf und Rathmannsborf Bns.! Ganfemeibe meftlich von Rathmannsborf Bns. !!

737. T. paluster (L.) Kl. u. Garcke. Graben, Sumpfwiejen, nur A, häufig und verbreitet. Brb. An ber Saale; Chorena Eb. Walternienburg E. Dornburg Eb. S. Bor und im Bufch!! M. Rothehorn!! am Biederiter Bufch!! Bg. Deichwall beim Dunter Cee!! R. Aue E. D. Bulferftebt Scht. Bobethal von Tarthun bis St. Scht.

738. T. Cyparissias (L.) Scop. Sonnige Triften, trodne

Balber, febr baufig.

739. T. Esula (L.) Scop. Weg- und Aderranber, Triften, be-

fonbere M, gemein.

740. T. Peplus (L.) Gaertn. Gartenland, Baune, febr baufig. 741. T. exiguus (L.) Mnch. Meder, & febr baufig. 3. B. Dt. Budan!! Dobenborf!! Schnarsleben!! Rotheborn!! Et. Banfefurt!! Rathmannsborf Sp. !! fonft felten. Bg. K. R. E.

# 78. Muhilie ... Acalyphaceae Kling Garcke.

#### 3271 kilárióriam. 088rn.

mon742. Maperenniss L. .: Schattige Lanbwalber, Jehr gerftreut. D. Satel baufig!! Egeliche Forft:S. thin diegen rem dalmi 2. 743. M. annua L. Begranber, Bartenland, gerftreit. .. 3 Gr. Salzer Rirchhoft Bab Elmen im Gafthofsaarten S. D. Friebride Wilhemsgarten F. Hartman!! Subenburg, Meder neben bem Golbetenfirchhof S. Werber!! Bahrenborf Eb. Egeln: Rochftebt; Schneitlingen S. St. !! Brn. Beinberge S.!! Babriceinlich ursprünglich

#### 328. Empetrum L Familie Phyllanthaceae Kl. u. Garcke. S. \*\* \*\* Buxus L. Barens L. Bon E. mitgetbeilt.)"

disching the discriming of the carefae. A. Gareke.

# 79. Familie. 21 Urticaceas Endl.

733. T. holioscopino Tablitu. 318. riculant, Beder, Deife

"nell 744. Wiemrens L. Wegranber) Baune, Meder, gemein. 1. 745im U. di ojeca Lin Gebilfche, Balber, Banne, gemein. effon osioeround t. 332. Parietaria Tourn genneit irongie. &

sign 746 P. erecta Mauriki .Mauern, Baune, felten. B. Min ber Inneufeite ; ber, Stadtmauer Geigenmudler ti Debil Stadthauer von ber Domainerbis gum Silbischen Begrabnifplat granningelieb i. Reibeborn!! am Bieberiger Buid!! Bg. Deidmall beim Dunter

Eis midtr 80. Familie. Cannabaceae Endl.

enbort , neifer geinna Cannabis Touris. Bleir, febr baufig. 1 1 Dingatimal Lab Aus Affen famment ; an Baunen, Weblifden, nicht felten, vermilbert. intere M. gemein.

740. T. Peplus (L.) Grehmulfartetend, Janue, febr banfa. 741. T. exiguus (L.) Sylumulfartetend, febr banfa 1.8. U. 1 1711747. H. Lupukus Lio Wenchte Bebiliche, tenfreute E! Bufc: Grunewalbe S. D. Rothehorn'S. B. Gerenbolg bei Glindenberg S. Bg. K. Michellen Riera, 3. Abibl.

# 

#### \* Morus Tourn.

\* M. alba L. Stammt aus Affien; bier und ba angepflauzt.

# 81. Familie T Ulmacede Mirbel.

# 

Str. nint is 1 th Ha

748. U. campestris L. Walber, zerftrent, 3. B. G. Bufd; Grimewathe S. B. Berrenholz bei Glindenberg S. Bg. K. St. Unterholzer Berg!! D. Sgiel an ber Domburg einige prachtvolle Baume!! baufig angepflangt. Bulle b) suberosa Ehrh. Wes Grinewalben Eby 18 . A . ....

749. U. pedunculata Fougeroux. Balber, feltener. 16. Bufd; Grinewalbe S: Bg. Bilrgerholz K. 1. N. Bellenberge M. S. Säufiger angepftangt. idean Giring and Tornerra & E. Beiichen Politic and Truitmen

# Familie Juglandaceae D. C.

Familie Plattisanslgut Lestibondois.

\* J. regia L. Stammt aus Borberasien. Häufig angepflanzt.

# 82. Familie. Cupuliferae Rich.

Adoi H o.335 :: Fagus Tournum 7 . 18

750. F. silvatica Luo Laubmälber bäufig.

## TES. S. Tragillis A Engraph 336. Prafit, and well in cit

751. Q. robur L. spec. Bie vorige. ann 752.1 Qa vessiliflora Sme : Wie vorige, feltener del

\* S. babylonica L. France and Tree, Stateam. 700. S. amyed **AnnoT [sulvio]**co**TCC**. cit angehlang:

misn 3753. CdeAvellana Lit Gebilide, micht feltenten na . & \* Chubulosa Willd. Etammt aus Gubbentichtanb. Richt ner 751 x 753, S. alba x amygualtun. dirten in Garten.

#### 338. Carpinus L.

754. C. Betutus L. Balber, gerftreut. Brb. Grineberger

Bufch S. G. Bor Elbenau S. D. Bellenberge bei Dounftebt T.! D. Brandsleber Solg: Batel S. Baufig, befonbers gu Beden angepflangt; febr icone Eremplare Brb. Im Bart bei Dornburg !!

# 83. Familie. Betulaceae Rich.

#### 339. Bétula Tourn.

755. B. alba L. Balber, baufig.

756. B. davurica Pall. Balber, Moore, nicht fo baufig. S. Bmifchen Pretin und Dornburg S. bei ber Dannigtower Muble Eb. Bg. Burgerholg!! D. Brandsleber Dolg bei ber Biegelei Scht.

#### 340. Alnus Tourn.

757. A. glutinosa (L.) Gaertn. Feuchte Balber, Gumpfe,

febr häufig.

\* A incana (L.) D. C. 3m Gebiet wohl nicht einheimisch, fonbern nur bier und ba angepflangt. Brb. Grilneberger Forft; 3miichen Gobnit und Dornburg S. G. Zwischen Pretin und Dornburg S. M. Bieberiter Buich S.

# Familie Platanaceae Lestiboudois.

#### \* Platanus L.

\* P. occidentalis L. Zierbaum aus Norbamerita.

# 84. Familie. Salicaceae Rich.

## 341. Salix Tourn. \*)

758. S. fragilis L. Ufer, Balber, baufig, auch eben fo oft angepflangt.

759. S. alba L. Balber; an Wegen febr baufig angepflangt. \* S. babylonica L. Stammt aus Afien, Bierbaum.

760. S. amygdalina L. Ufer gemein, oft angepflangt. S. undulata Ehrh. Ufer, felten Un ber Bobe por Egeln S.! Angepflangt Dl. Un ber Berliner Chausee T.! Rach Wimmer 751 × 753. S. alba x amygdalina.

<sup>\*)</sup> Die Beiben bee Bebiete beburfen noch meiterer Brobachtung.

\* S. hippophaefolia Thuill. Gelten angepflangt. D. Un ber Berliner Chauffee bei ber Durchlagbriide S.!!

761. S. purpurea L. Feuchte Stellen, Graben, 3. B. G.

Bor bem Bufd!! Dicht felten angepflangt.

762. S. viminalis L. Ufer, Graben, gemein. ("Elbweibe".) Gebr bäufig gepflangt.

763. S. einerea L. Walbfumpfe, Wiefen, febr häufig, 3. B.

S. Nörblich von Frohse, westlich ber Eisenbahn S. Gommern S. M. Bieberitzer Busch Eb. Bg. S. R. S. 764. S. Caprea L. Balber, feltener als vorige. G. Bufch;

Grunewalbe S. M. Beinberg bei Ronigsborn T.! Bg. K.

Resperbuich!!

765. S. aurita L. Balbranber, Moorwiesen, gerftreut. G. Bwifden Bregin und Dornburg S. D. An ber Berliner Chauffee S. Bg. K. R. Seelenhau S.

766. S. repens L. Wie vorige. G. Bretin; Gommern S.

M. Alte Rlus Bns. R. Bagen M. S.!

b) argentea Sm. (als Art). Bg. Sungriger Bolf S.

c) leiocarpa Meyer. S. Gommeriche Forft S.!

# 342. Pópulus Tourn.

\* P. alba L. 3m Gebiet nicht einheimisch, aber an Begen u. f. w. häufig angepflangt.

\* P. canescens Sm. Desgleichen.

767. P. tremula L. Balber, nicht felten, 3. B. Bufch; Grune-

walbe S. M. Alt-Königsborn Bas. Bg. K.

\* P. nigra L. Bahricheinlich im Gebiet nicht einheimisch, fonbern an Begen, in Dorfern angepflangt. Gelten in Balbern. S. Buich S.

\* P. pyramidalis Rozier. An Chauffeen angepflangt. \* P. monilifera Ait. Desgleichen. Aus Nordamerita.

\* P. balsamifera Ait. Aus Norbamerita. Buweilen als Bierbaum J. B. G. Königeftraße S. M. Friedrich-Bilhelmegarten S.

# B. Monocotylédones.

# 85. Familie. Hydrocharidaceae D. C.

## 343. Stratiótes L.

768. S. aloides L. Gumpfe, Graben, zerftreut. Fehlt in R. Brb. Poleimuble; Babes Eb. G. Elbenau; Finn S. M. Bechauer See; Rotheborn; aut Bieberiter Bufch S. am Rlusbamm Eb. 28. Samswegen S. Bg. Rothe Mühle K. R. Mite Dhre; Freifdut M. S. Q. Sabmereleben; Rublachen an ben Meierweiben Scht.

resignation) mismag ... Hydrocharts Louise !! don's mes nos 769. H. Morsus ranae L. Graben, ftebenbe Bemaffer, gerfreut. Brb. Coprena; Briger Bufch; Babes Eb. C.-Rothe Eb. Grunewalbe S. Blogty im Reffelteich Eb. .. D. Bechauer: Gee Buz 2B. Samswegen!! Bg. Gütteriches Moltenbruch K. D. Alte Dbre: Freifdit M. S. D. Rublachen bei ben Meierweiben unweit Sabmersleben Schte !!! nradeningte ied pebem. 25 39.

# Somilie. Alismaceae Juss.

A nromane inierelt 345. Alisma L. nogen 2 167 770. A. Plantago L. Simpfe, Graben, Ufer, gemein.

# Sagittária I. agranga 346. Sagittária I. agrango of Co

771. S. sagittaefolia L. Gräben, Silmpfe, haufig, 3. B. Brb. Cyprena; Friger Bufch Ebil S. Griffrewalbe S. M. Bechauer See Bns. Brefter Win Ba. Bble unterbalb ber Ctabt K. . R. Mite Dbre M. S. D. Faule Gee bei Gröningen; Meierweiden Scht.

# 87. Familie. Butomaceae Rich.

# der in der eine beiter auf 347. Butomus Tourn, ... angen in Beitern, ungen an 28 gen, in Beitern,

772. B. umbellatus L. Wie vorige, nicht felten, 3. 3. 3. Buid : Ranbau . . . . M. Gifenbuhnteich im Friedrich-Wilhelmsgarten Bus. a Bauf Kr. out out mediclass I and arvilligan 9 \* tine theream rita. Bureliten als

# 88. Familie. Juncaginaceae Rich. mnan 1

#### 348. Triglóchin L.

773. T. maritifia L! Billen; befinbers follhaltige, gerftreut. 3. Rosenbaum! G. Am Grabirmert!! Sooltangl; Doben; Beleleben S. Da Sittoor, Beforbets an bet Gillgett filbbafic won Brefter T. D. Krottorf bei ber Biefenmuble Scht. Ct. Scht.

774. T. palustrie Il. Dederiviejen, nicht felten. 3. Bor bem Reibethorth Butrichan! Brb. Smi fauren Beit: awifden Batternienburg und Boleimühle S. II. S. Soolfanal; Bullenwiefe S. Dornburg Eb. uM. Guboftlich von Brefter T. Bi Bwijden Camewegen und Lindborft!! Bg. K. Gifen!! R. Krohnens Rub M. Sil ifcmarger Pfuhl M. S.

350. Ruppia L.

# as anili ri89. Familie. Potamiae Juss. A . 177

349. Potamogéton I. 775. P. natan's L. Mettheribe Gewaffer, febr baufig. 776. Puflicitans Rothon Bache, felten. Bu Ruthe beite Butbuttige Geneuffer, geneine. E. eine Eafge beim Graffen, mmedet

b) spathulatus Schrad. (ale Art). D. Walte Bobe bei S. Einblunfale bei Geneffa A.t En Gracen 1.8 froderdinite

777. P. alpinus Bath. S Stehenbe und langfam fliegenbe Gemaffer, nicht baufig. 3. 3m Teich ber erften Mitte norblich ber Stabt!! Bg. Rulgauer Dublteich Bns. !! Parchauer Gee K.

778. P. graminens L. Moorloder, Torfftiche, felten. Bg.

hungriger Wolf Bas. !!

779. P. labon & L. Stebende und langfam fliegende Gemaffer, nicht felten. Brb. See bei Gr. Rofenburg Eb. Balternienburg E. Dornburg S. M. Bechauer See S. Mittel-Cibe!! D. Gifenbahngraben; alte Bobe bei Guntbereborf Soht. Brn. Gareke. 197

780. P. perfoliatus L. Wie voriger, 3. B. Brb. Teich Bei Dornburg S. A G. Röthe S. Gibenau Eb. ant Bedauer Gee S. Bg. K.1 D. Alte Bobe bei Giinthersborf Soht. 1111 I. 2017

ams 781. P. erispus: Lan Wie borigerung. 28.53. Ruthell ac Brb. Balternienburg E. G. Graben am Grabirwert Eb! Rbthe: Grinewalbe S. M. Mittel-Elbe!! Gulge bei Buday Bns.

782. P. compressus L. Wie boriger, nicht häufig. Bg. Rirdmaffer K. Du Gunthersborf Schtinll musomar .2. 39

2783. P. acutifolius Lk. Graben, nicht häufig. Mi Rothe borne S. . B. Teich bei Samswegen St. iar ; billink inn gia 5 30

784. P. obtusifolius M. u. K. Stehenbe Gewaffer, felten.

M. Bechauer GeenSit pepirar siet Bert Nalquite & . 785. P. pusitius L. Graben, nicht felten, 3. 8. Brb. Dorifburg Eb. G. Gr. Galge nebett bem Grabirmert S. Gibenan Eb.

M. Chle bei Bieberit BasmoBg. Kirchwaffer K.a isd undaloret. D 786. P. trichoides Cham. u. Schl. Stebenbe Gemaffer, fetten : 23. Jersleben im Ruft bei ber Schleufen Broud in . de?

1. 787. P. portinatus Laire Fliegenbe und ftebenbe Gemaffen Brb. Dornburg Eb. G. Coolfanal; Grunewalbe im Teich am Bege nach ber alten gabre S. Bg. Rirchwaffer; Parchauer Gee K. Brn. Bobe bei Minchen-Nienburg Sp.

b) scoparius Wallr. Salzhaltige Bache. M. In ber Silfze bei Dobenborf Prof. Braun!

## 350. Rúppia L.

788. R. maritima L. Salzhaltige Gemaffer, fehr felten. St. Bei ben hungerquellen am Löberburger Bege Roehl!

#### 351. Zannichéllia Micheli.

789. Z. palustris L. Stehenbe und sließenbe, slife und salzbaltige Gemässer, zerstreut. S. Gr. Salze beim Grabirwert Eb.! M. Lemsborf im Teich und in ber Klinke; Diesborf in ber Schrobe S. Puhlmible bei Gerwisch K.! St. Graben bei hecklingen S.

790. Z. pedicellata Fr. Salzhaltige Bache, felten. M

Sullborf in ber Gulge Bns.!

# 90. Familie. Typhaceae Juss.

## 352. Typha Tourn.

791. T. angustifolia L. (ex p.) Graben, Sumpfe, zerftreut. Brb. Coprena Eb. Babezer Teich S. S. Eijenbahngraben; Doben S. M. Eijenbahnteich im Friedrich-Wilhelmsgarten Bns.

792. T. latifolia L. Wie vorige. Brb. Babezer Teich S. S. Zwijchen Gr. Salze und Al. Müblingen; Frobse S. B. Sams-

wegen!! Bg. Unter bem Sagen K.

### 353. Spargánium Tourn.

793. S. ramosum Huds. Gräben, Sümpfe, stehende Gemäseler, häufig, 3. B. Brb. Coprena; Iriter Busch Eb. S. Zwischen Gr. Salze und Kalbe; vor Besterhüsen; Grünewalde; vor Dornburg

S. M. Bechau Bns.

794. S. simplex Huds. Wie voriges, nicht selten, z. B. Z. Butterbamm S. Brb. Babez Eb. zwischen Göbnitz und Dornburg!! S. Grünewalbe S. Elbenau Eb. M. Neben ber Berliner Chaussee! W. Jersleben bei ber Schleuse; Samswegen S. Bg. K. St. An ber Bobe Eb.

795. S. minimum Fr. Torffitmpfe, febr gerftreut. G. Prebin bei ber Mittelwiese S.II Bg. hungriger Bolf K.II G. Kobbel E.I

# 91. Familie. Lemnaceae Lk.

#### 354. Lemna L.

796. L. trisulca L. Grüben, stehenbe Gewässer, gemein. 797. L. polyrrhiza L. Wie vorige, häufig, 3. B. S. Ronbel; Belsleber Graben Eb. S. Grünewalbe S. M. Pechauer See Bns. B. Samswegen Bns. Bg. Kirchwasser K.

798. L. minor L. Wie vorige, gemein.

799. L. gibba L. Wie vorige, nicht häufig. S. Ronbelgraben; Gr. Salze neben bem Grabirwerk S. M. Pechauer See Bns. Bg. Kirchwasser K.

# 92. Familie. Araceae Juss.

#### 355. Arum L.

800. A. maculatum L. Feuchte, schattige Laubwälber, sehr zerstreut. R. Unterholzer Berg E.!! Unterhagen E.!! R. Bapenberg M. S. Ronnenspring M. S.! Zernih M. S.! Schwarze Pfuhl S. Wellenberge bei Dönnstebt M. S.! D. Hatel Soht. Egeln: Zwischen Tarthun und Unseburg Scht.

#### 356. Calla L.

801. C. palustris L. Torffümpfe, febr gerftreut. 3. Butterbamm!! Brb. Zwifden Göbnig und Dornburg im Erlensumpf fparlich S. R. Schwarze Pfuhl Bns.!

# 357. Acorus L.

802. A. Calamus L. (ex p.) Gräben, Ufer, zerstreut, aber sicher einheimisch. B. Butterdamm S. Brb. Poleimühle S. zwijchen Gödnitz und Dornburg S.!! Teich bei Dornburg S. Bg. Rothe Mühle; Bulshagen-Mühle K. R. Ohre; Freischitz M. S. Egeln: Unseburg Scht. St. Gänsefurt; Athensleben Scht.

# 93. Familie. Orchidaceae Juss.

#### 358. Orchis L.

803. O. purpurea Huds. Bergige Laubwälber, nur F, fehr Berftreut. D. Brandsleber Gold unter Prunus spinosa auf bem Berge, auf welchen ber Weg von ber Biegelei fioft S. Sauerholy bei

Schermte Eb. Satel: Bafferthal !! Bog S.

804. O. drid dwiede Scop. Somige Strgel, trodne Biefen, nur &, felten. G. Frobieiche Berge narblich vom Dobenborfer Bege S. M. Schnardleben, Wieje fronden bem Dorf und ber Chauffee E. I feit 1856 burch Umadern ausgerottet.

805. O. coriophora L. Magig fenchte Wiefen, felten. Brb. Diebziger Brud Rindfleisch !! R. Moosbrud M.S. 11 D. Bwijden

Bornhaufen und Bulferftebt an ben Stegen aufwarts Schtiel

806. O. Morio L. Tredne Sugel, Balber, Biefen, gerftreut. G. Frobjeiche Berge Eb: Cobliche Berge & . Di : Fucheberg bei Schnarsleben!! Bg. Dlojer S. Wiese beinber Kilkauer Mühle!! bein Deichwall S. R. Um Dberhagen!! It. Dioosbruch : Erbte : Gagen M. S.

807. O. mascula L. Wiesen, lichte Balber, febr gerftreut Ba. Deidwall S. 1 (Babifdelfilid burd Bodivaffer berabgefdmemmt) D. Brandsleber Sols S.1 Salel; Domburg!! 3mifchen Bedlingen Et und Neundorf Scht.

808. O. laxiflora Lmku Cumpfwiefeng febr gerftreut. C. Doben S. R. Moorwiesenbor bem Bagen Ed DU Krottorf Side. St. Rach Sedlingen und bem Dofenberge gur Sohrungit . Al grad

11: 809. : O. maculatalle . Diefen, Voumpfrimber, gerftreut. 3 3mifden Lujo und Jutrichau!! Brb. Birten bei Baben is. : 2mifden Balternienburg und Poleimühle!! E. Zwifden Bretin und Dornburg S. Ba. Springberg S. Horbofflit am Burgerboly!! lenbau; Unterhagen: Sinorblich bom Bathen !! . D. Bapenberg ! Bernit M. S. D. Brandsleben Boly B. Cauerholy Bon Satel !!

810. O. latifolia L. Biefent nicht feltenmid 5 30

811. O. incarnata L. Wiefen, zerftreut. Brb. Dornburg und Gobnit S., C. Bullenwiese; vor Bretin; groijden ber Blottver Biegelei und b. Bilin'S. M. An ber Berliner Chauffer bieffeit ber Friedrich - Wilhelmsbrucke febr eingelntlit) . nordlich von Berwifd !! Bam Bungriger Bolf !! Geeleithau Sim Bathen T! St. Wiefen unter benu Dofenberge Bne.1 2 gruffig C dun bing Line Bulibager Hob

# 359 Gymnadenia R. Br.

812. G. conopéa (L.) R. Br Mäßig feuchte Wiejen, jerftreut. Bg. Detershagen K. amilden bem Burgerhol; und Rejen & R. Unterhagen S. Ramimftebl daf ber langen Wiele El norblich von Bathen auf Feldwiesen!! R. Moosbruch; Erbte M. S.

<sup>&</sup>quot;) 30 fant bort 1853 nur gweit Gremplare, bie beibe fant bollig ungerheilte Rnollen hattenun anderen and Them I bellit i. G. 1995 anten bette ungerheilte

### 360. Planthatera Rich.

813. P. bifolia (L.) Rebb. Laubwalber, febr gerftreut. 2. Butterbamm S. Bg. Blirgerholg nordwestlich vom Ererzierplat S. R. Rammftebt!! n. Butterwintel bei Neuenhofe; Schwarzer Pfuhl M. S. D. Branbeleber Bolg; Cauerholg; Batel Eb.

814. P. montana (Schmidt) Robb, fill Wie vorige, feltener.

3. Friedrichsbolg!! 'R. Oberhagen am Junterwege Bns. !

815. P. viridis (L.) Lindl. Balbwiefen, felten. lich von Bathen! von Bns., F. Hartmann und T. 1858 entbedt.

# 361. Qphrys L.

816. O. musoifera Huds. Raltberge, Gebijde, felten. D. Satel an ber Domburg E.t Ganfefurt im Bufch Bns. Rathmannsborfer Bart Garcke.

# 362. Epipactis Haller, Maria Zuge

817. E. Helleboripe (L.) Crtz. Schattige Balber und Bebuiche, gerftreut. Brb. 3m. Gornis u. Dornburg S. G. Grunemalbe nach Elbenau bin und vor ber alten Rabre S. D. Bieberiter Buid Bg. Beibbau im Burgerholz K . R. Batel M. S. D. Branbsleber Bolg: Brrtamp vor ber Biegefei; Batel: Bafferthal Scht. am Rochstebter Beg Eb.

818. E. palustris Crtz. Moorwiefen, fehr gerftreut. G. Bullenwiefe S. R. Biefen jepfeit Angern E.I. (Am norblichen guß bes

Landsberges E.!!) D. Breite Bleet Scht.

# 363. Listéra R. Br.

819. L. ovata (L.) R. Br. Schattige, feuchte Bebuiche, Sumpfranber, gerftreut. G. Bens S. Doben Eb. gwijden Bregin n. Dornburg baufig Eb. 1 De Un ber Chauffee nordlich von Gerwifch!! Bg. Beibhau K. R. Sagen E. Unterholzer Berg!! R. Benit M. S. D. Brandsleber Solg S. Satelft

# 364. Neóttia L.

820. N. nidus avis (L.) Rich. Schattige Laubmalber, gerfreute: B. Friedrichebola!! R. Unterhagen S. Resperbufch !! Ramm's ftebt!! R. Benit; Papenberg M. S. Donnftebt S. D. Branbsleber Sola F. Reinecke. 370 Polyeonatum Tourn.

8210 S. spiralis (L.) C Koch. Rurzbegraste Triften, felten. Brb. Poleimuble S. R. 3w. Angern und b. Budtum H. Engel! .:

## 366. Cypripédium L.

822. C. Calcoolus L. Laubwälber, nur F, febr felten. D. Brandsleber Bolg Scht.

# 94. Familie. Iridaceae Juss.

#### 367. Iris L.

823. I. Pseudacorus L. Sumpfranber, Graben, Ufer, febr baufig.

324. I. sibirica L. Biefen, sehr zerstreut. M. Wiese am nörblichen Enbe bes Bieberiter Busches an ber Chle einzeln T.! Bg. Deichwall öftlich vom Deichwärterbause K. R. Erbke E.!

# 95. Familie. Amaryllidacene R. Br.

#### \* Narcissus L.

\* N. poëticus L. Baufige Zierpflanze aus Gubbeutichlanb.

#### 368. Leucosum L.

825. L. vernum L. Schattige Laubmalber, felten, aber ge- fellig. R. hagen M. S.

#### \* Galanthus L.

\* G. nivalis L. Baufige Zierpflanze aus Gub- und Ofi-

# 96. Familie. Smilacaceae R. Br.

## 369. Paris L.

826. P. quadrifolius L. Schattige Balber, zerftreut. Brb. Rosenburger Busch S. B. Barleber Busch Ahlenstiel! Bg. Rordsöflich vom Kirchwasser K. Bürgerholz bei ber großen Buche S. R. Unterhagen!! R. Bellenberge bei Dönnstebt M. S.! D. Brandsteber Holz Scht. St. Gansesurer Busch Scht.

#### 370. Polygónatum Tourn.

827. P. officinale All. Trodne Balber, felten. R. Oberhagen!! Rammftebt!! R. Donnftebt Eb. D. Branbeleber Dolg; Datel Eb. 828. P. multiflorum (L.) All. Schattige Laubwälber, zersftreut. Z. Friedrichsholz!! Bg. Bulfhagen; Bürgerholz S. R. Oberhagen!! Rammstedt!! N. Butterwinkel!! Hagen M.S. Dönnsstedt S. D. Brandsleber Holz; Hakel S. Egelsche Forst S. St. Gänsefurter Busch S.!!

#### 371. Convallária L.

829. C. majalis L. Trodne Laubwälber, zerstreut. 3. Friebrichsholz!! Brb. Grüneberger Forst S. M. Bieberiger Busch Eb. Bg. Wulfhagen; Bürgerholz S. R. H. H. Butterwinkel!! Hagen M. S. Wellenberge bei Dönnstebt S. D. Brandsleber Holz S. Sauerholz Eb. Hatel!! St. Sanfesurter Busch S.

#### 372. Smilacina Desf.

830. S. bifolia (L.) Dest. Schattige Wälber, Sumpfränber, nicht selten. 3. Butterbamm!! Friedrichsholz!! Brb. Zw. Walternienburg und Poleimühle S. S. Zwischen Prehin und Dornburg S. Bg. K. R. Kesperbusch!! Rammstedt!! R. Butterwinkel!! Sauersholz Eb. Moosbruch; schwarzer Pfuhl; Hagen M. S. Dönnstedt S. D. Brandsleber Holz S. Hakel!!

# 97. Familie. Liliaceae D. C.

# † Túlipa Tourn.

† T. silvestris L. Im Gebiete nicht einheimisch, sonbern nur angehflanzt und verwilbert. M. Friedrich-Wilhelmsgarten Eb.!

#### \* Fritillaria L.

\* F. imperialis L. Säufige Zierpflanze aus Borberafien.

#### 373. Lílium L.

\* L. bulbiferum L. Saufige Zierpflanze aus Mittelbeutsch-

\* L. candidum L. Desgleichen aus bem Drient.

831. L. Martagon L. Laubwälder, fehr gerftreut. R. Belslenberge bei Donnftebt S. Forsthaus Giche M.S. D. Brandsleber Solz S. Sauerholz Eb. hatel fehr häufig!! Gelten in Garten.

#### 374. Anthéricum L.

832. A. Liliago L. Kiefernwälber, sonnige Silgel, zerftreut. S. Zwischen Randau und ber Kreuzhorst; Plötty; Streitheibe bei Gommern S. zwischen Pretin und Dornburg Eb.! M. heproths-

berge Eb: Bg. Grabaner Forft; weftlich von ben Chanffee Rienen K. ! R. Begrabnifiberg E. Rammftebt!! D. Brandsteber Sols Scht 833. A. ramosum L. Bie voriges. 3. Friedrichsbolg Eb. S. Frohjefche Berge; Streitheibe S. Bg. Rillan E. Grabauer Forft K.! R. Sinter bem Sagen E. zwijchen Rammfebt und Schride!! R. Rolbiger Beibe fublich von Planten!! De Branbeleber Bola: Das tel: porberer Schmerlenteid, Boff, Steinwegsbau Scht.

# 375. Ornithogalum L.

834. O. umbellatum L. Wiefen, Grasplate, besonbers im Eibthal haufig und gesellig. G. Frobser Wiefen Eb. Wefterhusen im Gifenbahngraben; Damm gwifden ber Elbe und Glinbe S. D. Bestliches Glacis ber Stornichange Toll Capfanabe por bem Ulrichs thot beim Opmnafial - Turnplat E. Bogelgefang T.1 Rothebern Wiesen!! Wiesen neben ber Berliner Chaussee!! norblich vom Berrnfrug T.! Ct. Fabritgarten; Mublenbamm Scht.

† O. nutans L. Stammt aus Gud-Europa; jest in Garten und an Baunen verwilbert; im Gebiet felten. Dt. Werber E.f. D.

Somannider Garten vor bem Magbeburger Thore Scht.

376. Gágea Salisbury.

835. G. praten si's (Pers.) Schuft. Meder, Gebijiche, baufig. 836. G. arvensis (Pers.) Schule Wie vorige, weniger bar-fig, 3. B. S.; vor Bömmette S. M. Zuderbusch Bns. Königsborn T.I. R. Bor bem Oberholz M. S.

837. G. saxatilis Koch. Steinige Abbange, febr gerftreut. S. Summelsberg Eb.! Frobjejde und Referenberge S. M. Rugel- fange auf bem Krafauer Anger E.7 Brn. hanfig Sp.!

... 838. G. minima (L.) Schuft. Godattige Lauhmalber, felten. M. Am Bestrande des Bigberiber Buiges 1858 T.! R. Bellenberge bei Donnstebt 1857 Bat.!

839. G. silvatica (Pers.) Loud. .. Schattige, feuchte Balber, nicht felten. Brb. Boleimuble S. G. Bufd S. Grunewalbe am Rade tigallenfteig! D. Bogelgefang: T.1 Bieberiber Bufch E.1 Beinberg bei Ronigsborn Ti! Bg. Deichwall Dk.t R. Unterholzer Berg; Rapellberg E. M. Althalbensleber Garten; Bellenberge T. 1.

# 3741 Aufilla ic 776 L.

... 840. A. ursinum L. Laubwalber, felten, aber gefellig. 

841. A acutangulum Schrad. Biefen und Triften, nur I,

giemlich verbreitet und gefellige Brb. Biefe zwifdett ber Stabt und ber Ueberfahrt !! Gaalwiejen bei Rt. Mojenburg Eb. G. Bor bein Buid !! Grinewalde Eb. D. M. Prefter E Rotheborn-Biefen !! an ber Elbe füblich vom Berrnfrug!! an ber Chauffee publich von Gerwifch!! Bg. Beftlich am Barchauer Gee K. R. Schmudsborf E. D. Bruch öftlich an ber Gifenbahn Sche. Egeln: gwifden Tarthun und Unfeburg Scht. St. Rach bem Schlenberge gu Sehtern T.

842. A. fallax (Don.) Schult. Connige Sigel, trodne Balber, febr gerftreut. Graffohjeiche Berge S. ODE. Rolbiger Linden!!

\* A. sativum L. In Gemufegarten gebaut.

mbien A. Porrum L. Desgleichen, baufig. 843. A. sphaerocephalum L. Reder febr felten. Ct. Weitlich bon Remborf einign 1858 Bus. !

844. A. Vineale L. Connige Bigel, Meder, Begranber, gerftreut. Brn. 3wijden Ramerit und hoben-Lepte S. G. 3mijden Pretin und Dornburg!! Rreughorft!! Dl. Rotheborn!! fublich vom Bieberiter Bufch!! Deprotheberge Eb. 2B. 3mijden Camemegen und Lindhorfell Bg. All M. Uhterholzer Berg! R. Bactofenberg; Bernit; Bellenberge M. S. D. Emmersberg am sublichen Abhange

Scht. Brn Eb

modi845mA S. ciorio d o pria su m. IL. ii Braben f Bebilfche . Raune, besonbers M, nicht felten. Brb. An ber Caalfahreibei Bertleig!! Rojenburger Bujd!! G. Bens; Bujdis. .. Grünemalbe Ebl Areusborft !! De Brefter !! Rotheborn !! am Bieberiten Buich!! nordlich von ber neuen Deuftabt am Anfange ber Deubalbensleber Chauffee !! 11 92 Unterholzern Berg Hint D. Berottori, im; Dublenhotz; Batel Seht. 15619

846. A. oloracelum L. Gonnige Bilgel; trodne Balber, Gebillde gerftreut. B. Stabtmauer an ber Gubfeite!! iGJ. Biefe bei Bens; Bufde; Frobieiche Berge, S. Grüntewalde !!! Kreughorft !! Di. Am Bieberigen Bufchll unBg. Rorblid bon Gibermen ann ber Chauffee!! Deichwall i.K. R. BellenbergenMi Sin Di Brandeleber Sola iEb. St. ber Grenbahn und eftlich vem Wege nach Bard add. stildlafedtaft

847. A. Schoenoprasum L. Chbwiejen, febr igefelig. ich Bei ber Babeanftalt S) Gagebuich bei Glinbe | Eb. Glbufer bet Ranies S. Bretin gegenüber Eb. Dt. Rotheborn!! Rommanbantenwers berll Wiefen füblichtl; und nörblich vom hefrntrug: Til Al. Comudeborf E. i Saufig in Gemiljegarten igebaut' aun prue'n inibitel nicht A. Ascalonioum. E. Bur Bemijegarten gebaut. A niert

Ball Dintratus I. zugaraden, 378. a. 378. Beeneiclen, ger-

1848. A. altilis (Li) Aschs. : Erveine Biefent : Abhange suben

fonders in der Rähe der Elbe, zerstreut. S. Kapitelbusch Eb. M. Rothehorn Eb. zwischen der Friedrichstadt und dem Herrntrug!! Bg. Elbstrand bei Blumenthal K. R. Schmudsborf E. R. Badesenberg M.S. Häufig gebaut.

# 98. Familie. Colchicaceae D. C. 379. Cólchicum Tourn.

849. C. auctumnale L. Feuchte Wiesen, sehr zerstreut. M. Fermersleben Eb. Dobenborf Eb. R. Wehlitz E.! N. Zwischen Süpplingen und bem Hagen M.S.! D. Am Brandsleber Holz; He tel S. St. Am Gänsefurter Busch S.!! zwischen St. und Hedlingen S. Brn. Kleine Aue Sp.! Saalwiesen unterhalb Minchen-Nienburg, Weblitz gegenüber!!

# 99. Familie. Juncaceae Bartl.

#### 380. Juneus L.

850. J. conglomeratus L. Feuchte Triften, Sumpfrander, Graben, gemein.

851. J. effusus L. Wie voriger.

852. J. glaucus Ehrh. Grüben, Sumpfränder, besonders auf Lehmboden häufig, 3. B. Bullenwiese!! M. An allen Wegen des Stadt- und Renstädter Felbes zwischen bem Ulriches und Krödenthor!! Bg. hungriger Wolf!! Gusen!! R. Unterholzer Berg!!

853. J. filiformis L. Moorwiesen, felten. Bieber nur an ber Grenze bes Gebiets: 3. Wiese bei Iltrichau nörblich b. Chauffeell 854. J. capitatus Weigel. Keuchte Sanbplate, febr gerftrent.

854. J. capitatus Weigel. Heuchte Sandplage, sehr zerstrent. Brb. Zwischen ber Poleimühle und Kämerig Bns.! Bg. Süblich von ber Eisenbahn und östlich vom Wege nach Parchau K. R. Zwischen bem Bucktum und Wendborf E.!

855. J. articulatus L. Sumpfe, Gruben, Triften, febr gemein.

856. J. silvaticus Reichard. Moorboben, zerstreut. Brb. Zwischen Balternienburg und Poleimühle S. S. Zwischen Plotth und Pretzin S. Schlofbruch bei Gommern Eb. zwischen Pretzin u. Dornburg S. M. In einem kleinen Sumpf bei Richters Gasthof T.!! Bg. Dungriger Wolf S.

857. J. atratus Krock. Feuchte Triften, Moorwiesen, ger-ftreut. S. Pretin auf ber Mittelwiese; zwijden Bloth und Bilm S.

Dt. Klusbamm S. fliblich!! und nörblich von ber Berliner Chauffee jenseit ber Durchlagbriide!! St. Rother! ob noch jest gu finben?

858. J. obtusiflorus Ehrh. Torffumpfe, Moorwiesen, febr gerftreut. Brb. Babeg bei bem Arbeiterhaufe S. !! Bg. Sungriger Bolf Bus. !!

859. J. supinus Mnch. Moorwiesen, Sumpfranber, gerftreut. Brb. Zwifden Ramerit und Babes Bns.! G. Bretin Eb.! D. 3mifden bem Richterichen Gafthof und Konigeborn T. Ba. K. R. Schwarzer Bfuhl M. S. !

860. J. squarrosus L. Moorboben, feuchter Balb, gerftreut. 3. Butterbamm!! Bitricau!! Brb. 3wifden Balternienburg und Boleimuble S.!! Babes S. G. Gommern Eb. zwifden Bretin und Dornburg S. M. Zwifden bem Richterichen Gafthof und Ronigsborn T. Bg. Springberg K.I D. Sagen M. S. fcmarger Bfubl E.!

861. J. compressus Jacq. Biefen, Graben, feuchte Begranber, febr häufig, 3. B. G. Grinewalbe S. Dt. 3mifchen bem Richterichen Gafthof und Königsborn T.! Bg. Gujen!!

862. J. Gerardi Loisl. Feuchte, falzhaltige Triften und Wiefen, zerftreut, aber gefellig. G. Coolfanal S. M. Gullborf!! filb. öftlich von Brefter Eb. St. Scht.

863. J. Tenagea Ehrh. Feuchter, fahler Lehmboben, felten. D. Bei ber letten Biegelei norblich ber Berliner Chauffee T.!!

864. J. bufonius L. Feuchter, fahler Boben, Graben, gemein.

#### 381. Lúzula D. C.

865. L. pilosa (L. ex p.) Willd. Schattige Balber, gerftreut. Glinbenberger Bolg Eb. Bg. Springberg K. Bulfhagen S. Bürgerholz: Wehmerlate K. R. Resperbufch!! Rammftebt S. R. Sagen M. S. Bellenberge bei Donnftebt S. D. Branboleber Bolg S. Satel!!

L. angustifolia (Wulfen) Gke. Schattige Balber. D. Berrnfrug 1853!! in einem Eremplar gefunden; ichwerlich bort einbeimisch.

866. L. campestris (L.) D. C. Trodne Bugel, Balber,

gemein.

b) multiflora Lej. (als Art). Moorwiesen, ichattige Balber, Berftreut. 3. Eb. Brb. Poleimuble S. G. Erfte Moorwiese amifchen Bretin und Dornburg; Schlofbruch bei Gommern S. R. Resperbuich!! Rammftebt!! R. Wellenberge M. S. D. Satel!!

# 100. Familie. Cyperaceae Juss.

# 382. Cyperus L.

867. C. flavescens L. Feuchte, moorige Stellen, febr zerstreut. 3. Bor bem Heibethor!! Brb. Poleinnihle nach Kämerit zu E.! zwischen Göbnit und Dornburg S. R. Schwarzer Pfuhl, selten E., M. S.!

868. C. fuscus L. Kahler, feuchter Boben, Moor, Ufer, zerstreut. Brb. Buschrand öflich von Walternienburg S. S. Zadsmünde an frisch aufgeworfenen Gräben S. M. Rothehorn Elbbuhsnen Bns.! Bg. Graben der Nachtweide Dk.! Heidhau im Bürgerbolz K. N. Hagen; schwarzer Pfuhl E., M. S.! D. Gürgenlache; Grüben nach der Sanneföhrbrücke Scht.

### 383. Cládium Patrick Browne.

869. C. Mariscus (L.) R. Br. Torffümpfe, felten. Bg. Sungriger Bolf Bns.!!

## 384. Rhynchóspora Vahl.

870. R. alba (L.) Vahl. Torffümpfe, nur D, sehr zerstreut. Brb. Poleimühle E.! Bg. Springberg K.! R. Schwarzer Psubl M. S.!

#### 385. Heleócharis R. Br.

871 H. palustris (L.) R. Br. Sümpfe, Graben, Wiesen, Siefen, febr häufig.

872. H. uniglumis (Lk.) R. u. Schult. Geltener. Bisber

nur St. Scht. beobachtet.

873. H. acicularis (L.) R. Br. Sumpfränder, Gräben, nicht selten. Brb. An der Ruthe vor Walternienburg S. S. Weidenwerder bei Grünewalde S. M. Neben der Berliner Chausse in Gräben!! Teich an der Südwestecke des Biederitzer Busches S. Bg. An der Ihle sidlich von Neuenzinn K. Güsen nordwestlich von der Eisenbahnstation!! D. Gröningen im faulen See; Espenlache Scht.

# 386. Scirpus L.

874. S. pauciflorus Lightf. Moorige Triften, Balbwege, gerftreut. Brb. Babez beim Arbeiterhause Eb.!! Bg. Bürgerholz auf bem Wege zwischen bem Forsthause und ber heibhau S. Gujen nordweftlich von ber Station!! nordweftlich von hohenseeben!!

875. S. setaceus L. Sumpfrander, feuchte, moorige Stellen,

zerstreut. Brb. Kämerit; zwischen ber Poleimühle und Babez; zwischen Göbnitz und Dornburg S. S. Zwischen Plötzt und Pretsin S. Bg. Hungriger Wolf S. Schermensches Erlenbruch; Heibhau K. R. Unterhagen E.! Schernebed E. D. Emmersberg Eb.

876. S. lacustris L. Graben, Gumpfe, ftebenbe Bemaffer,

gemein.

877. S. Tabernaemontani Gmel. Wie voriger, feltener, besonders in falghaltigen Gemäffern. Brb. Eb. G. Ronbel; Gooltanal; Gifenbahngraben S. am Grabirmert bei Gr. Galge!! Doben; Gnadau Eb. M. Gulge öftlich von Gullborf!! Bg. Hungriger

Bolf! D. Rrottorf Scht.

878. S. Holoschoenus L. Sandige Triften, besonders im Elbthal, febr gerftreut. G. Zwijden Pretin und Dornburg im Scharleber Bolg feit Scholler!! gwifden Dornburg und Brobel Geigenmüller; zwischen ber Plotther Ziegelei und bem Bilm S. Dl. Beim Forfthaus Alte Rlus Bns. !! fublich von Gerwifd neben ber Chauffee Bns. !!

879. S. maritimus L. Graben, Gumpfe, befonbere auf Salgboben, nicht felten. Brb. Babeger Teich!! G. Goolfanal; Gifenbahngraben S. am Grabirmert bei Gr. Galge!! M. Mittel - Elbe !! Brefter !! an ber Potftrine bei Gerwifd!! Bg. Blumenthal K.! D.

Rrottorf Scht. Bedlingen Scht.

880. S. silvaticus L. Sumpfe, Graben, gerftreut. 3. Unfubn!! G. Zwijden Plothy und Pretin; zwijden ber Reuen Mühle und Gommern; zwischen Pregin und Dornburg S. B. Zwischen Samswegen und Lindhorft!! Bg. Rothe Milble K. Giljen!! R. Unsterholzer Berg!! Rammstebt!! Egeln: Unseburg Eb.

881. S. compressus (L.) Pers. Biefen, feuchte Triften, ger-3. Bor bem Beibethor!! Butrichau!! Brb. Am Babeger Teich; zwischen Göbnit und Dornburg Eb. G. Ronbel Eb. an ber Röthe; Doben S. Bullenwiese!! Dt. Gullborf Eb. 2B. Zwischen Samswegen und Lindhorft!! Bg. Nörblich von Schermen K. Gufen nordwestlich von ber Station!!

882. S. rufus (Huds.) Schrad. Galghaltige Triften, felten. St. In einem Biefengrunde über Bedlingen nach Neundorf gu!! Deiche

Bns.! Rathmannsborf Sp. !!

#### 387. Erióphorum L.

883. E. vaginatum L. Torffümpfe, febr gerftreut. Springberg K.! R. Moosbruch M. S.! schwarzer Pfuhl Bns.! Bg.

884. E. polystachyum L. ex p. Moorwiesen, Gumpfe,

bäufia.

885. E. latifolium Hoppe. Wie voriges, fehr zerstreut. Bg.

Rufgauer Mible!! Rejen S. R. Moosbruch; Erbte; Krohnens Ruh M. S. gwifchen bem Sagen und Supplingen S.!

886. E. gracile Koch. Wie voriges, felten. R. Moosbruch

M. S.!

#### 388. Carex Micheli.

C. diooca L. Moorwiesen. R. (Nabe ber nörblichen Grenze bes Gebietes am Fuße bes Landsbergs westlich von ber Chausse!!)

887. C. pulicaeris L. Moorwiesen, zerftreut. Bg. Hungriger Bolf K.!! Springberg K. Refen Bns.! R. Nörblich von Dabispfuhl!! (nabe ber nörblichen Grenze bes Gebiets am Fuße bes Lands-

berges westlich ber Chauffee!!) D. Scht.

888. C. distich a Huds. Moorwiesen, Simpse, nicht selten, z. B. Brb. Poleimühle; Babez S. S. Busch; Zadmunde Lb. Grünemalbe; alte Steinbrüche bei Plötzse S. M. Dobenborf Bas. Wiese bei Schnarsleben!! an ber Chausse nörblich von Gerwisch!! Bg. K. R. Erbte M. S.!

889. C. arenaria L. Sanbfelber in D nicht felten, A felten, F gar nicht. Brb. Tochheim Dr. Mohs! zwischen Göbnit und Dornburg!! S. Grünewalbe auf bem Tobtenhäger; hinter Blöth: zwischen Bretin und Dornburg S. Ba. Detersbagen!! R.

Rammftebt!!

890. C. vulpina L. Moorwiesen, häufig.

891. C. muricata L. Gebiliche, Laubwälber, nicht selten. S. Busch; Graben neben b. Friedrichsstraße S. Clbinsel Eb. Kreuzhorst!! M. Herntrug!! Biederitzer Busch T.!! B. Samswegen!! Bg. Springberg K.! R. Erbke M. S.

b) virens Lmk. M. Bieberiter Buich T.!

892. C. teretiuscula Good. Torffumpfe, fehr gerfteut. B. Samswegen!! Bg. Schermen Dk.! R. Bebringen; Erbte S.!

893. C. panniculata L. Simpfe, Moorwiesen, zerstreut. Brb. Poleimuble Eb. S. Bullenwiese Eb.!! B. Zwischen Samswegen und Lindhorst!! Bg. hungriger Bolf S. R. Moorwiese vor bem hagen S. Rammstebt am Teich!! N. Erble; schwarzer Pfuhl S.

894. C. Schreberi Schrk. Trodne Grasplätze, Higel, Balber, zerstreut: S. Hummelsberg; Frohsesche Berge Eb. vor dem
Busch; Damm nach Ranies S. M. Wiesenrand nördlich von Kratau!! an der Berliner Chaussee Eb. W. Mose!! Bg. K. R. Rammstedt!! D. Bor dem Hornhäuser Thor Scht.

895. C. ligerica Gay. Sanbfelber, zerstreut. S. Zwischen Randau und ber Kreuzhorst Eb.! Plogty; Neue Mühle Eb. M. An ber Elbe süblich vom herrntrug!! heprothsberge Eb. B. Nördstich von Mose!! Bg. Detershagen!! R. Am hagen!!

tich bon websen. Og. Deterspugent de um Dugen:

896. C. brizoides L. Feuchte Gebuiche, Laubwalber, ger-Brb. Zwischen Balternienburg und Poleimuble S. zwischen Göbnit und Dornburg S.!! G. Zwifden Plotty und bem Bilm; amifchen Blotty und Bretin; amifchen Bretin und Dornburg S. D. Bieberiter Buich T.!! D. Brandsleber Bolg: Bogelbeerb S.

897. C. remota L. Wie vorige, häufiger. 3. Am Teich ber ersten Duble nörblich ber Stabt!! Brb. 3mifchen Göbnit u. Dornburg S. !! G. Grunewalbe vor ber alten Fabre S. Rreughorft!! awijchen ber Blögiver Ziegelei und bem Bilm; Scharleber Solg S. D. Bieberiger Buich!! Bg. K. R. Unterholzer Berg!! Erlenbruch bei Bathen!! R. Schwarzer Bfuhl M. S.1

b) axillaris Good. (als Art). Brb. Babez im Birtengebolg felten S.!

898. C. echinata Murr. Gumpfe, Graben, nicht felten. 3. Butrichau!! Brb. 3mifden Walternienburg und Poleimuble E. Bor Babes S. G. Zwischen ber Plottver Ziegelei und bem Bilm S. Schloß- und Milblenbruch bei Gommern Eb. zwifden Bretin und Dornburg S. D. Beim Richterichen Gafthof!! 2B. Camswegen!! Bg. Sungriger Wolf S. R. Schwarzer Plubl M. S. D. Brandsleber Solz bei ber Ziegelei S. Lubwigsbuich bei Reindorf Scht.

899. C. leporina L. Moorwiesen, feuchte Balber, nicht felten, g. B. 3. Bitrichau!! Brb. Poleimuble Eb. G. Bullenwiefe Eb. Grilnewalbe; zwifden Plögty und bem Pilm; zwifden Pregin und Dornburg S. Gommern Eb. M. Bei ber Friedrich-Wilhelms-

briide T.! Bg. K. N. Erbie S.

900. C. elongata L. Schattige Sumpfe, feuchte Balber, gerftreut. G. Zwifden Bloth und bem Bilm S. Reue Duble bei Gommern Eb. zwijchen Blogty und Bretin Bns.! zwischen Bretin und Dornburg S. Bg. K. R. Erlenbruch nörblich von Bathen!! R. Erbte M. S.

901. C. canescens L. Gumpfe, feuchte Balbftellen, gerftreut. Brb. Poleimilible Eb. S. Erlenbruch zwischen Plötzty und Pretzin; Reffelteich S. Schloß- und Mühlenbruch bei Gommern Eb. Bg. Schermen S. R. Rammflebt!! R. Erbte; schwarzer Pfuhl S.

902. C. stricta Good. Tiefe Gilmpfe, gerftreut. Brb. Um Babeger Teich S. G. Bei ber Bretiner Muble !! Mittelwiefe !! Bg. Sumpf öftlich von ber Chauffee fublich vom Mofer S.!! Sungriger Bolf!! Burgerhols S. Gufen nordweftlich von ber Station!!

903. C. Goodenoughii Gay. Biejen, Sumpfrander, febr

bäufig.

904. C. gracilis Curt. Gumpfe, Graben, gemein.

905. C. Buxbaumii Wahlenb. Dagig feuchte Biefen, felten. R. Rörblich von Mablpfubl!!

906. C. supina Wahlenb. Sonnige hügel, trodne Balber, febr gerftreut, in D und F. S. hummelsberg Eb.!! Plötther Steinbrüche Eb. Pretiner Kirchhof S. Neue Mühle bei Gommern Bns.! Bg. hungriger Bolf Bns. Schindersichten im Bürgerholz Dk.! R. Rammstebt am Bege nach ber Eisenbahnstation Rogan Bns.!!

907. C. pilulifera L. Trocine Walber, Wiesen, nicht selten, z. B. S. Am Kesselteich bei Pretin; Streitheibe bei Gommern S. M. Bei ber Friedrich Wilhelmsbrucke T.1 Bg. Burgerholz S. R. Rammflebt!! R. Moosbruch M. S.1 Erbfe M. S. schwarzer Pfubl S.

D. Branbsleber Bolg S.

908. C. tomentosa L. Wiesen, schattige Laubwälder, zersstreut. Brb. Im sauren Zeit S. S. Kapitelbusch Eb.!! M. Biesberiter Busch, Nordwestseite T.! Bg. Möser; nördlich von Schermen S. am nordöstlichen Rande des Bürgerholzes S.!! N. Erbte M. S.! D. Hatel im Domburgshau!!

909. C. montana L. Bergige Laubwälber, felten, aber febr

gefellig. D. Batel!!

910. C. ericetorum Poll. Trockne Wälber, zerstreut. S. Streitheibe bei Gommern S. M. Zwischen ber Klusheibe und Wah-lit S. Bg. K. A. Am Hagen T.! Rammstebt!! N. Kolbitzer Heibe; Benit S. Oberholz M. S.! D. Brandsleber Holz S. 911. C. praecox Jacq. Hügel, Wälber, nicht selten, z. B.

911. C. praecox Jacq. Hügel, Balber, nicht felten, 3. B. Brb. Tochheim S. S. Frohseiche Berge; Bretin S. M. Schnars-leben!! Bg. K. R. Dberhagen!! N. Kolbiter Beibe S. Benit;

hagen M. S. D. Brandsleber Bolg; Batel S.

912. C. humilis Leysser. Abhänge, trodne Wälder, zerstreut. S. Frohseiche Berge Eb.!! Bg. Bei ben Pietpuhler Seen K.! R. Planten S.! St. Tannenbusch bei Hohen-Errseben Eb. Brn. Garcke.

913. C. digitata L. Laubwälber, felten. Burgerholg bei ber

großen Buche Dk.!!

914. C. panicea L. Feuchte Biesen, sehr häufig. 915. C. glauca Scop. Biesen, Laubwälber, zerstreut.

915. C. glauca Scop. Wiesen, Laubwälder, zerstreut. 3. Luso!! Brb. Im sauren Zeitz S. Poleimühle Eb. Badez!! S. Odbben S. Zackmünde; Ronbel Eb. Bullenwiese; Westerhisensche Berge S. B. Zwischen Samswegen und Lindhorst!! Bg. Nöser; nörblich von Schermen S. R. Nörblich von Mahlpsuhs!! R. Bei Krohnens Ruh M. S. 1 D. Hatel im Domburgshau!!

916. C. pallescens L. Schattige Bälber, Sumpfränder, nicht selten. 3. Friedrichsholz Eb. Jütrichau!! Brb. Erlenbruch zwischen Göbnitz und Dornburg S. S. Schloß- und Mühlenbruch bei Gommern Eb. zwischen Pretzin und Dornburg im Walbe; Moorwiese westlich von Dornburg S. M. Bieberiter Busch T.!! Bg.

Bürgerholz S.!! R. Resperbuid!! Rammftebt!! nörblich von Dablpfubl!! R. Erbte S. D. Brandsleber Holg S. Satel!!
917. C. flava L. Gumpfe, zerstreut. R. Unterhagen S. R.

Erbfe; ichmarge Pfubl S.

b) Oederi Ehrh. (als Art). Bie vorige, häufiger. 3. 311-tricau!! Brb. Teich bei Babes S. S. Zwischen Dornburg und Bretin S. Schlofbruch bei Gommern Eb. D. Bei Richters Gafthof T.! Bg. Sungriger Wolf!! R. Rammftebt Bns.

918, C. distans L. Wiefen, zerftreut. 3. Sütrichau!! Brb. Babeg!! S. Nach Felgeleben zu Eb. Döben; Zadmünde S. Bullenwiefe!! zwischen Frohse und Westerhüsen S. Bg. K. Gifen!!

919. C. fulva Good. Wie vorige, fehr zerstreut. Brb. Ba-bez beim Arbeiterhause!! R. Nörblich von Mahlpfuhl!! (nabe ber nördlichen Grenze bes Bebiets am Fuße bes Landsberges weftlich von ber Chauffee!!)

920. C. silvatica Huds. Schattige Balber, gerftreut. Brb. Rosenburger Buich!! zwischen Ronnei und Tochbeim S. G. Grunewalbe am Rachtigallenfteig!! M. Bieberiter Bufch T.! Bg. Rorböftlich vom Kirchwaffer; Bürgerholg: Beibhau K. R. Unterholger Berg!! R. Erbte M. S. D. hatel!!

921. C. Pseudocyperus L. Graben, Gumpfe, gerftreut. Brb. 3m. Balternienburg u. Poleimilble E. am Babeger Teich!! G. 3m. ber Plöthper Ziegelei u. b. Bilm S. alte Steinbruche bei Ploth Eb. Reffelteich bei Bregin S. 2B. 3m. Camswegen u. Linbhorft!! Bg. Rörblich von Schermen K. Burgerholg!! R. Sumpf bem Laubberg gegenüber S. Erlenbruch bei Bathen!! R. Erbke M. S.! St. Rathmanneborf Scht.

922. C. ampullacea Good. Gimpfe, besondere Torffilmpfe, gerftreut. Brb. Bwifchen Walternienburg und Poleimuble !! gwifden Poleimilble u. Babeg!! 3w. Göbnit u. Dornburg S.!! B. Sams-

wegen!! Bg. Hungriger Bolf S.!! R. Erbte; schwarzer Psubt S.
923. C. vesicaria L. (ex p.) Sumpfe, Graben, nicht selten,
3. B. S. Busch; Döben S. Keffelteich bei Pretin!! zwischen Pretin und Dornburg S. Rrengborft!! D. Rothehorn!! Bg. K. Gufen!!

D. Erbte M. S.

924. C. riparia Curt. Tiefe Gumpfe, Graben, nicht felten. Brb. Im sauren Zeit S. S. Busch Eb. zwischen Plötth und bem Bilm S. Kreuzhorst!! M. Pechau Bns. Bg. Bürgerholg!! Gusen!! R. Erbte M. S.

925. C. paludosa Good. Wie vorige, weniger baufig. Bei ben Befterbujenichen Bergen S. Reffelteich bei Bretin S.!! DR. Bechau Bns. Bg. K. R. Webringen S. Erbte M. S. Rrohnens Rub M. S. !

926. C. nutans Host. Wiesen, Gräben, nur im Elbthal, zersfreut. Brb. Zwischen Alt-Tochheim und Kl. Rosenburg Eb.!! S. Buschwiesen S.! (von ihm hier 1849 zum ersten Mal in Nordbeutschaft land gefunden); Schlofigarten in Randau Eb. M. Biederitzer Busch am Wege nach Biederitz T.! Berliner Chausse nach ber Friedrich-Wilhelmsbrücke Bus.! W. Feldgräben nach Samswegen hin T.!

927. C. filiformis L. Tiefe Torffüntpfe, nur D, zerftreut. Brb. Zwischen Poleimuble und Babez S.!! Babez beim Arbeiterhause!! S. Keffelteich bei Pregin S.!! Mittelwiese häufig S.!! M. Bei Rich-

tere Gasthof nach Königsborn bin 7: Bg. hungriger Bolf!! 928. C. hirta L. Wiesen, Graben, Sumpfranber, febr häufig.

928. C. hirta L. Wiesen, Graben, Sumpfrander, sehr häufig. 925 × 927. C. paludosa × filiformis. Dieser bisher noch nicht bekannte Bastard wurde 1857 von Bns. und S. S. Pretin sübsöstlich vom Kesselteich im Sumpse!! entbeckt.

# 101. Familie. Gramina Juss.

#### \* Zea L.

\* Z. Mays L. Stammt aus Amerifa. Gebaut.

## 389. Andropógon L.

929. A. Ischaemum L. Sonnige Sügel, Raine, nur F, fehr felten. St. Süblicher Graben bes tablen Grafeweges bei Reunborf Bns. 1858!!

## 390. Panicum L.

930. P. sanguinale L. Sandwege, Gartenland, febr zerftreut. Brb. Dornburg, Schlofigarten S. S. Gärten S. Bg. Gärten Dk.!

931. P. filiforme (Koeler) Gke. Sanbfelber, Bege, gerstreut. S. Malzmühle; Frohse; Randau S. M. Bei Richters Gasthof!! nörblich von Bieberit!! Bg. K. N. Parförbe!!

932. P. crus galli L. Feuchte Meder, Wegrander, Graben,

häufig. \* P. miliscoum L. Stammt aus bem Orient. Auf Aeckern gebaut.

## 391. Setária P. B.

933. S. verticillata (L.) P. B. Gartenland, zerstreut. Urssprünglich wohl nicht einheimisch. Brb. Seminargarten E. S. S. W. Prester E. Subenburg S.

934. S. viridis (L.) P. B. Aeder, Gartensand, gemein. 935. S. glauca (L.) P. B. Wie vorige, weniger häufig. 3.

Bor Cichholz!! S. Eggersborf; Hummelsberg; Frobse; Besterhusen; Dornburg S. M. Bieberit E. Bg. K.

#### 392. Phálaris L.

936. P. arundinacea L. Graben, Gumpfe, febr haufig.

b) picta. In Garten ale Bierpflange.

† P. canariensis L. Stammt aus Sub-Europa. Berwilsbert M. Chaussegraben vor Rl. Ottersleben S.

#### 393. Hieróchloë Gmel.

937. H. odorata (L.) Wahlenb. Wiesen, nur im Elbthal, sehr selten, aber gesellig. S. Kapitelbusch Eb.!! Erreicht hier bie Sibwestgrenze ihres Borsommens.

#### 394. Anthoxanthum L.

938. A. odoratum L. Wiejen, Balber, gemein.

# 395. Alopecúrus L.

939. A. pratensis L. Biefen, gemein.

940. A. agrestis L. Wegrander, febr felten. D. Scht.

941. A. geniculatus L. Feuchte Biefen, häufig.

942. A. fulvus Sm. Wie voriger, gerstreut. Brb. Babez beim Arbeiterhause S. S. Grilnewalbe S. B. Moor nördlich von Samswegen!!

## 396. Phleum L.

943. P. Boehmeri Wib. Sonnige Bugel, trodne Balber, zerstreut. S. Frohseiche Berge S. vor bem Scharleber Holz Eb. Bg. Brehmer Berg Dk.! R. Seelenhau S. Brn. Garcke.

944. P. pratense L. Wiefen, Wegrander, gemein.

b) nodosum L. (als Art). S. Eijenbahngräben; Hummelsberg Eb.

### 397. Léersia Solander.

945. L. oryzoides (L.) Sm. Ufer, Sumpfränder, selten. Bg. Ihle süblich von Neuenzinn K. D. Espensache Bns.! und von hier über die Chaussee nach Günthersborf zu Scht.

### 398. Agrostis L.

946. A. vulgaris With. Biefen, feuchte Walber, haufig. 947. A. alba L. Wie vorige, seltener. S. In ber Elbe beim Buschwerber; Streitheibe bei Gommern S. Bg. K. R. Bns.

948. A. canina L. Moorboben, gerftreut. G. Bei ber Breti-

ner Mittelwiese S.!! Bg. Sumpf, füblich vom Möser, öftlich ber Chausses S.!! Hungriger Wolf!!

### 399. Apéra Adans.

949. A. spica venti (L.) P. B. Aecer, Triften, Begranber, gemein.

# 400. Calamagrostis Adans.

950. C. lanceolata Rth. Morwiesen, zerstreut. Brb. Bo-leimilble Eb. S. Keffelteich S. Mittelwiese bei Pretin!! Bg. Gu-

fen Bns. !! R. Unterhagen S.

951. C. epigea (L.) Rth. Sandige Higel, trockne Wilsber, zerstrent. Brb. Zwischen Ronnei und Tochheim Eb. nörblich von Gödnig!! S. Grünewalde; zwischen Pretzin und Dornburg S. M. Gerwisch E. B. Herrnholz bei Glindenberg S. Bg. Zwischen Külzau und Niegripp E. Grabauer Busch; Bürgerholz Dk.!

952. C. neglecta auct. (Ehrh.) Torffumpfe, febr zerstreut. S. Mittelwiese bei Pretin S.!! Bg. Sumpf sublic von Möser S.

hungriger Wolf Bus. !!

953. C. arundinacea Rth. Laubwälber, fehr gerstreut. Bg. Burgerholz bei ber großen Buche Dk.!! D. Satel S.

### + Ammóphila Host.

† A. arenaria (L.) Lk. An ben beutschen Küsten einheimisch; zum Binben bes Flugsandes angesäet und eingebürgert. Brn. Friederienberg an der Terrasse!! M. Nördlich von Biederitz nach Gerwisch zu Bns. !! Bg. Brädät K.!

#### 401. Milium L.

954. M. effúsum L. Schattige Wälber, zerstreut. M. Bieberiter Busch!! Bg. Bürgerholz bei ber großen Buche Dk.! R. Unterhagen S. Rammstebt!! N. Wellenberge bei Dönnstebt S. S. Brandsleber Holz; Ampfurter Busch S. Hakel!! Egelsche Forst S. St. Gänsefurter Busch Eb.

# 402. Stupa L.

955. S. pennata L. Sonnige Bilgel, felten. Brb. Friebri-

fenberg Eb.!

956. S. eapillata L. Sonnige Hügel, Wegränder, zerstreut. S. Hummelsberg Eb. Frohseiche Berge S. Pretiner Kirchhof Eb. M. Festungsmauern vor dem Sudendurger Thor T.1! Hohlweg nördlich von Lemsdorf!! und Chaussee im hohlweg nördlich von Dobendorf!! Klingeberg bei Sülldorf Eb. Gr. Wartberg bei Schnarsleben

S. D. Krottorf in ber zweiten Steinkuble Scht. St. Neundorf am kahlen Graseweg!! Rathskalthütte!! Brn. Kalkberge!! Kalbe: Danum zwischen Gritzehne und Rosenburg Eb.

## 403. Phragmites Trin.

957. P. vulnerans (Gil.) Aschs. Ufer, Graben, gemein.

#### 404. Koeléria Pers.

958. K. cristata (L.) Pers. Trodne Balber, Silgel, Beg-

ränder, häufig.

959. K. glauca (Schk.) D. C. Kiefernwälber, bürre hügel, zerstreut. S. Zwischen Ranbau und ber Kreuzhorst; Pretin S. Bg. Kilzauer Forst K.! sublich von Schermen S.

#### 405. Aira L.

960. A. caespitosa L. Moorwiesen, feuchter Balb, gemein.

b) vivipara. G. Griinemalbe S.

961. A. flexuosa L. Trodne Balber, fehr zerstreut. D. Brandsleber Holz S. Sauerholz bei Umpfurt Eb. hatel S.

# 406. Corynéphorus P. B.

962. C. canescens (L.) P. B. Trodne hügel, Sanbfelber, Kiefernwälber, F zerstreut, A selten, D häusig, z. B. S. Frohseiche Berge; zwischen Frohse und Welsleben S. Tobtenhäger Eb. zwischen Pretin und Gommern und zwischen Pretin und Dornburg S. M. Alte Klus Bns. Bg. K.

#### 407. Holeus L.

963. H. lanatus L. Wiefen, gemein.

964. H. mollis L. Gebuiche, schattige Balber, zerftreut. S. Damm nach Ranies; Blöth am großen Kult Eb. westlicher Ranb bes Scharleber Holges S.!! Bg. Birtenfteig Dk.! R. Seelenhau S.

#### 408. Arrhenátherum P. B.

965. A. elatius (L.) M. u. K. Biefen, Begränber, häufig. Oft angefäet.

#### 409. Avéna L.

\* A. sativa L. Auf Medern häufig gebaut.

† A. strigosa Schreb. Einzeln zwischen ber vorigen Art. S. Frohje S. M. Krafauer-Anger!! St. Am fahlen Graseweg bei Reundorf!!

† A. fatua L. Cbenfo. D. S. Bg. K.

966. A. pubescens L. Trodne Wiesen, Balber, nicht selten. S. Kapitelbusch Eb. zwischen Gr. Salze und Felgeleben S. Bullenwiese!! Frohseiche Berge Eb. Bg. K. R. Kiefernschonung bei ber Eisenbahnstation!! R. Erbke; Moorwiese zwischen bem hagen und Süpplingen S.

967. A. pratensis L. Trodne Higel, Balber, zerstreut. Brb. Tochheim Eb. S. Hummelsberg S. Gisenbahngraben zwischen Frohse und Besterhüsen Eb. Frohsesche Berge Eb.!! Plötty; Pretzin Eb. R. Gr. Wartberg; Klusheide S. Bg. Hungriger Bolf S.!! R.

Erbte S.

968. A. flavescens L. Biefen, Begränder, zerstreut. E. Buschwiesen; Elbwiesen bei Glinde; zwischen Felgeleben und Gr. Salze; Hummelsberg S. Bullenwiese Eb. M. Friedrich-Wilbelms-

garten T.1 Berrntrug T.!

969. A. caryophyllea (L.) Web. Sanbfelber, Kiefernmalber, zerstreut. Brb. Zwijchen Walternienburg und Poleimilhle S.!! Kämerit S. S. Frohselche Berge Eb. Plötzty bei ben alten Steinbrilchen Eb. vor ber Streitheibe S. Bg. S. Gijen!! R. Bei ber Eisenbahnstation S.

970. A. praecox (L.) P. B. Wie vorige, feltener, gewöhnlich in ihrer Gesellschaft. Brb. Zwischen Kamerit und Bades S!! S. Plotty bei ben alten Steinbrilchen Eb. Bg. bei ben Pietypubler

Seen Dk.! Gufen!! R. Bei ber Gifenbahnstation Bns.!

#### 410. Triódia R. Br.

971. T. decumbens R. Br. Kiefernwälber, Moorboben, hügel, zerstreut. Brb. Zwischen Walternienburg und Poleimühle S.!! S. Frohseiche Berge; zwischen Plötzt und Pretzin S. M. Zw. den Senyrothsbergen und Woltersborf auf einem kleinen Moor 7.1 Klusheibe S. Bg. Hungriger Wols!! Grabauer Forst K. Hohenseeden!! R. Wiese bei Mahlbsuhl!! R. Kolbitzer heibe, nördlich von Parförde!! D. Brandsleber Holz Eb.

### 411. Mélica L.

972. M. nutans L. Schattige Balber, zerstreut. 3. Zwischen Bütrichau und Luso!! Friedrichsholz Eb. Bg. Bilrgerholz bei ber großen Buche Dk.! R. Oberhagen S. R. Butterwinkel!! Donnftebt Eb. D. Brandsleber Holz S. hakel!!

973. M. uniflora Retz. Schattige Laubwalber, felten. R.

Bellenberge bei Donnftebt S.!

#### 412. Briza L.

974. B. media L. Wiefen, gemein.

#### 413. Poa L.

975. P. dura (L.) Scop. Lehmwege, febr zerstrent. D. Ansbersleben, wo ber Besetendorfer und Dichersleber Weg fich frengen Scht. St. Roehl! Alt Staffurt Scht.

976. P. annua L. Wege, Wiesen, Gartenland, gemein.

977. P. bulbosa L. Wegrander, Bigel, gerftreut. Die Stamm-

art nur G. Bretiner Rirchhof S.

b) crispa Thuill. (als Art). S. Glinde an ber Ueberfahrt; hinter bem Beguinenhause Eb. Hummelsberg!! Sohlsche Berge S. bei ber Uebersahrt nach Dornburg Eb. Bg. Detershagen!! M. Glacis vor bem Subenburger Thor T.!

978. P. nemoralis L. Balber, häufig.

979. P. sorotina Ehrh. Feuchte Biefen, nicht selten, z. B. S. Bor bem Busch; Grilnewalbe S. M. Bei ber Berliner Chaussee!! Bg. Pabbenmilhse K.

980. P. trivialis L. Wiefen, Wegranber, häufig.

981. P. pratensis L. Biesen, Wegränder, Baber, gemein. 982. P. compressa L. Mauern, hilgel, Begränder, nicht selten. S. Kirchhofsmauer in Gr. Salze; Eisenbahnbölchungen nach Felgeleben Eb. Frohseiche Berge; Plöth S. M. Auf Mauern; Sullborf; Bahrendorf S. Bg. K. Egeln: Borne Eb.

#### 414. Glycéria R. Br.

983. G. altissima (Gil.) Gke. Sümpfe, Graben, gemein. 984. G. fluitans (L.) R. Br. Graben, Ufer, Sumpfwiesen

febr häufig.

985. G. distans (L.) Wahlenb. Grüben, Zäune, Salzboben, zerstreut, S. Bor bem Busch; Soolgraben beim Belsieber Weg S. M. Süllborf!! D. Sülzen; Krottorf: Salzquelle und rothe Lache bei ber Wiesenmühle Scht. St. Hedlingen Scht.

986. G. aquatica (L.) Prosl. Schlammige Gruben, febr zerftrreut. S. Bei ber Bullenwiese; Al. Mühlingen S. Bg. Zibbet-

leben K.! St. Bedlingen Scht.

#### 415. Molinia Mnch.

987. M. coerulea (L.) Mnch. Moorwiesen, seuchte Wälber, zerstreut. Brb. Zwischen Walternienburg und Poleimible E. S. Zwischen Bretzin und Dornburg S. Neue Milble bei Gommern Bns. M. Bei Nichters Gasthos!! Bg. Siblich von Niegripp S. zwischen b. Brehm und bem Bürgerholz K. O. Hatel Eb. St. Gänsesurter Busch Eb.

### 416. Dáctylis L.

988. D. glomerata L. Trodue Biejen, Gebüsche, Balber, gemein.

## 417. Cynosúrus L.

989. C. cristatus L. Wiesen, Triften, Begränder, baufig.

#### 418. Festúca L.

990. F. myura Ehrh. Sonnige Bilgel, felten. S. Frebfeiche Berge S.!

991. F. ovina L. Sanbfelber, Balber, higel, fehr gemein. 992. F. duriuscula L. syst. Schattige Balber, Graspläte, zerstreut. 3. Friedrichsholz!! S. Zwijchen Gr. Salze und Felgeleben S. Kapitelbusch Eb. zwischen Pretzin und Dornburg S. D.

Satel S.

993. F. rubra L. Sanbselber, sehr zerstreut. Bg. Güsen!! 994. F. gigantéa (L.) Vill. Schattige Wälber, zerstreut. Brb. Coprena Eb. Iritzer Busch; Rosenburger Busch S. Tochheimer Busch!! Dornburg Eb. S. Busch; Grünewalde S. M. Biederitzer Busch!! Bg. K. R. Erlenbruch bei Bathen!! D. Hatel S.

995. F. arundinacea Schrob. Feuchte Wiesen, zerstreut. Brb. Babezer Teich Bns. S. Bullenwiese S. D. Felgeleben; Salze; Gommern Eb. D. Kleine Sülten; kleine Bleef und sonst im Bruch umb ber Bobenieberung Scht. Egeln: Borne Eb. St. An ben Sülzen am Löberburger Bege!! an ber Liethe, westlich von Rathmannsborj!!

996. F. elatior L. Wiefen, gemein.

b) adscendens Retz. (als Art). Wie vorige, felten. S. Beim Forsthaus Kreuzhorst!! (in bie Hauptart übergebenb). Bg. Rothe Milhse K.

## 419. Brachypódium P. B.

997. B. silváticum (Huds.) R. u. Schult. Schattige Wälber, zerstreut. Brb. Tochheim am Damm!! Rosenburger Busch S. S. Kapitelbusch; Grünewalbe am Damm nach ber Ziegelei S. Scharteber Holz S.!! M. Bieberitzer Busch!! Bg. Wehmerlake im Bürgerholz K. R. Unterholzer Berg S. Rammstebt!! D. Brandsleber Holz S.! Hakel Eb. St. Gänseinurter Busch S.

998. B. pinnatum (L. ex p.) P. B. Trodne Silgel, lichte Balber, zerstreut. S. Zenser, Frohiesche, Sohliche Berge S. Bg. Siblich von Schermen an ber Chaussee S. D. Brandsleber Soli

T.! Batel Eb. Egeln an ber Chauffee nach Magbeburg S.

### 420. Bromus L.

999. B. secalinus L. Unter Getreibe häufig.

1000. B. racemosus L. Wiesen, zerstreut. S. hinter bem Pflanzenkamp S. Soolkanal; Bullenwiese Eb. Frohse S. Bg. Nacht-weibe Dk.! R. Bäthen Bns.! N. Webringen; Süpplingen S.

1001. B. commutatus Schrad. Meder, felten. G. Frob-

feiche Berge S.

1002. B. mollis L. Biefen, Wegranber, gemein.

1003. B. arvensis L. Aeder, zerstreut, z. B. S. Hummelsberg; Frohseiche Berge Eb. nörblich von Westerhüsen!! M. Gublich vom Biederiger Busch!! B. T.! Bg. Lübersborf Dk.!

1004. B. asper Murr. Schattige Balber, febr gerftreut.

 $\mathfrak{Bg}$ . K.

b) serotinus Beneken. (als Art). Laubwälber, selten. D.

Satel S.! Egeliche Forft S. St. Banjefurter Buich S.!!

† B. erectus Huds. Graspläte, Begränder, nur ausgesäet. M. Friedrich-Wilhelmsgarten!! Chausscegraben der Leipziger Chausse

bor bem Schwan S. Part gu Gullborf T.!

1005. B. inermis Leysser Trodne Wiesen, Higel, nicht seleten, z. B. S. Busch; Frohleiche Berge S. M. Rothehornspitze!! an ber Elbe süblich vom herrnfrug!! Bg. Bierkeller Dk.! St. Neundorf am tablen Graseweg!! Rathskalthütte!! Rathmannsborf!! Brn. Weinberge!!

1006. B. sterilis L. Mauern, Zäune, nicht selten.

1007. B. tectorum L. Begranber, Baune, Schutt, gemein.

#### 421. Tríticum L.

\* T. vulgare Vill. Baufig gebaut.

1008. T. repens L. Aderrander, Bege, Biefen, gemein.

1009. T. caninum (L.) Schreb. Schattige Laubwälber, nur A, verbreitet und gesellig. Brb. Rosenburger Busch!! Tochheinter Busch E. S. Kapitelbusch; Grünewalbe; Kreuzhorst S. M. Bogelgesang T.!! Bieberiter Busch am süblichen Ranbe!! D. Krottorf im Mühlenhölzchen Scht.

#### \* Secale L.

\* S. cereale L. Ueberall auf Aedern gebaut.

# † Élymus L.

† E. arenarius L. An ben Ruften Deutschlands einheimisch; im Gebiet nur zur Besestigung bes Flugsandes angebaut und eingesbürgert. M. An ber Westjeite von Gerwisch T. 1856!! R. (Nahe

ber nörblichen Grenze bes Gebiets an ber Chauffee am nörblichen Rufe bes Landsberges E.!!)

#### 422. Hordeum L.

\* H. vulgare L. Auf Aectern gebaut. \* H. distichum L. Ebenso, häufiger als voriges.

1010. H. murinum L. (ex p.) Zaune, Begranber, gemein. 1011. H. secalinum Schreb. Biefen, befonders falghaltige,

gerftreut, aber gefellig. G. Bufdwiesen; Biefen nach Glinbe gu; am Soolfanal S. D. Gulgewiesen öftlich von Gillborf!! Bg. Bolle am Blumenthalichen Weg Dk.!! St. Bibewiefen, befonders Brudwiefen unterhalb Alt-Staffurt Scht.

#### 423. Lólium L.

1012. L. perenne L. Biefen, Gebiliche, Begranter, gemein. † L. multiflorum Poir. Stammt aus Gubbeutichland; im Bebiet nur angefaet und eingeburgert. S. Friedhof Eb. ! Gifenbahn graben S.

1013. L. temulentum L. Meder, besonbers unter Bafer,

bäufia.

1014. L. arvense Schrad. Meder, nur unter Lein, gerftreut C. Rl. Mublingen; Bens; Gidenborf S. Bg. Löbefühn K. R.!! Bathen und Dablpfubl!!

#### 424. Nardus L.

1015. N. stricta L. Moorwiesen, burre Bugel, gerftreut. 3. Bitrichau!! Brb. Bei ber Poleimuble S.!! G. Bregin am Reffels teich S. Gommern am Schloß- und Miblenbruch Eb. D. Rorbofts lich vom Richterichen Gafthof!! Bg. Sungriger Bolf S. Weg nach Bieboubl K. Gufen S. R. Erbte; ichmarger Bfubl S.

# II. Gymnospermae.

# 102. Familie. Coniferae Juss.

#### \* Taxus Tourn.

\* T. baccata L. 3m Gebiet nicht einheimisch, sonbern nur zu Beden u. f. w angepflanzt.

## 425. Juniperus L.

1016. J. communis L. Kiefernwälber, nicht häufig. \* J. virginiana L. Zierbaum aus Rorbamerita.

\* J. Sabina L. Bierftrauch aus Gubbeutschland.

# \* Thuja L.

\* T. occidentalis L. Zierstrauch aus Nordamerita.

#### 426. Pinus Tourn.

1017. P. silvestris L. Bilbet bie Radelmalber bes Gebiets faft ausschließlich.

\* P. Strobus L. Zierbaum aus Nordamerita.

# \* Abies Tourn.

\* A. alba Mill. Säufiger Bierbaum aus Mittelbeutschlanb.

#### 427. Pícea Tourn.

1018. P. excelsa (Lmk.) Lk. In Bergwälbern, felten. D. Brandsleber holz S. Als Zierbaum nicht felten. Schöne beschnittene heden von biesem Baume finden sich Brb. Im Part bei Dorn-burg.

#### \* Larix Tourn.

\* L. decidu'a Mill. Bierbaum aus Guboft-Deutschlanb.

# Cryptógamae.

### I. Cormóphyta.

#### A. Filicínae.

a. Gonioptérides Willd.

103. Familie. Equisetaceae D. C.

### 428. Equisétum L.

1019. E. arvense L. Aeder, Wiesen, gemein.
b) nemorosum A. Br. Schattige Wälber, zerstreut. S. Bwischen Pretzin und Dornburg S.!! R. Erlenbruch bei Bäthen!!
1020. E. palustre L. Moorwiesen, Gräben, zerstreut. Z. Bwischen Jütrichau und Luso!! S. Bullenwiese; zwischen Frohse und Besterhüsen; vor Dornburg S. R. Süblich von der Berliner Chaussee!! Bg. Hungriger Wolf Bns.

1021. E. limosum L. Gumpfe, Graben, gemein.

### b. Hydroptérides Willd.

104. Familie. Salviniaceae Bartl.
429. Salvinia Micheli.

1022. S. natans (L.) Hoffm. Stehenbe Bemaffer, felten. P. Becauer See Bus.!!

### c. Bryoptérides Willd.

### 105. Familie. Lycopodiaceae D. C.

#### 430. Lycopódium L.

1023. L. Selago L. Erlenfumpfe, an ben Bodern, febr felten. Brb. Zwijchen ber Poleimuble und Babes, Ramerit gegenfiber S.!!

1024. L. inundatum L. Sumpfrander, moorige Stellen, selten. D. Beim Richterschen Gafthof in einem fleinen Sumpf füb-

öftlich vom Saufe T.!! Bg. Hungriger Bolf K.

1025. L. clavatum L. Trodne Balber, zerftreut. Brb. Zwisschen Balternienburg und Poleimilble; Babez S. M. Klusheibe S. Bg. Grabauer Forft am Stegliber Beg K. N. Oberholz M. S. ! D. Brandsleber Holz nörblich ber Ziegelei F. Reinecke.

#### d. Fílices L.

## 106. Familie. Ophioglossaceae R. Br.

### 431. Botrýchium Sw.

1026. B. Lunaria Sw. Grafige, trodne Balbftellen, felten. R. Rammflebt E.!

#### 432. Ophioglossum L.

1027. O. vulgatum L. Mäßig feuchte Wiesen, sehr gerftreut. S. Bullenwiese, jest burch Urbarmachung ber Wiese ausgerottet S.! St. Busch bei Rathmannsborf Scht.

### 107. Familie. Osmundaceae R. Br.

#### 433. Osmunda L.

1028. O. regalis L. Feuchte Balber, Sumpfrander, sehr zerstreut. Bg. Burgerholz beim Forsthause Dk.!! R. Zernit M. S. schwarzer Pfuhl Bas.!

### 108. Familie. Polypodiaceae R. Br. 434. Polypódium L.

1029. P. vulgare L. Balber, febr gerftreut. G. 3mifchen Bretin und Dornburg S. M. Rlusbeibe S. R. Bathen E.!

#### 435. Pteris L.

1030. P. aquilina L. Trodne Balber, gerftreut. Bg. Blirgerholz S. R. Geelenhau S. Rammftebt!! R. Rolbiter Beibe; ichmarger Bfubl; Donnftebt; Sagen S. D. Branbeleber Solg nach Bedenborf gu S.

#### Blechnum L.

Schattige Balber. (Rabe ber meft-B. Spicant (L.) Rth. lichen Grenze im Bart ju Barbte bei Belmftebt Dr. Hanstein.)

#### 436. Asplénium L.

1031. A. Trichomanes L. Mauerriten, felten. M. Feftungemerte Bns. !

1032. A. Filix femina (L.) Bernh. Cumpfranter in Balbern, feuchte Bebuiche, gerftreut. Brb. Zwijchen Balternienburg und Poleimühle; zwijchen Gobnit und Dornburg S. G. Zwischen Bretin und Dornburg; Bilm S. R. Geelenhau S. R. Babenbera M.S. St. Banfefurter Buich S

1033. A. Ruta muraria L. Mauern, nicht felten. 3. Ritolaitirche!! G. Calze an ber Kirche S. Dt. Festungsmauern, befonbers Glacis ber Sternichange !! Bg. Stabtmauer, Gubfeite K. n. Stabtmauer M. S.

#### 437. Phegópteris Fée.

1034. P. Robertianum (Hoffm.) A. Braun in litt. Mauerriten, febr felten. M. Glacis ber Sternichange 1853!! (Polyp. Dryopteris Aschs. in Zeitichr. für bie gef. Naturm. 1853).

#### 438. Aspídium Sw.

1035. A. Thelypteris (L.) Sw. Gimpfe, befonbere in Balbern, zerstreut. Brb. Zwischen Balternienburg und Poleimuble S. zwischen Boleimuble und Babeg!! zwischen Göbnit und Dornburg S. 2B. Zwifden Camswegen und Lindhorft!! Bg. Sungriger Bolf!! R. Braumanns Erlen E.! R. Nörblich von Barforbell Moosbruch M. S. fcmarger Bfubl M. S.

1036. A. montanum (Vogler) Aschs. Schattige Balber, besonbers an Sumpfen, sehr zerftreut. Bg. K.! D. Branbsleber

Bolg: Bogelheerd Scht.

1037. A. Filix mas (L.) Sw. Wälber, zerstreut. S. Elbinfel bei ber Abendlate; Scharleber Holz bei Pretin; Pilm Eb. Bg.
Schindersichten S. R. Seelenhau S. Kesperbusch!! Hagen S. R.
Papenberg M. S. D. Brandsleber Holz S. St. Gänsefurter Busch S.
1038. A. cristatum (L.) Sw. An Walbsumpfen, selten. R.

Schwarzer Pfuhl E., M. S.!

M1039. A. spinulosum (Retz.) Sw. (erweitert). Schattige Wälber, Gebülche, zerstrent. Brb. Zwischen Walternienburg und Posteimühle; zwischen Gödnitz und Dornburg S. S. Zwischen Pretzin und Dornburg; Pilm S. R. Unterhagen!! Erlenbruch bei Läthen!! D. Brandsleber Holz: Irrfamp Scht.

#### 439. Cystópteris Bernh.

1040. C. frágilis (L.) Bernh. Mauerrigen, selten. M. Schleussentreppe Bas.

# Register.

Abies Tourn, 129, Acalyphaceae Kl. u. Gke. 98. Acer L. 24. Aceraceae D. C. 24. Achillea L. 60. Achyrophorus Scop. 67. Aconitum Tourn. 5. Acorus L. 105. Adonis Dillen. 2. Adoxa L. 52. Aegopodium L. 46. Aesculus L. 25. Aethusa L. 48. Agrimonia Tourn. 38. Agrostemma L. 19. Agrostis L. 121. Aira L. 123. Ajuga L. 89. Albersia Kth. 92. Alchemilla Tourn, 38, Alectorolophus Haller 84. Alisma L. 102. Alismaceae Juss. 102. Alliaria Adans. 10. Allium L. 110. Alnus Tourn. 100.

Alopecurus L. 121. Alsine Wahlenb. 20. Alsinaceae D. C. 19. Althaea L. 23. Alyssum L. 11. Amarantaceae Juss. 92. Amarantus L. 92. Amaryllidaceae R. Br. 108. Ambrosiaceae Lk. 70. Ammi Tourn. 46. Ammophila Host. 122. Ampelides H. B. K. 25. Ampelopsis Mich. 25. Amygdalaceae Juss. 35. Amygdalus L. 35. Anacyclus L. 61. Anagallis L. 90. Anchusa L. 76. Andropogon L. 120. Androsaces Tourn. 91. Anemone Tourn. 2. Anethum L. 50. Angelica L. 49. Anthemis L. 61. Anthericum L. 109. Anthoxanthum L. 121.

Anthriscus Hoffm. 50. Anthyllis L. 29. Antirrhinum L. 80. Apera Adans. 122. Apium L. 46. Apocynaceae R. Br. 73. Aquifoliaceae D. C. 73. Aquilegia Tourn. 5. Arabis L. 8. Araceae Juss. 105. Araliaceae Juss. 51. Archangelica Hoffm. 49. Arenaria L. 20. Aristolochia Tourn. 97. Aristolochiaceae Juss. 97. Armeria Willd, 92. Arnica L. 62. Arnoseris Gaertn. 65. Arrhenatherum P. B. 123. Artemisia L. 60. Arum L. 105. Asclepiadaceae R. Br. 73. Asparagus L. 111. Asperugo Tourn. 75. Asperula L. 53. Aspidium Sw. 132. Asplenium L. 132. Aster L. 57. Astragalus L. 32. Atriplex Tourn. 94. Avena L. 123.

Ballota L. 88.
Balsamina D. C. 26.
Balsaminaceae Rich. 26.
Barbaraea R. Br. 8.
Batrachium E. Mey. 3.
Bellis L. 58.
Berberidaceae Vent. 5.
Berberis L. 5.
Berteroa D. C. 11.
Berula Koch 47.

Beta Tourn. 94. Betonica L. 88. Betula Tourn 100. Betulaceae Rich. 100. Bidens L. 59. Biscutella L. 12. Blechnum L. 132. Blitum Tourn. 94. Boraginaceae Juss. 75. Borago Tourn. 76. Botrychium Sw. 131. Brachypodium P. B. 126. Brassica L. 10. Briza L. 124. Bromus L. 127. Bryonia L. 42. Bupleurum Tourn. 47. Butomaceae Rich. 102. Butomus Tourn, 102. Buxus Tourn. 98.

Calamagrostis Adans. 122. Calamintha Mnch. 86. Calendula L. 63. Calla L. 105. Callitrichaceae Lk. 41. Callitriche L. 41. Calluna Salisbury. 72. Caltha L. 4. Camelina Crtz. 12. Campanula L. 70. Campanulaceae Juss. 70. Cannabaceae Endl. 98. Cannabis Tourn. 98. Caprifoliaceae Juss. 52. Capsella Vent. 13. Caragana Lmk. 32. Cardamine L. 9. Carduus L. 64. Carex Micheli, 116. Carlina Tourn. 64. Carpinus L. 99. Carum L. 46.

Caucalis L. 50.
Calastraceae R Br 27
Celastraceae R. Br. 27. Centaurea L. 65.
Centunculus L. 90.
Cerastium L. 21.
Ceratophyllaceae Gray. 41.
Ceratophyllum L. 41.
Chaerophyllum L. 51.
Chaeturus Willd. 88.
Cheiranthus L. 7.
Chelidonium Tourn. 6.
Chenopodiaceae Vent. 93.
Chenopodina Moq. Tand. 93.
Chenopodium Tourn. 93.
Chondrilla Tourn. 68.
Chausanthamum I C1
Chrysanthemum L. 61. Chrysosplenium Tourn. 45.
Chrysospienium Tourn. 45.
Cichorium Tourn. 66.
Cicuta L. 46.
Circaea Tourn. 40. Cirsium Tourn. 63.
Cirsium Tourn. 63.
Cistaceae Dun. 14
Cladium P. Br. 114. Clematis L. 1.
Clematis L. 1.
Cnidium Cuss. 48.
Cochlearia L. 12.
Colchicaceae D. C. 112.
Colchicum Tourn. 112.
Collinsia Nuttall. 81.
Colutea L. 32.
Colutea L. 52.
Comarum L. 37.
Compositae Adans. 56.
Coniferae Juss. 129.
Conium L. 51.
Convallaria L. 109.
Convolvulaceae Juss. 75.
Convolvulus L. 75. Coriandrum L. 51.
Coriandrum L. 51.
Cornaceae D. C. 51.
Cornus Tourn. 51.
Coronaria L. 19.
Coronilla L. 32.
Coronopus Haller. 13.
Coronopus azunten 101

Corrigiola L. 43. Corydallis D. C. 6. Corylus L. 99. Corynephorus P. B. 123. Cracca Rivin. 33. Crassulaceae D. C. 41. Crataegus L. 39. Crepis L. 68. Cruciferae Juss. 7. Cucubalus Tourn, 18. Cucumis L. 42. Cucurbita L. 42. Cucurbitaceae Juss. 42. Cupuliferae Rich. 99. Cuscuta Tourn, 75. Cynoglossum L. 76. Cynosurus L. 126. Cyperaceae Juss. 114. Cyperus L. 114. Cypripedium L. 108. Cystopteris Bernh. 133. Cytisus L. 28.

Dactylis 126.
Daphne L. 96.
Datura L. 79.
Daucus Tourn. 50.
Delphinium Tourn. 5.
Dianthus L. 17.
Dictamnus L. 26.
Digitalis Tourn. 80
Diplotaxis D. C. 11.
Dipsacaceae D. C. 55.
Dipsacus Tourn. 55.
Draba L. 11.
Drosera L. 16.
Droseraceae D. C. 16.

Echinospermum Sw. 75. Echium Tourn. 76. Elaeagnaceae R. Br. 96.

Elaeagnus L. 96. Elatinaceae Camb. 21. Elatine L. 21. Elsholtzia Willd 84. Elymus L. 127. Empetraceae Nuttall. 97. Empetrum Tourn. 97. Epilobium L 39. Epipactis Haller. 107. Equisetaceae D. C. 130. Equisetum L. 130. Erica L. 72. Ericaceae Klotzsch. 72. Erigeron L. 57. Eriophorum L. 115. Erodium L'Her. 26. Erophila D. C. 11. Erucastrum Presl. 11. Ervum Tourn. 33. Eryngium Tourn. 46, Erysimum L. 10. Erythraea Renealm. 74. Euonymus Tourn. 27. Eupatorium Tourn. 56. Euphorbiaceae Kl. u. Gke. 97. Euphrasia Tourn. 84.

Fagopyrum Tourn. 96.
Fagus Tourn. 99.
Falcaria Rivin. 46.
Festuca L. 126.
Ficaria Dillen. 4.
Filago Tourn. 59.
Fragaria L. 36.
Frangula Tourn. 27.
Fraxinus Tourn. 73.
Fritillaria L. 109.
Fumaria Tourn. 6.
Fumariaceae D. C. 6.

Gagea Salisbury 110.
Galanthus L. 108.
Galeobdolon Huds. 87.

Galeopsis L. 87. Galinsoga Ruiz u. Pavon. 59. Galium L. 53 Genista L. 28. Gentiana L. 74. Gentianaceae Juss. 74. Geraniaceae D. C. 25. Geranium L. 25. Geum L. 36. Glaux Tourn. 91. Glechoma L. 86. Glyceria R. Br. 125. Gnaphalium Tourn. 59. Gramina Juss. 120. Gratiola L. 80. Grossulariaceae D. C. 44. Gymnadenia R. Br. 106. Gypsophila L. 17.

Malorrhagidaceae R. Br. 40. Hedera L. 51. Heleocharis R. Br. 114. Helianthemum Tourn. 14. Helichrysum Gaertn. 60. Helminthia Juss. 66. Helosciadium Koch. 46. Hepatica Dillen. 2. Heracleum L. 50. Herniaria Tourn. 43. Hesperis L. 9. Hieracium Tourn, 69. Hierochloë Gmel. 121. Hippocastanaceae D. C. 25. Hippophaë L. 96 Hippuridaceae Lk. 41. Hippuris L. 41. Holcus L. 123. Holosteum L. 20. Hordeum L. 128. Hottonia L. 91. Humulus L. 98. Hydrocharidaceae D. C. 101. Hydrocharis L. 102.

Hydrocotyle Tourn. 45. Hyoscyamus Tourn. 78. Hypericaceae D. C. 24. Hypericum L. 24. Hypochoeris L. 67. Hypopityaceae Klotzsch. 72. Hyssopus L. 86.

Jasione L. 70.
Iberis L. 12.
Ilex L. 73.
Illecebrum Tourn. 43.
Illecebrum Tourn. 43.
Impatiens L. 26.
Inula L. 58.
Iridaceae Juss, 108.
Iris L. 108.
Juglandaceae D. C. 99.
Juglans L. 99.
Juncaceae Bartl. 112.
Juncaginaceae Rich. 102.
Juncus L. 112.
Juniperus L. 112.
Juniperus L. 1129.
Jurinea Cass. 64.

Kanautia L. 55. Koeleria Pers. 123.

Labiatae Juss. 84. Lactuca L. 68. Lamium L. 86. Lampsana Tourn. 65. Lappa Tourn. 64. Larix Tourn, 129. Laserpicium Tourn. 50. Lathraea L. 84. Lathyrus L. 34. Lavatera L. 23. Leersia Soland. 121. Lemna L. 105. Lemnaceae Lk. 105. Lens Tourn. 34. Lentibulariaceae Rich. 89. Leontodon L. 66.

Leonurus L. 88. Lepidium L. 13. Leucoïum L. 108. Levisticum Koch. 49. Ligustrum Tourn. 73. Liliaceae D. C. 109. Lilium L. 109. Limosella L. 83. Linaria Tourn. 80. Linaceae D. C. 22. Linum L. 22. Listera R. Br. 107. Lithospermum Tourn. 77. Lolium L 128. Lonicera L. 52. Loranthaceae Don. 52. Lotus L. 31. Lupinus L. 28. Luzula D. C. 113. Lycium L. 78. Lycopodiaceae D. C. 131. Lycopodium L. 131. Lycopus L. 85. Lysimachia L. 90. Lythraceae Juss. 41. Lythrum L 41.

Malachium Fr. 21. Malva L. 22. Malvaceae R. Br. 22. Marrubium L. 88. Matricaria L. 61. Medicago L. 29. Melampyrum Tourn. 83. Melandryum Roehl. 19. Melica L. 124. Melilotus Tourn. 29. Mentha L. 84 Menyanthes L. 74. Mercurialis L. 98. Milium L. 122. Moehringia L. 20. Molinia Mnch. 125.

Monotropa L. 72.
Montia Micheli. 43.
Moraceae Endl. 99.
Morus Tourn. 99.
Myosotis L. 77.
Myosurus Dillen. 3.
Myriophyllum Vaillant. 40.

Narcissus L. 108.
Nardus L. 128.
Nasturtium R. Br. 7.
Neottia L. 107.
Nepeta L. 86.
Neslea Desv. 13.
Nicandra Adans. 78.
Nicotiana L. 78.
Nigella Tourn. 5.
Nonnea Medikus. 76.
Nuphar Sm. 5.
Nymphaea L. 5.
Nymphaeaceae D. C. 5.

Obione Gaertn. 94 Oenanthe L. 47. Oenothera L. 40. Oleaceae Lindl. 73. Onagraceae Juss. 39. Onobrychis Tourn. 33. Ononis L. 29 Onopordon Vaillant. 64. Ophioglossaceae R. Br. 131. Ophioglossum L. 131. Ophrys L. 107. Orchidaceae Juss. 105. Orchis L. 105. Origanum L. 86. Ornithogalum L. 110. Ornithopus L. 33. Orobanche L. 84. Osmunda L. 131. Osmundaceae R. Br. 131. Oxalidaceae D. C. 26. Oxalis L. 26.

Panicum L. 120. Papaver Tourn. 6. Papaveraceae D. C. 6. Papilionatae L. 28. Parietaria Tourn. 98. Paris L. 108. Parnassia L. 16. Paronychiaceae St. Hil. 43. Passerina L. 96. Pastinaca Tourn. 50. Pedicularis Tourn. 83. Peplis L. 42. Persica Tourn. 35. Petasites Tourn. 56. Petroselinum Hoffm. 46. Peucedanum L. 49. Phalaris L. 121. Pharbitis Choisy. 75. Phaseolus L. 35. Phegopteris Fée. 132. Philadelphaceae Don. 42. Philadelphus L. 42. Phleum L. 121. Phragmites Trin. 123 Phyllanthaceae Kl. u. Gke. 98. Physalis L. 78. Phyteuma L. 70. Picea Lk. 129. Picris L. 66. Pimpinella L. 47. Pinguicula Tourn. 89. Pinus Tourn. 129. Pirola Tourn. 72. Pirus L. 39. Pisum Tourn. 34. Plantaginaceae Jnss. 92. Plantago L. 92. Platanaceae Lestib. 100. Platanthera Rich. 107. Platanus L. 100 Plumbaginaceae Juss. 92. Poa L 125. Podospermum D. C. 67.

Polycnemum L. 93. Polygala L. 17. Polygalaceae Juss. 17. Polygonaceae Juss. 95 Polygonatum Tourn. 108. Polygonum L. 95 Polypodiaceae R. Br. 132. Polypodium L. 132, Pomariae Lindl. 39. Populus Tourn. 101. Portulaca Tourn. 43 Portulacaceae Juss. 43 Potamiae Juss 103 Potamogeton L 103. Potentilla L. 37. Poterium L. 38 Primula L. 91. Primulaceae Vent. 90. Prunella L. 89. Prunus L. 35. Ptelea L 27. Pteris L. 132 Pulicaria Gaerta, 58. Pulmonaria Tourn 77. Pulsatilla Tourn. 2.

#### Quercus L. 99

Radiola Dillen. 22.
Ramischia Opiz 72
Ranunculaceae Juss. 1.
Ranunculus Haller. 3.
Raphanistrum Tourn. 14.
Raphanus Tourn. 14.
Rapistrum Boerh. 14.
Reseda L. 16.
Resedaceae D. C. 16
Rhamnaceae R. Br. 27.
Rhamnus L. 27.
Rhynchospora Vahl. 114.
Ribes L. 44.
Robinia L. 32.

Rosa Tourn. 38. Rosaceae Juss. 35. Rubiaceae Juss. 53. Rubus L. 36. Ruppia L. 104. Rutaceae Juss. 26.

Sagina L. 19. Sagittaria L. 102. Salicaceae Rich. 100. Salicornia L. 93 Salix Tourn. 100. Salsola L. 93. Salvia L. 85 Salvinia Micheli. 130. Salviniaceae Bartl. 130. Sambucus Tourn. 52. Samolus Tourn. 91. Sanguisorba L. 38. Sanicula Tourn. 45. Santalaceae R. Br. 96. Saponaria L. 18. Sarothamnus Wimm. 28. Satureja L. 86. Saxifraga L. 45. Saxifragaceae Vent. 45. Scabiosa L 55. Scandix L. 50. Scirpus L. 114. Scleranthaceae Lk. 43. Scleranthus L. 43 Scorzonera L 67. Scrophularia Tourn. 80. Scrophulariaceae R. Br. 79. Scutellaria L. 88. Secale L. 127. Sedum L. 44. Selinum L. 49. Sempervivum L. 44. Senecio L. 62. Serratula L. 64. Seseli L. 48.

Setaria P. B. 120. Sherardia Dillen. 53. Sicyos L. 42. Silaus Bess. 48. Silenaceae D. C. 17. Silene L. 18, Silybum Vaillant. 64. Sinapis Tourn. 10. Siphonandrae Klotzsch. 71. Sisymbrium L. 9. Sium L. 47. Smilacaceae R. Br. 108. Smilacina Desf. 109. Solanaceae Juss. 78. Solanum L. 78. Solidago L. 58. Sonchus L 68. Sparganium Tourn. 104. Specularia Heister. 71. Spergula L. 20. Spergularia Presl. 20. Spinacia Tourn. 94. Spiraea L. 35. Spiranthes Rich. 107. Stachys L 87. Stellaria L. 21. Stenactis Cass. 57. Stratiotes L. 101. Stupa L. 122. Succisa M. u K. 55. Symphytum L. 76. Syringa L. 73.

Taraxacum Juss. 67.
Taxus Tourn. 129.
Teesdalea R. Br. 12.
Terebinthaceae D. C. 27.
Tetragonolobus Scop. 31.
Teucrium L. 89.
Thalictrum L. 1.
Thesium L. 96.
Thlaspi Dillen. 12.
Thrincia Rth. 66.

Thuja L. 129. Thymelaeaceae Juss. 96. Thymus L. 86. Thysselinum Rivin. 49. Tilia L. 23. Tiliaceae Juss. 23. Tithymalus Scop. 97. Torilis Adans. 50. Tragopogon L. 66 Trapa L. 40 Trientalis L. 90. Trifolium Tourn. 30. Triglochin L. 102. Triodia R. Br. 124. Triticum L. 127. Trollius L. 4. Tulipa Tourn. 109. Tunica Scop. 17. Turritis Dillen. 8. Tussilago Tourn. 56. Typha Tourn. 104. Typhaceae Juss. 104.

Ulex L 28.
Ulmaceae Mirb. 99.
Ulmaria Gil. 36.
Ulmus L. 99.
Umbelliferae Juss. 45.
Urtica Tourn. 98.
Urticaceae Endl. 98.
Utricularia L. 90

Vaccaria Medikus 18. Vaccinium L. 71. Valeriana L. 54. Valerianaceae D. C. 54. Valerianella <u>Tourn.</u> 54. Verbascum L. 79. Verbena L. 89. Verbenaceae Juss. 89. Veronica L. 81. Viburnum L. 52. Vicia L. 33. Vinca L. 73.
Vincetoxicum Mnch. 73.
Viola Tourn. 14.
Violaceae D. C. 14
Viscaria Roehl. 19.
Viscum L. 52
Vitis L. 25.

Xanthium Tourn. 70. Xanthoxylaceae Adr. Juss 27. Xeranthemum Tourn. 65.

Zannichellia Micheli. 104. Zea L. 120.

### Berbefferungen.

Geite	2	Beile	4	v.	ø.	lies:	Gil. ftatt: Chaix.
	4	*	9	b.	u.	lie8:	polypétala Gil. ftatt: ranunculoides Mnch.
	7	=	10	<b>v</b> .	D.	lie8:	fontanum (Lmk.) Aschs. flatt: officinale R. Br.
•	8	*	11	v.	٥.	lies:	lyrata (Gil.) Aschs. statt: vulgaris R. Br.
\$	8	*	14	v.	0.	lie8:	ibérica (Willd.) D. C. erweitert statt: arcuata (Opiz) Rehb.
=	9	=	2	b.	u.	lies:	Gay u. Monnard ftatt: Gaud.
*							squamatus (Forskål) Aschs. statt: Ruellii All.
	14	5	10	b.	ø.	lie8:	silvestre (Lmk.) Aschs. fatt: arvense (All.) Wallr.
=	17	=	17	b.	u.	lies:	Scop. statt: A. Br.
=							venosa (Gil.) Aschs. flatt: inflata L.
							viscosa (Gil.) Aschs. ftatt: vulgaris Roehl.
	19		11	b.	٥.	lie8:	A. Br. statt: L. Hort. Ups.
=	19						Melandryum statt: Melandrium.
=	19						Buichhaufe ftatt: Buchhaufe.
=	21						caespitosum Gil. ftatt: triviale Lk.
*							multiflora (Lmk.) Aschs. statt: linoi-des Gmel.
	27		9	b.	11.	lies:	Alnus Mill. statt: vulgaris Rehb.
=							L. statt: Rehb. (als Art).
8							multiflora (Lmk. ex p.) Aschs. ftatt:
•				~.	•••		major Godr. u. Gr.
*	37		21	v.	0.	lies:	silvestris Neck. flatt: Tormentills Sibth.
*	<b>3</b> 9	:	3	b.	o.	lie8:	Oxyacantha fatt: oxyacantha.

Seite 39 Beile 5 v. o. lied: monogynus ftatt: monogyna.

```
3 v. o. lies: (L.) Sutt. ftatt: Sutt.
              7 b. o. lies: purpureum (L.) Lk. statt: purpuras-
   44
                            cens Koch.
             17 v. o. lies: mite Gil. ftatt: boloniense Loisl.
   44
   46
              9 v. u. lies: sioides (Wib.) Aschs. statt: Rivini
                            Host
   47
              7 b. o. lies: hircina Leers (als Art) flatt: dis-
                            sectifolia Wallr.
              8 v. u. lies: (Lmk.) Bess. ftatt: Bess.
   48
   49
              2 v. o. lies: paludapifolium (Lmk.) Aschs. ftatt:
                            officinale Koch.
    49
             18 v. o. lies: Bess. ftatt: Aschs.
             11 v. u. lies: Cuss. ftatt: Lapeyr.
   49
5
    52
             2 v. u. ichalte ein: R. vor: Sinter.
4
   54
             11 v. o. ftreiche: ; amifchen: Bolg und an.
             10 v. u. lies: Poll. ftatt: Mnch.
    54
    55
             12 v. o. lies: !! ftatt: :!
             13 v. u. lies: praemorsa (Gil.) Aschs. ftatt: pra-
    55
                            tensis Mnch.
              4 b. o. lies: Brb. ftatt: B.
    59
    59
              9 v. o. lies: tripartitus ftatt: tripartita.
    59
             10 v. o. lies: cernuus statt: cernua.
             11 v. o. lies: radiatus ftatt: radiata.
    59
    59
             13 b. o. lies: minimus fatt: minima.
              1 v. u. lies: R. ftatt: R.
    61
              2 v. u. fete: St. vor: Forberftebt.
    63
    64
              4 v. o. lies: Vaillant fatt: Gaertn.
    64
               5 v. o. ichalte ein: S. nach: +
    65
              14 v. o. lies: panniculata Jacq. ftatt: maculosa
                             Lmk.
               2 v. u. lies: vulgare (Lmk.) Schrk. ftatt: offici-
    67
                             nale Wigg.
    67
               3 v. u. lies: Haller. fatt: Juss.
5
    69
               4 b. u. lies: !! ftatt: !;
    72
               9 u. 10 v. o. lies: Salisbury ftatt: Salisburg.
    73
               8 v. u. lies: Mill. ftatt: Gil.
    90
              3 v. o. lies: Utricularia ftatt: Utricalaria.
    91
              15 v. o. lies: (L.) Jacq. ftatt: Jacq.
              16 v. u. lies: intermedium Schrad. fatt: linariae-
    96
                             folium Gil.
```

Bedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin.